

474

THÈSE
POUR
LE DOCTORAT EN MÉDECINE



Digitized by the Internet Archive
in 2026

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1904

THÈSE

N°

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Présentée et soutenue le Lundi 18 Juillet 1904, à 1 heure.

PAR

Vladislas-Casimir-Emmanuel KANIA

Né à Varsovie (Pologne) le 14 Décembre 1869

DE

L'Influence de la Puerpéralité

SUR LES

Femmes Prédisposées à la Tuberculose

Président : M. PINARD, professeur

Juges : } MM. KIRMISSON, professeur
LEPAGE et WALLICH, agrégés.

Le candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.

PARIS

IMPRIMERIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

H. JOUVE

15, rue Racine, 15

1904

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Doyen.		M. DEBOVE.
Professeurs		MM.
Anatomie.....		P. POIRIER
Physiologie.....		CH. RICHET.
Physique médicale.....		GARIEL.
Chimie organique et Chimie minérale.....		GAUTIER.
Histoire naturelle médicale.....		BLANCHARD
Pathologie et thérapeutique générales.....		BOUCHARD
Pathologie médicale.....	}	HUTINEL.
Pathologie chirurgicale.....		BRISSAUD.
Anatomie pathologique.....		LANNELONGUE
Histologie.....		CORNIL.
Opérations et appareils.....		MATHIASDUVAL
Pharmacologie et matière médicale.....		RECLUS.
Thérapeutique.....		POUCHET.
Hygiène.....		GILBERT.
Médecine légale.....		CHANTEMESSE
Histoire de la médecine et de la chirurgie.....		BROUARDEL
Pathologie expérimentale et comparée.....		DEJERINE.
Clinique médicale.....	}	HAYEM.
		DIEULAFOY.
		DEBOVE.
		LANDOUZY.
Maladie des enfants.....		GRANCHER.
Clinique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale.....		JOFFROY.
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.....		GAUCHER.
Clinique des maladies du système nerveux.....		RAYMOND
Clinique chirurgicale.....	}	TILLAX.
		LE DENTU.
Clinique ophtalmologique.....		TERRIER.
Clinique des maladies des voies urinaires.....		BERGER.
Clinique d'accouchements.....		DE LAPERSONNE
Clinique gynécologique.....		GUYON.
Clinique chirurgicale infantile.....		BUDIN.
		PINARD.
		POZZI.
		KIRMISSON

Agrégés en exercice.

MM.			
ACHARD	FAURE	LEGUEU	TEISSIER
AUVRAY	GILLES DE LA	LEPAGE	THIERY
BEZANÇON	TOURETTE	MARION	THIROLOIX
BONNAIRE	GOSSET	MAUCLAIRE	THOINOT
BROCA (Aug.).	GOUGET	MERY	VAQUEZ
BROCA (André)	GUIART	POTOCKI	WALLICH
CHASSEVANT	HARTMANN	REMY	WALTHER
CUNEO	JEANSELME	RENON	WIDAL
DEMELIN	LANGLOIS	RICHAUD	WURTZ
DESGREZ	LAUNOIS	RIEFFEL (chef	
DUPRE	LEGRY	des travaux anat.)	

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A MON PRÉSIDENT DE THÈSE

MONSIEUR LE PROFESSEUR PINARD

Membre de l'Académie de Médecine.

A MON MAITRE

M. LE DOCTEUR V. WALLICH

Professeur agrégé à la Faculté.

A MON MAITRE

M. LE DOCTEUR L. FUNCK-BRENTANO

Ancien chef de Clinique de la Faculté.

A TOUS MES MAITRES DE LA FACULTÉ
DE PARIS

DE

L'Influence de la Puerpéralité

SUR LES

Femmes Prédisposées à la Tuberculose

INTRODUCTION

Les rapports qu'il y a entre la puerpéralité et la tuberculose ont été étudiés depuis longtemps, mais cette question reste toujours ouverte. Les statistiques publiées ont été faites par des médecins, qui le plus souvent n'ont rencontré que des cas graves, ceux pour lesquels on consulte. Les accoucheurs n'ont publié que des observations isolées et d'habitude également des cas à épilogue tragique. Il serait donc intéressant d'avoir une statistique globale assez nombreuse, résumant tous les cas, aussi bien ceux où la tuberculose s'aggrave sous l'influence de la puerpéralité, que ceux où la puerpéralité n'exerce pas d'action nocive.

Tel était l'avis de mon maître, M. le Dr Funk-Brentano, qui m'a conseillé de faire de cette étude statistique le sujet de ma thèse. M. le professeur Pinard m'ayant donné l'autorisation — ce dont je le remercie vivement — d'étudier à ce point de vue les archives de la clinique Baudelocque, je me suis mis au travail et j'ai recueilli 116 observations de parturientes tuberculeuses pour les six dernières années, c'est-à-dire du 1^{er} janvier 1898 au 31 décembre 1903, sur l'ensemble de 13.651 observations. Mais, en étudiant les observations cliniques j'étais frappé d'un fait auquel je ne m'attendais pas : du grand nombre des femmes avec antécédents héréditaires ou pathologiques prédisposant à la tuberculose et qui, malgré les grossesses parfois nombreuses, restaient indemnes. Intéressé par ce fait qui allait à l'encontre de l'opinion généralement admise, je me suis attaché à étudier spécialement ces cas, en me proposant de faire de leur étude la première partie de mon travail sur l'ensemble de la question. Malheureusement, le temps qu'il m'a fallu pour rassembler et classer toutes ces observations a été beaucoup plus considérable que je ne le pensais tout d'abord ; étant, d'autre part, obligé à finir mon travail le plus tôt possible, je me suis vu forcé d'abandonner momentanément la question des rapports qui existent entre la tuberculose et la puerpéralité et de ne publier que la première partie du travail projeté. Je n'étudierai donc ici que l'influence de la puerpéralité sur les femmes prédisposées à la tuberculose.

L'opinion de la majorité des auteurs contemporains est que « chez une femme prédisposée à la bacillose par son tempérament, par ses antécédents héréditaires, etc., la grossesse, et surtout les grossesses répétées et rapprochées, facilitent singulièrement l'apparition et l'évolution de la tuberculose pulmonaire » (Ribemont-Dessaignes et Lepage), ou que « chez la femme prédisposée la grossesse peut constituer une sorte d'appel de la tuberculose » (Fieux).

C'est à Antoine Portal qu'on peut attribuer la priorité de cette opinion. Un peu plus tard Murat (1) cite l'opinion du professeur Dubois, laquelle vaut la peine d'être rappelée : « Si une femme, menacée de phtisie » dit-il, « se marie, elle résiste quelquefois à un premier accouchement, très rarement au second, mais jamais au troisième. » Mais c'est surtout Stoltz qui a insisté sur ce que chez une femme prédisposée à la phtisie la grossesse par elle-même peut changer cette prédisposition en maladie confirmée. Grâce à la notoriété dont jouissait Stoltz cette opinion fut acceptée peu à peu par la majorité

1. A ce propos nous avons constaté que la plupart des auteurs qui ont écrit sur l'influence de la grossesse sur la tuberculose, attribuent à Marc l'article « Grossesse » de Murat dans le XIX^e vol. du « Dictionnaire des sciences médicales » (1817). Il y a une confusion que nous tenons à rectifier. L'article de Murat fait suite l'article de Marc sur la grossesse au point de vue médico-légal. On a donc pris ces deux articles pour un seul et on a attribué à Marc le travail de Murat.

des médecins et des accoucheurs, tant en France qu'à l'étranger.

Sur quoi fondaient-ils cette opinion ? Sur des faits observés. Mais ceux-ci devaient être fort peu nombreux autant que nous pouvons en juger d'après notre expérience. Et la plupart des cas où la prédisposition chez les parturientes ne se changeait pas en tuberculose, passaient inaperçus.

Je crois que c'est cela qu'avait en vue M. le professeur Pinard en écrivant la préface aux « Leçons de clinique obstétricale » de M. le professeur Queirrel : « Ce que je vois », dit-il, « ce que je montre à mes élèves depuis plus de vingt ans m'a convaincu que ce qui se trouve dans la plupart des ouvrages considérés comme classiques est le produit d'une observation superficielle ».

Les observations que j'ai recueillies m'ont démontré que la puerpéralité ne provoque jamais par elle-même l'apparition de la tuberculose chez les femmes prédisposées ; que si parfois on peut rattacher le début de la maladie à la puerpéralité, ce n'est qu'une coïncidence. On peut ici appliquer dans toute sa rigueur le vieil adage : *post hoc, sed non propter hoc*.

Mais avant de poursuivre l'étude de cette question, qu'il me soit permis d'exprimer toute ma gratitude et mon admiration à M. le professeur Pinard. Ayant passé plus de cinq ans à la clinique Baudelocque comme préparateur au laboratoire et y ayant d'autre part fait mon stage, j'ai pu apprécier M. Pinard et comme savant et comme citoyen. Ses discussions des

faits cliniques étaient ma meilleure école, et il m'a montré le grand rôle social que peut jouer l'accoucheur, qui comprend bien sa tâche, comme puériculteur. En acceptant la présidence de ma thèse, M. le professeur Pinard m'a fait un grand honneur, dont je le remercie vivement.

Qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde reconnaissance à mes deux maîtres, mes anciens chefs de laboratoire, MM. le Dr Wallich, professeur agrégé à la Faculté, et le Dr Funck-Brentano, ancien chef de clinique de la Faculté. Jamais ils ne me ménageaient ni leur appui, ni leurs conseils éclairés. Ils ont bien voulu aussi s'intéresser d'une façon active à ce travail. Je ne pourrais jamais oublier tout ce qu'ils ont fait pour moi.

Explication et division du sujet

Sous ce titre : « De l'influence de la puerpéralité sur les femmes prédisposées à la tuberculose », nous voulons comprendre l'étude de la question suivante : la puerpéralité peut-elle devenir une sorte d'appel de la tuberculose chez les femmes prédisposées ? la grossesse, l'accouchement, l'allaitement peuvent-ils, et dans quelle mesure, faciliter l'invasion et le développement des bacilles tuberculeux dans un organisme taré ?

Pour pouvoir faire cette étude j'ai recueilli et classé 732 observations se rapportant à 660 femmes que l'on peut considérer comme prédisposées à la tuberculose et non tuberculeuses, malgré les grossesses parfois nombreuses. Mais le grand écueil se trouve dans la détermination, quelles femmes peut-on considérer comme prédisposées à la tuberculose. Car, autant qu'il est facile de retrouver dans les antécédents d'un tuberculeux avéré quelque chose qui peut expliquer sa résistance diminuée envers les bacilles de Koch, autant il est malaisé de dire d'avance que tel individu donné est prédisposé, qu'il va devenir fatalement la proie de la terrible maladie.

Parmi les causes prédisposantes que l'on retrouve dans les antécédents des tuberculeux, c'est peut-être l'hérédité tuberculeuse qui est la plus fréquente et la plus constante. Mais il ne s'ensuit pas encore

que tous les descendants des tuberculeux sont fatalement prédestinés à devenir un jour à leur tour tuberculeux. Loin de là : nombreux sont ceux qui échappent à ce fléau. Mais dans quelle proportion et dans quelles conditions ?

Hérard, au Congrès de la tuberculose en 1893, cita la statistique de Leudet : sur 214 familles de phthisiques 108 présentaient des antécédents indiscutables. Et il ajouta : « c'est à peu près la proportion (un peu moindre toutefois) à laquelle nous a conduit notre observation personnelle ».

Presque la même proportion (un peu plus grande cependant) a été trouvée par Albert Robin et Binet dans leurs études sur le diagnostic du terrain tuberculeux. Ils ont constaté chez les descendants de parents tuberculeux l'existence de la prédisposition morbide 60 fois sur 100.

D'autre part, on n'ignore pas que chez les sujets indemnes d'une tare héréditaire, ne présentant pas de la prédisposition innée à la tuberculose, cette prédisposition peut être acquise sous l'influence de diverses maladies ou de causes occasionnelles comme : alcoolisme, surmenages de toute sorte, dépressions morales, veilles prolongées, etc.

En se rapportant donc à des proportions données par des auteurs précités, j'ai pensé qu'en choisissant des femmes non tuberculeuses, mais nées de parents tuberculeux, j'aurais la chance de trouver dans leur nombre de 50 à 60 pour 100 de femmes réellement prédisposées. Certes, elles pourraient échapper à la

maladie ; mais dans quelles conditions ? « L'hérédité », a dit le professeur Strauss « est un facteur étiologique dont l'importance est indiscutable, quelle que soit du reste la façon dont on interprète la transmission héréditaire de la maladie. Les enfants issus de phtisiques doivent donc être soumis à une hygiène particulière, soit que l'on admette qu'ils n'héritent de leurs parents que d'une simple prédisposition, soit que l'on pense qu'ils apportent en naissant le germe latent de la maladie. Il faut les soustraire au séjour des villes, dans un air confiné, aux occupations sédentaires, les faire vivre à la campagne, au grand air et à la lumière ; ainsi on pourra souvent détourner les effets funestes de la tare héréditaire ».

Et comment vivent les femmes dont nous avons recueilli les observations ? Si nous nous rappelons que cette statistique porte sur la clientèle hospitalière, sur des femmes d'ouvriers ou, pour la plupart, ouvrières elles-mêmes, qui tout en portant ou en allaitant leurs enfants doivent travailler péniblement, qu'elles appartiennent à la population parisienne, vivant dans des conditions hygiéniques détestables, privée d'air et de lumière — si nous nous souvenons d'autre part que cette population est ravagée par un autre fléau si éminemment prédisposant à la tuberculose — l'alcoolisme (et je ne parle même pas de maladies), — nous pouvons conclure que la prédisposition innée ne peut être qu'accrue chez ces femmes par la façon de vivre. A plus forte raison, si elles étaient éprouvées par des maladies des voies respiratoires

qui ont fait ainsi de leurs poumons *locum minoris resistentiæ*, et surtout si elles étaient atteintes de pleurésie ou avaient présenté des hémoptysies, ce qui nous prouve que dans un moment donné elles étaient déjà tuberculisées ; de même, celles qui portent en elles des germes morbides, toutes celles qui sont atteintes d'une tuberculose chirurgicale, et dont les lésions sont souvent de date récente. Je crois que l'on peut considérer ces femmes comme ayant toutes les chances de devenir, le cas échéant, des tuberculeuses. Il est même inutile de rappeler que la contagion pour elles n'est que trop facile, que toutes sont entourées par des tuberculeux crachant sans façon, que beaucoup d'entre elles sont mariées à des tuberculeux avérés. Si donc maintenant à toutes ces conditions vient encore s'ajouter la puerpéralité, et si cette dernière avait vraiment une influence aussi néfaste que celle que lui prêtent les auteurs, alors toutes ces femmes devraient devenir tuberculeuses à leur première grossesse.

Certes, la maladie les guette, et il n'est que trop probable qu'un jour ou l'autre elles vont devenir sa proie. Mais, est-ce bien la puerpéralité qu'on doit mettre en cause ?

Il suffit de parcourir nos observations pour répondre négativement à cette question.

D'autre part, j'ai recueilli 34 observations se rapportant à 33 femmes, prédisposées à la tuberculose et devenues déjà tuberculeuses. Et je ne trouve que 6 femmes chez lesquelles le début probable de la

maladie coïncide ou paraît coïncider avec la puerpéralité. Chez 7 autres femmes ce début ne peut être déterminé d'aucune façon : l'observation est muette sur ce sujet. Enfin, chez 20 d'entre elles la maladie a débuté d'une façon incontestable en dehors de la puerpéralité et ne peut y être rattachée. Ces dernières donc n'entrent pas dans nos cadres.

Celles qui nous intéressent surtout ce sont les parturientes prédisposées et non tuberculeuses. J'en ai 732 observations concernant 660 femmes. Leur nombre pourrait être facilement doublé au moins, si je n'éliminais de ma statistique tous les sujets dont l'hérédité morbide pour une raison ou une autre ne me paraissait pas bien certaine. J'ai choisi des femmes qui ont l'hérédité tuberculeuse, comme seule cause prédisposante, et des femmes chez lesquelles cette prédisposition héréditaire est renforcée par des maladies antérieures des voies respiratoires ou par la tuberculose chirurgicale. A plus forte raison si ces maladies coïncident avec la puerpéralité laquelle par elle-même devrait déjà jouer un rôle tuberculisant !

Il était impossible de donner ici ces 732 observations *in extenso*. Mais je tenais à avoir la preuve matérielle de ce que j'avance. Je les ai donc résumées autant que possible dans des tableaux, où je les ai réparties par ordre de parité.

Ces 732 observations des femmes prédisposées à la tuberculose, mais ne présentant pas de lésions bacil-

lares aux poumons, sont résumées dans 7 tableaux suivants :

I. Femmes prédisposées à la tuberculose par hérédité du côté du père (234 femmes, 259 obs.).

II. Femmes prédisposées à la tuberculose par hérédité du côté de la mère (244 femmes, 266 obs.).

III. Femmes avec prédisposition héréditaire à la tuberculose du côté des deux parents (78 fem., 84 obs.).

IV. Femmes dont la prédisposition héréditaire est aggravée par des maladies des voies respiratoires, survenant en dehors de la puerpéralité (43 femmes, 53 observ.).

V. Femmes prédisposées par hérédité à la tuberculose qui ont eu — en dehors de la puerpéralité — des pleurésies ou des hémoptysies, mais chez lesquelles au moment de l'accouchement on ne put retrouver aucune lésion tuberculeuse (31 femmes, 35 observ.).

VI. Femmes avec prédisposition héréditaire à la tuberculose, chez lesquelles les maladies diverses des voies respiratoires sont survenues pendant la puerpéralité (12 fem., 17 obs.).

VII. Femmes qui prédisposées héréditairement à la tuberculose, étaient atteintes d'une tuberculose chirurgicale (18 fem., 18 obs.).

En outre j'ai résumé aussi les observations des femmes qui prédisposées héréditairement à la tuberculose sont devenues tuberculeuses et dont le début de la maladie pourrait être rattaché à la grossesse ou

à l'allaitement. J'ai groupé ces six femmes dans le tableau VIII.

Par acquit de conscience, pour ne pas être accusé de partialité, j'ai résumé de même dans le tableau IX les observations de sept femmes prédisposées et présentant des lésions tuberculeuses aux poumons, mais chez lesquelles le début de la maladie est impossible à déterminer. Peut-être ce début a-t-il coïncidé avec la puerpéralité, peut-être n'en a-t-il pas été ainsi.

A ces tableaux fait suite une courte étude, où nous essayons de faire ressortir de nos observations quelques faits qui nous intéressent d'une façon spéciale. A l'étude complète de ces observations on pourrait consacrer plusieurs volumes. Mais nous ne nous arrêterons que sur quelques faits qui vont nous permettre d'arriver aux conclusions sur le sujet qui nous occupe.

Observations résumées

Abréviations

a. — âge de la femme.	p. d. — père différent pour
a. gr. — âge présumé de la	la gross. actuelle.
grossesse actuelle.	P. enf. — poids de l'enfant
A. H. — antécédents héréditaires.	(à la naissance et à la sortie).
A. P. — antécédents pathologiques.	P. plac. — poids du placenta.
alb. — albuminurie.	R. — époque des premières règles.
bib. — enfant élevé au biberon.	S. C. — suites de couches.
b. p. — bien portant.	s. n. m. — enfant élevé au sein maternel.
ét. — état de l'enfant.	s. — enf. élevé au sein d'une nourrice.
Exp. — Durée de l'expulsion.	Tr. — durée du travail.
A. Obst. — antécédents obstétricaux.	tr. alb. — traces d'albumine dans les urines.
m. p. — même père.	

Obs. — Observations.

Chiffres entre parenthèses : le premier se rapporte à l'année ; le deuxième au numéro de l'observation.

TABLEAU I. — *Parturientes non tuberculeuses. Predisposition par hérédité du côté du père.*

A. — *Primipares.*

1. (1898, n° 61) a. 22; A. H. — père mort de tuberculose ; à 42 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2950, le 8^e j. 3040 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

2. (1898, n° 74) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3170, le 20^e j. 3200 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

3. (1898, n° 291) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 32 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3200, le 7^e j. 3000 ; ét. bon ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

4. (1898, n° 463) a. 30 ; A. H. — père mort de tuberculose à 33 ans ; A. P. — nuls ; R. 16 1/2 ; a. gr. 8 m. ; alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2730, le 8^e j. 2580 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

5. (1898, n° 576) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 18 ; a. gr. 8 m. ; alb. ; Tr. — 4 h. ; enf. viv. ; P. enf. 2550 ; P. plac. 680 ; S. C. — normales.

Obs. — Albuminurie pendant le travail. Enfant présentait une éruption douteuse. Syphilis? Enf. mort le 5^e jour.

6. (1898, n° 619) a. 30 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; enf. mort-né ; P. enf. — 3270 ; P. plac. — 540 ; S. C. — un peu fébriles, tempér. mat. le 3^e j. = 38°.

Obs. — Présentation du siège décompt. mode des fesses. Enfant mort pendant le travail, Délivr. artificielle. Placenta fétide. Rétention des membranes.

7. (1898, n° 748) a. 26 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 22 h. ; Exp. — 1 h. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3350, le 7^e j. 2990 ; P. plac. — 460 ; ét. bon ; S. C. — normales.

8. (1898, n° 977) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 24 ans ; frères et sœurs morts en bas-âge d'affections pulmon. ou de méningite ; A. P. — à 7 ans rougeole ; a. gr. 9^e m. ; tr. alb. ; Tr. — 16 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3399, le 6^e j. 3040 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. normales.

Obs. — La femme avait des attaques convulsives vers le 3^e m. de la grossesse.

9. (1898, n° 1041) a. 20 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 4 ans, chlorose à 15 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 3 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3280, le 6^e j. 3510 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège décompl. mode des fesses. Femme arrivée en plein travail. Version impossible. Abaissement du pied droit.

10. (1898, n° 1073) a. 19 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — Convulsions dans les 2 premières années, — éry-

sipèle à 7 ans, — syncopes fréquentes, — toujours malade jusqu'à l'âge de 12 ans ; a. gr. — 2 ; tr. alb. ; Exp. — 1 h. 1/4 ; enf. viv. ; P. enf. — 3030, le 9^e j. 3070 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

11. (1098, n^o 1339) a. 19 ; A. H. — père mort de tuberculose à 23 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; a. gr. 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 22 h. 1/2 ; Exp. — 5 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 2830 ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

Obs. — Tête mal ossifiée. Engagement du bras en même temps que de la tête. Rétropulsion. Enfant né cyanosé, mort, 8 h. 1/2 après.

12. (1898, n^o 1341) a. 19 ; A. H. — père mort de tuberculose à 28 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; R. — 17 ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 22 h ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. — enf. 2820, le 8^e j. — 2730 ; P. plac. 540 ; S. C. — normales.

13. (1898, n^o 1942) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. nuls ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. 1/2 ; Exp. — 40 m ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 9^e j. 3390 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

14. (1898, n^o 1963) a. 26 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 6 h. ; Exp. 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3240, le 11^e j. 3050 ; ét. bon ; P. plac. — 510 ; S. C. lymphangite des seins.

15. (1898, n^o 1977) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 39 ans ; A. P. — nuls ; R. — 17 ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. 1/2 ; Exp. 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2860, le 7^e j. 2870 ; ét. bon ; P. plac. — 510 ; S. C. — Alb. légère, — pas de fièvre.

16. (1898, n^o 2105) a. 20 ; A. H. — père et une sœur

morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 19 h. 1/4 ; Exp. — 1 h. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3030, le 10^e j. 2880 ; ét. bon ; P. plac. 545 ; S. C. — lymphangite du sein droit.

17. (1898, n^o 2174) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 1 h. 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3150, le 5^e j. 3230 ; ét. bon ; P. plac. 500 ; S. C. — norm.

18. (1898, n^o 2176) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 3 h. 55 m. ; enf. viv. : P. enf. — 3070, le 11 j. 3120 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

19. (1898, n^o 2178) a. 30 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; Exp. — 45 m ; enf. viv. ; P. enf. 3150, le 7^e j. 3100 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

20. (1898, n^o 2200) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 17 ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 24 h. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3315 ; le 9^e j. 3530 ; ét. bon : P. plac. 450 ; S. C. — normales.

Obs. Bassin rétréci. Accouchement spontané.

21. (1898, n^o 2211) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. 20 h. 1/4 ; Exp. — 20 m ; enf. viv. ; P. enf. — 3100, le 8^e j. 3150 ; ét. bon ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

22. (1899, n^o 43) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3510, le 6^e j. 3500 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. L'enfant présente la syndactylie aux deux mains.

23. (1899, n° 50) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 30 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. près du terme ; pas d'alb. ; Tr. 19 h. ; Exp. 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3490, le 11^e j. 3410 ; ét. bon ; P. plac. 530 ; S.C. normales.

24. (1899, n° 149) a. 26 ; A.H. — père mort de tuberculose à 39 ans ; A.P. — rougeole vers 7 ans ; R. — 17 irrég. ; a. gr. — ? pas d'alb. ; Tr. 6 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2320, le 8^e j. 2290 ; ét. bon ; P. plac. — 380 ; S. C. — norm.

25. (1899, no 159) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. 16 irrég. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/2 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3620, le 8^e j. 3710 ; ét. bon ; P. plac. — 440 ; S. C. — normales.

26. (1899, no 378) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — coqueluche, rougeole, varicelle dans l'enfance ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 2 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 2720, le 8^e j. 2580 ; P. plac. — 550 ; S. C. normales.

Obs. insertion du placenta sur le segment inférieur.

27. (1899, n° 415) a. 35 ; A. H. — père mort de tuberculose à 40 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. 3/4 ; Exp. — 1 h. 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3320, le 14^e j. 3150 ; ét. bon ; P. plat. 560 ; S. C. — fébriles, une fois tempér. — 39°.

Obs. Rétention des débris placentaires. Injections utérines. Femme sortie en bon état.

28. (1899, no 519) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 10 ans ; — scarlatine à 14 ans ;

a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 7 h. $1\frac{1}{2}$; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3200, le 4^e j. 3020 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — tempér. une fois : = 39° ; ensuite normales.

Obs. Inject. utér. Femme sortie en bon état.

29. (1899, n° 568) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. 18 ; a. gr. 9^e m. ; pas d'alb. ; enf. viv. ; P. enf. 3350, le 11^e j. 3190 ; ét. bon ; P. plac. 530 ; S. C. — normales.

Obs. Bassin canaliculé. Applic. de forceps dans l'excavation par défaut de progression. Délivrance artificielle.

30. (1899, n° 708) a. 23 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 46 ans ; A. P. — Rougeole dans l'enfance ; à 9 ans $1\frac{1}{2}$ chorée pend. 3 mois ; a. gr. — à termes ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. $1\frac{1}{4}$; Exp. — 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 8^e j. 3450 ; ét. bon ; P. plac. 530 ; S. C. — normales.

31. (1899, n° 1150) a. 21 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — variole à 4 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. $1\frac{1}{2}$; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 6^e j. 3320 ; ét. bon ; P. plac. 495 ; S. C. — norm.

Obs. — Le père de l'enfant a quitté cette femme, alors qu'elle était enceinte de 2 mois.

32. (1899, n° 1431) a. 19 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — Rougeole dans l'enfance ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 9 h. $1\frac{1}{4}$; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3220, le 9^e j. 2740 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — Lymphangite des deux seins.

33. (1899, n° 1956) a. 23 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 25 ans ; A. P. — Chlorose à 15 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. $3\frac{1}{4}$; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf.

— 2250, le 10^e j. 2200 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

34. (1899, n^o 1998) a. 21 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 45 ans ; A. P. — Coqueluche à 3 mois ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 23 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. 2950, le 4^e j. 2810 ; ét. bon ; P. plac. — 390 ; S. C. — normales.

35. (1899 n^o 2006) a. 25 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — Chloro-anémie depuis l'âge de 17 ans ; a. gr. — 9^e m. ; tr. alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2450 ; le 9^e j. 2550 ét. bon. ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

36. (1899, n^o 2020) a. 28 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 38 ans ; A. P. — Rougeole à 6 ans, fièvre typhoïde à 13 ans ; R. — 18 ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 3/4 ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3420, le 4^e j. 3250 ; ét. bon ; P. plac. 570 ; S. C. — normales.

37. (1899, n^o 2123) a. 21 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. chloro-anémie à 18 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. 1/2 ; Exp. — 50 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2950, le 9^e j. 3210 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. normales.

38. (1899, n^o 2188) a. 22 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 44 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance, anémie vers 14-15 ans ; R. — 16 ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 17 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enfant — 3250, le 9^e j. 3320 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

39. (1899, n^o 2436) a. 22 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 22 h. ; Exp. — 2 h. 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3150, le 8^e j. 3.000 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

40. (1899, n° 2462) a. 24 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 40 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 16 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/4 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 8^e j. 3620 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

41. (1900, n° 230) a. 24 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 17 ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 16 h. ; Exp. 50 m. ; enf. né en état de mort apparente, ranimé ; P. enf. 2460 ; P. plac. 616 ; S. C. — normales.

Obs. — Malformation utérine. — Présentation du siège complet. — Rupture prémat. des membranes. — Enfant mort le 4^e jour.

42. (1900, n° 288) a. 18 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 45 ans ; A. P. — rougeole ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3240, le 10^e j. 3350 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — Fissures des seins ; températ. 3 fois 38°.

Obs. — Femme sortie en bon état.

43. (1900, n° 376) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — fièvre muqueuse à 13 ans ; R. — 16 ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h ; Exp. — 30 m. — ; enf. viv. ; P. enf. — 2760, le 8^e j. 2750 ; ét. bon ; P. plac. — 565 ; S. C. — normales.

44. (1900, n° 442) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 41 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2270, le 12^e j. 2400 ; ét. bon ; P. plac. — 370 ; S. C. — Alb. disparaît le 10^e jour.

45. (1900, n° 538) a. 17 ; A. H. — père mort de tuberculose à 43 ans ; A. P. — nuls. R. — 10 a. ; gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 3/4 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. —

2750, le 13^e j. 2850; ét. bon; P. plac. — 450; S. C. — normales.

46. (1900, n^o 554) a. 26; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — hernie inguinale droite; R. — 19; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 18 h. Exp. — 1 h. 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 3170, le 9^e j. 3450; ét. bon; P. plac. — 490; S. C. — normales.

Obs. — Hémorrhagie de la délivrance.

47. (1900, n^o 570) a. 18; A. H. — père mort de tuberculose, un frère mort de tuberculose à 22 ans; A. P. — nuls; R. — 15 1/2; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 16 h.; Exp. — 3 h 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 2920, le 8^e j. 3090; ét. bon; P. plac. — 550; S. C. — normales.

48. (1900, n^o 663) a. 21; A. H. — père mort de tuberculose à 29 ans; A. P. — nuls; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 6 h.; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 3600, le 8^e j. 3630; ét. bon; P. plac. — 500; S. C. — normales.

49. (1900, n^o 874) a. 28; A. H. — père mort de tuberculose à 33 ans; A. P. — nuls; a. gr. — à terme; tr. alb.; Tr. — 21 h.; Exp. 6 h. 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 3960, le 9^e j. — 3700; ét. bon; P. plac. — 610; S. C. — normales.

50. (1900, n^o 1060) a. 23; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — nuls; a. gr. — près du terme; tr. alb.; Tr. — 10 h. 1/4; Exp. — 1 h. 1/4 enf. viv.; P. enf. — 3250, le 9^e j. 3170; ét. bon; P. plac. — 490; S. C. — normales.

51. (1900, n^o 1120) a. 21; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — Scarlatine à 10 ans; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 6 h.; Exp. — 55 m.; enf. viv.; P. enf. — 3470, le 8^e j. 3450; ét. bon; P. plac. — 700; S. C. — normales.

52. (1900, n^o 1192) a. 23; A. H. — père mort de tubercu-

lose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 8 m. (?) ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. 1/2 ; Exp. — 35 m. ; enf. viv., faible ; P. enf. — 1900, le 6^e j. 1720 ; ét. médiocre ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

Obs. — Dernier rapport conjug. la nuit dernière.

53. (1900, n° 1286) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/2 ; Exp. 2 h. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2930, le 5^e j. 2890 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. normales.

54. (1900, n° 1784) a. 32 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 28 ans ; a. gr. — 3 m. ; pas d'alb. ; fœtus mort ; P. enf. — 50 gr. ; S. C. — une fois tempér. = 38°8.

55. (1900, n° 1876) a. 18 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — coqueluche à 5 ans ; a. gr. — 6^e m. ; alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 2 h. ; enf. mort ; P. enf. — 650 ; P. plac. — 170 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta prævia, en partie décollé, obturait l'orifice. — Présentation du siège complet. — Hémorrhagie de la délivrance.

56. (1900, n° 1917) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 35 ans ; A. P. — migraines fréquentes, surtout au moment des règles ; R. — 18 ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3770, le 12^e j. 3910 ; ét. bon ; — P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

57. (1900, n° 1927) a. 17 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 16 ; a. gr. — 9^e m. ; tr. alb. ; Tr. — 9 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2000, le 8^e j. 1820 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

58. (1900, n° 2020) a. 23 ; A. H. — père mort de tuber-

culose; A. P. — Nuls; R. — 18; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 5 h.; Exp. — 50 m.; enf. viv.; P. enf. — 3600, le 3^e j. 3420; ét. bon; P. plac. — 530; S. C. — normales.

59. (1900, n° 2142) a. 22; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — à 14 ans rhumatisme, fièvre muqueuse; a. gr. — 6 m.; pas d'alb.; Tr. — 18 h. 1/2; Exp. — 20 m.; fœtus mort et macéré; P. enf. — 1000; P. plac. — 370; S. C. — normales.

60. (1900, n° 2268) a. 19; A. H. — père mort de tuberculose à 40 ans; A. P. — chlorose à 14 ans; a. gr. — à terme; tr. alb.; Tr. — 8 h. 1/2; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 3700, le 9^e j. 3920; ét. bon; P. Plac. — 560; S. C. — normales.

61. (1900, n° 2342) a. 27; A. H. — père mort de tuberculose à 30 ans; A. P. — rougeole à 13 ans; a. gr. — 4^e m.; pas d'alb.; Tr. — 6 h. 3/4; fœt. mort; P. enf. — 150; P. plac. — 130; S. C. — normales.

Obs. — Endométrite hémorrhagique.

62. (1900, n° 2396) a. 21; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — Chlorose à 16 ans; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 9 h. 1/4; Exp. — 45 m.; enf. viv.; P. enf. — 3250, le 10^e j. 3440; ét. bon; P. plac. — 450; S. C. — normales.

63. (1901, n° 520) a. 24; A. H. — père mort de tuberculose à 43 ans; A. P. — Rougeole dans l'enfance; a. gr. — 8 m.; pas d'alb.; Tr. — 10 h. 1/2; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 2000, le 9^e j. 1850; ét. bon; P. plac. — 440; S. C. — normales.

Obs. — Ins. du placenta sur le segm. inférieur. Rupture prématurée des membranes.

64. (1901, n° 571) a. 24 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 47 ans ; A. P. — Rougeole à 12 ans ; a. gr. — 9° m. ; tr. alb. ; Tr. — 18 h. 1/2 ; Exp. — 3 h. 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3170, le 8^e j. 2970 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

65. (1901, n° 578) a. 24 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — Nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 50 m ; enf. viv. ; P. enf. — 3040, le 8^e j. 3060 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

Obs. — Rupture prématurée des membranes. Brièveté congénitale du cordon.

66. (1901, n° 649) a. 23 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 23 ans ; A. P. — Rougeole à 7 ans, anémie de 10 à 18 ans ; R. — 15 ; a. gr. — commencem. du 3^e m. ; pas d'alb. ; P. enf. — ? ; P. plac. — 50 ; S. C. — normales.

Obs. — Avortement fait en ville. Femme délivrée à la clinique. Leucorrhée pendant la grossesse.

67. (1901, n° 712) a. 21 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — Nuls ; R. — 17 ; a. gr. — 3 m. ; pas d'alb. ; P. enf. — 610 ; P. plac. — 270 ; S. C. — normales.

68. (1901, n° 775) a. 26 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; un frère mort de tuberculose à 26 ans ; A. P. — Une maladie de l'œil gauche à 2 ans (aveugle depuis), rougeole à 3 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2600, le 8^e j. 2770 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

69. (1901, n° 831) a. 19 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — Nuls ; R. — 11 ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ;

Tr. — 15 h. ; Exp. — 1 h. 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3250. le 8^e j. 3220 ; ét. bon. ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

70. (1901, n° 1042) a. 20 1/2 ; A. H. — père mort de tuberculose à 34 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 3/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3100, le 6^e j. 3000 , ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

71. (1901, n° 1124) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose à 29 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3310, le 8^e j. 3200 ; ét. bon. P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

72. (1901, n° 1199) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose il y a 10 ans ; A. P. — rougeole à 11 ans ; R. — 16 ; a. gr. — 9^e m. ; alb. légère ; Tr. — 18 h. 1/2 ; Exp. 12 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3400, le 11^e j. 3330 ; ét. bon ; P. plac. — 590 ; S. C. — Une forte tempér. : 38°5.

Obs. — Femme sortie en bon état.

73. (1901, n° 1232) a. 34 ; A. H. — père mort de tuberculose à 34 ans ; A. P. — fièvre (?) à 17 ans ; R. — à 18 ans, est restée à 21 ans pendant 8 mois sans avoir des règles ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; T. — 10 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3600. le 9^e j. 3700 ; ét. bon ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

74. (1901, n° 1272) a. 16 ; A. H. — père mort de tuberculose à 40 ans ; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2070, le 8^e j. — 1720 ; ét. médiocre ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège complet.

75. (1901, n° 1277) a. 19 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. rougeole à 5 ans, chloro-anémie à 15 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. 1/4 ; Exp. — 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2980, le 8^e j. 2870 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

76 (1901, n° 1424) a. 18 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2350, le 8^e j. 2300 ; ét. bon ; P. plac. — 435 ; — S. C. — normales.

Obs. — Ins. du placenta sur le segment inférieur.

77. (1901, n° 1441) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose il y a 12 ans ; A. P. — rougeole à 6 ans ; R. — 16 ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Exp. — 1 h. 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3490, le 11^e j. 3330 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

78. (1901, n° 1568) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose à 35 ans ; A. P. — rougeole à 3 ans, influenza à 11 ans ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 17 h. ; Exp. — 50 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3150, le 9^e j. 3150 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

79. (1901, n° 1573) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 34 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2620, le 8^e j. 2620 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

80. (1901, n° 1581) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 40 ans ; A. P. — rougeole à 11 ans, fièvre typhoïde à 20 ans ; a. gr. — 8^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 19 h. ; Exp. — 25 m. ; foet. mort macéré ; P. enf. — 2090 ; P. plac. — 350 ; S. C. — normales.

Obs. — Un mois avant l'accouchement la femme avait des maux de gorge et une éruption ; actuellement, dans les aines et au cou, ganglions durs, mobiles.

81. (1901, no 1597) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 30 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 3 ans ; R. — 15 1/2 ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3000, le 6^e j. 2940 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

82. (1901, no 1619) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 29 ans ; A. P. — rougeole, anémie, saturnisme ; R. — 17 irrég. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2050, le 8^e j. 2000 ; ét. bon ; P. plac. — 340 ; S. C. — normales.

83. — (1901, n^o 1862) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 3/4 ; Exp. — 2 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 3850, le 8^e j. 4150 ; ét. bon ; P. plac. — 590 ; S. C. — normales.

Obs. Dégagement en occipito-postérieure directe.

84. (1902, n^o 23) a. 28 ; A. H. — père mort de tuberculose à 36 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. à terme ; alb. légère ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 2 h. 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3250, le 9^e j. 3050 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

Obs. Bassin petit. Promontoire accessible. Accouch. spontané.

85. (1902, n^o 67) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose il y a 14 ans ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. irrég. ; a. gr. — à terme (?) ; pas d'alb. ; Tr. — 23 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2850, le 9^e j. 2810 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

86. (1902, n^o 137) a. 20 ; A. H. — père mort de tubercu-

lose à 32 ans ; A. P. — rougeole à 3 ans ; R. — 16 ; a. gr. près du terme ; pas d'alb. Tr. — 56 h. ; Exp. — 6 h. 15 m. ; enf. viv. ; P. enfant — 3430, le 9^e j. 3370 ; ét. bon ; P. plac. — 730 ; S. C. — normales.

Obs. Application de forceps pour défaut de progression de la tête.

87. (1902, n^o 441) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose à 35 ans ; A. P. — bronchites dans l'enfance ; a. gr. 8 — m. ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. ; Exp. — 10 m. ; fœtus mort macéré ; P. enfant — 2230 ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

Obs. Le placenta présente des vestiges d'une hémorragie rétro-placentaire récente.

88. (1902, n^o 548) a. 21 1/2 ; A. H. — père mort de tuberculose à 39 ans ; A. P. — chlorose de 17 à 16 ans, leucorrhée ; R. — 15 a., très irrégul. a. gr. près du terme pas d'alb. ; Tr. — 10 h. 1/4 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. P. enf. — 3110, le 8^e j. 3130 ; ét. bon ; P. plac. — 490 ; S. C. — normales.

89. (1902, n^o 920) a. 20 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — rhumatisme artic. à 17 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3460, le 8^e j. 3150 ; ét. bon ; P. plac. — 490 ; S. C. — norm.

90. (1902, n^o 1226) a. 23 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 10 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 23 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3550, le 10^e j. 3550 ; ét. bon ; P. plac. — 630 ; S. C. — normales.

91. (1902, n^o 1299) a. 21 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — scarlatine à 11 ans ; a. gr. — 7^e m. ; Tr. — 36 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 1140, le

6^e j. 950 ; ét. bon (?) ; P. plac. — 270 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta prævia.

92 (1902, n^o 1342) a. 21 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 12 ans, influenza à 13 ans ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3310, le 10^e j. 3130 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

Obs. — Présent. du siège décompl. mode des fesses. Rupture prématurée des membranes.

93. (1902, n^o 1359) a. 20 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole et scarlatine dans l'enfance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 20 h. ; — Exp. — 3 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3700, le 8^e j. 5580 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

94. (1902, n^o 1401) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose à 45 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 20 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2250, le 9^e j. 2380 ; ét. bon ; P. plac. — 370 ; S. C. — normales.

Obs. — Bride antéro-postérieure du vagin, rompue spontanément au moment de l'expulsion.

95. (1902, n^o 1566) a. 29 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 46 ans ; A. P. — Rougeole dans l'enfance, rhumatisme à 15 ans ; — hystérie ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2820, le 7^e j. 2770 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

96. (1902, n^o 1661) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 6 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h 1/2 ; Exp. — 4 h. 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3400, le 8^e j. 3060 ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

97. (1902, n^o 2003) a. 20 ; A. H. — Père mort de tubercu-

lose à 40 ans ; A. P. — Nuls ; a. gr. — 8^e m. (?) ; alb. ; Tr. — 20 h. ; Exp. — 2 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 2650, le 8^e j. — 2900 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

98. (1903, n^o 2) a. 18 ; A. H. — père mort de tuberculose à 37 ans ; A. P. — Rougeole, scarlatine et diphtérie dans l'enfance ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; enf. viv. ; P. enf. — 2300, le 9^e j. 2350 ; ét. bon ; P. plac. — 380 ; S. C. normales.

Obs. — Femme accouchée en voiture.

99. (1903, n^o 7) a. 18 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 41 ans ; A. P. — Rougeole et variole dans l'enfance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. 1/2 ; Exp. — 40 m ; enf. viv. ; P. enf. — 2650, le 7^e jour. 2520 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. normales.

Obs. Présentation du siège complet en SIGA.

100. (1903, n^o 82) a. 22 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — Nuls ; R. 15 ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. — Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3520, le 8^e j. 3500 ; P. plac. — 670 ; S. C. — Températ. une fois 38^o.

101. (1903, n^o 163) a. 18 ; A. H. — Père mort de tuberculose laryngée ; A. P. — Nuls ; a. gr. 9^e m. ; Tr. 12 h. ; Exp. — ? ; enf. viv. ; P. enf. — 2750, le 9^e j. 2850 ; P. plac. — 360 ; S. C. — Températ. une fois 39^o 2, deux fois, 38^o ; purgatif.

Obs. — Femme sortie en bon état.

102. (1903, n^o 470) a. 17 1/2 ; A. H. — père mort de tuberculose à 48 ans ; A. P. — croup à 10 ans ; R. — 13 ; a. gr. — 7^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 1080 ; P. plac. — 310 ; S. C. — normales.

Obs. — Enfant mort deux jours après la naissance.

103. — (1903, n^o 545) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose à 39 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb.

Tr. — 19 h. $1/4$; Exp. 1 h. , enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 6^e j. 2970 ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

Obs. — Vomissements pendant toute la durée de la grossesse. — Hémorrhagie de la délivrance.

104. (1903, no 550) a. 18 ; A. H. — père mort de tuberculose à 37 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 22 h. ; Exp. 1 h. 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3170, le 9^e j. 2900 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; J. C. — normales.

105. (1903, no 563) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose à 39 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e mois. ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. $1/2$; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2850, le 8^e j. 2560 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

106. (1903, no 670) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 45 ans ; A. P. nuls ; a. gr. 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. Exp. — 1 h. 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2310, le 9^e j. — 2320 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Ins. du placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes.

107. (1903, no 1433) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 43 ans ; A. P. — malade jusqu'à l'âge de 2 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. $1/2$; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 2900, le 9^e j. 2850 ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

108. (1903, no 1667) a. 23 $1/2$; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. $1/4$; Exp. — 1 h. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3480, le 7^e j. 3400 ; P. plac. — 590 ; S. C. normales.

109. (1903, n^o 1738) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 48 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ;

Tr. — 11 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3080, le 9^e j. 3070 ; ét. bon , P. plac. — 600 ; S. C. normales.

110. (1903, n^o 1816) a. 33 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 15 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. ; Exp. — 10 m. enf. viv. ; P. enf. 2680 le 9^e j. 2850 ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

111. (1903, n^o 1994) a. 19 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3700, le 14^e j. 3620 ; P. plac. — 500 ; S. C. — températ. 4 fois 39° ; purgatif.

112. (1903, n^o 2049) a. 18 ; A. A. — Père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 41 h. ; Exp. — 4 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3900, le 4^e j. 3770 ; ét. bon ; P. plac. — 650.

Obs. — Eclampsie pendant l'expulsion. Application de forceps. Délivrance artificielle. Hémorrhagie. Femme morte trois heures après l'accouchement.

B. — *Multipares.*

113. (1898, n^o 38) a. 26 ; A. H. — Père mort de tuberculose il y a 17 ans ; A. P. — phlegmon de l'avant-bras à 23 ans ; II. — pare ; A. obst. — en 1896 acc. normal. — enf. viv., s. m. puis bi b., mort à 2 m. de convulsions ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3550, le 9^e j. 3420 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. normales.

114. (1898, n^o 57) a. 29 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — chorée à 9 ans, — à 16 ans rhumatisme artic. aigu, rétrécissement mitral ; II-pare : en 1894, acc. à terme, for_

ceps; — enf. viv., bib. b. p. ; a. gr. 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 21 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 2800, le 9^e j. 2750 ; ét. bon ; P. plac. 450 ; S. C. — normales.

115. (1898, n^o 221) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose, un frère tuberculeux ; A. P. nuls ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1892 acc. prém. à 5 m. 1/2, enf. mort 2 h. après la naissance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3660, le 9^e j. 3750 ; ét. bon ; P. plac. 550 ; S. C. — normales.

116. (1898, n^o 323) a. 29 ; A. H. — père mort de tuberculose à 41 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 15 ans ; R. — 18 irrég. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1896, acc. norm., enf. viv. ; à gr. — 8 m. ; grossesse gémellaire ; urines troubles ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. vivants ; 1) P. enf. 2250, le 17^e j. 1970 ; 2) P. enf. — 2500, le 17^e j. 2560 ; ét. bon ; P. plac. 820 ; S. C. — pathologiques.

Obs. — Hydramnios. Grossesse gémellaire (1) siège compl., 2) somm. Femme morte d'infection le 9^e jour après l'accouchement.

117. (1898, n^o 489) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. nuls ; R. 16 ; II-pare m. p. ; A. obst. en 1897, acc. norm. enf. viv. s. m., mort à 5 mois de convulsions ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 3180, le 10^e j. 3250 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

118. (1898, n^o 1245) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — fièvre typhoïde à 18 ans ; R. — 17 a., irrégul. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1896, acc. normal, enf. viv. s. m. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ;

P. enf. — 3940, le 7^e j. 3750; ét. bon; P. plac. — 680; S. C. — normales.

Obs. — La femme, tout en allaitant son premier enfant, s'était placée comme nourrice.

119. (1898, n^o 1412) a. 38; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — nuls; R. 17; II-pare m. p.; A. Obst. — en 1889 — avortem. de 3 m.: suites de couches pathologiques; a. gr. — près du terme; alb. (pend. l'éclampsie); enf. viv.; P. enf. — 3550, le 9^e j. 3500; ét. bon; P. plac. — 550.

Obs. — Bassin rétréci. Accès d'éclampsie pendant le travail. Symphyséotomie. Forceps. — Femme morte 18 heures après l'opération.

120. (1898, n^o 1508) a. 22; A. H. — père mort de tuberculose à 39 ans; A. P. — nuls; R. — 17; II-pare p. d.; A. Obst. — en 1896 — acc. prém. à 7 m. enf. mort quelques instants après la naissance; a. gr. — ?; pas d'alb.; Exp. — 35 m.; enf. viv.; P. enf. — 2320, le 9^e j. 2290; ét. bon; P. plac. — 450; S. C. — normales.

121. (1898, n^o 1672) a. 20; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — à 7 ans croup suivi de paralysie du voile du palais (pendant 8 jours); — stigmates d'hystérie; I-pare; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 13 h. 3/4; Exp. — 1 h. 20 m.; enf. viv.; P. enf. 2890, le 7^e j. 2830; ét. bon; P. plac. — 530; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, était vivant et bien portant en 1900 (1900, n^o 502) a. 22; II-pare m. p.; A. Obst. (v. ci-dessus); a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 4 h 1/2; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. 2700, le 9^e j. 2950; ét. bon; P. plac. — 410; S. C. — normales.

122. (1898, n^o 1688) a. 23; A. H. — père, un frère et une

sœur morts de tuberculose; A. P. — nuls; R. — 16 irrég.; II-pare p. d.; A. Obst. — en 1896 acc. norm. enf. s. m. vivant; a. gr. — 7 m.; pas d'alb.; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 2000, le 8^e j. 1970; ét. faible; P. plac. — 450; S. C. — normales.

123. (1899, n° 474) a. 19; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — à 12 ans, fièvre typhoïde; II-pare m. p.; A. Obst. — en 1897 acc. à 8 m. 1/2, présent. de la face, enf. s. m. 13 mois, vivante b. p.; est devenue enceinte en nourrissant; a. gr. — ; pas d'alb.; Tr. — 6 h.; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3070, le 7^e j. 3160; ét. b.; P. plac. — 450; S. C. — normales.

124. (1899, n° 493) a. 25; A. H. — père et une sœur morts de tuberculose; A. P. — métrite après le 1^{er} accouch.; R. — 16 a.; II-pare m. p.; A. Obst. — en 1895 acc. norm. enf. vivant b. p.; a. gr. — 9^e m.; tr. alb.; Tr. — 13 h. 1/2; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. 3090, le 9^e j. 2820; ét. bon; P. plac. — 615; S. C. — Albuminurie; lymphangite des deux seins.

Obs. — Placenta sur le segm. inférieur. — Femme sortie en bon état.

125. (1899, n° 499) a. 21; A. H. père mort de tuberculose à 42 ans; A. P. — rougeole à 2 ans; II-pare m. p.; A. Obst. — en 1897 — acc. norm. enf. s. m. 1 mois, puis allaitem. mixte, mort à 12 m. 1/2 de tuberculose; a. gr. 8^e m.; pas d'alb.; Tr. — 4 h.; Exp. — 10 m.; enf. viv., faible; P. enf. — 1850; P. plac. — 500; S. C. — une fois températ. = 48° 3.

Obs. — Bassin rétréci. Placenta sur le segment inférieur. Enfant mort le 11^e jour.

126. (1899, n° 515) a. 21; A. H. — père mort de tuber-

eulose ; A. P. — rougeole dans l'enfance, à 15 ans fièvre typhoïde ; R. — 17 1/2 ; II-pare m. p. ; A. Obst. en 1897 acc. prém. à 6 m., enf. mort ; a. gr. 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/4 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2580, le 7^e j. 2270 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

127. (1899, no 832) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. ; I-pare a. gr. — près du terme ; alb. ; Tr. — 15 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2820, le 8^e j. 2790 ; ét. b. P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort de diarrhée 3 semaines après la naissance.

« (1901, no 376) a. 22 ; II-pare m. p. ; A. Obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — 9^e m. ; Tr. — 15 h. 1/4 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 7^e j. 3200 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

128. (1899, no 1231) a. 28 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 15 1/2 ; II-pare p. d. ; A. Obst. — en 1895 acc. norm., enf. mort à 6 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3200, le 7^e j. 3420 ; ét. bon ; P. plac. — 535 ; S. C. — normales.

129 (1899, no 1613) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. à 6 ans, fièvre typhoïde ; R. — 16 irrég. ; II-pare p. d. ; A. Obst. — en 1896, avortem. de 6 mois ; a. gr. 6 m. 1/2 ; Tr. — 1 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; fœtus mort macéré ; P. enf. — 1050 ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège décomplété mode des fesses. — Placenta prævia.

130. (1899, no 1949) a. 28 ; A. H. — père mort de tuberculose à 47 ans ; A. P. — nuls ; II-m. p. ; A. Obst. — en

1897 acc. norm. enf. s. n. 12 mois, vivant b. p. ; a. gr. — 6 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 2 1/2 ; Exp. 10 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 1110, le 10^e j. 1140 ; ét. assez bon ; P. plac. — 285 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta prævia.

131. (1899, no 2276) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose à 48 ans ; A. P. — vers 4 ans rougeole, vers 15 ans anémie jusqu'à l'apparition des règles ; R. — 17 a. ; I-pare ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. 2 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3380, le 9^e j. 3350 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, était vivant en 1903.

(1903, 626) a. 28 : II-pare p. d. ; A. obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 23 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3050, le 9^e j. 3260 ; ét. bon ; P. plac. — 490 ; S. C. — lymphangite légère des seins.

132. (1899, no 2492) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose à 47 ans ; A. P. — coqueluche et rougeole dans l'enfance ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. bib. vivant b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. Exp. quelques minutes ; enf. viv. ; P. enf. — 3020, le 9^e j. 3070 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

133. (1900, no 585) a. 24 ; père mort de tuberculose à 39 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897, acc. prém. à 7 m. 1/2, enf. s. m. 2 ans, vivante, coxalgique, ne marche pas encore ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. 8 h ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2670, le 11^e j. 2800 ; ét. bon ; P. plac. 440 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur.

Son mari est mort récemment de tuberculose.

134. (1900, n° 957) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose à 45 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib., mort à 1 an de diarrhée ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/4 ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3240, le 10^e j. 3400 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

135. (1900, n° 1886) a. 26 ; A. H. — père mort de tuberculose à 29 ans ; A. P. — rougeole à 8 ans ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1896 acc. norm. enf. viv. s. m. 10 mois, b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; alb. ; Tr. 1 h. 5 m ; fœt. mort macéré ; P. enf. 1540 ; P. plac. — 280 (infarctus blancs) ; S. C. — normales.

136. (1900, n° 2442) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; I-pare ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3110, le 8^e jour 3050 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant s. m. 7 mois, puis bib. ; il était vivant en 1903.

« (1903, n° 317) a. 24 ; II-pare m. p. ; A. — obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — 6 semaines environ ; pas d'alb. ; S. C. — normales.

137. (1901, n° 115) a. 26 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — à 8 ans, coqueluche et rougeole à 13 ans ; R. — 18 ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. S. m. 15 mois, b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 3/4 ; Exp. 15 m. ; enf. viv. ; P. — enf. — 4270, le 6^e j. 4370 ; ét. bon ; P. plac. — 800 ; S. C. — normales.

138. (1901, n° 127) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — à 19 ans fièvre typhoïde, à 22 ans insuffisance mitrale, œdème des jambes ; II-pare m. p. ; A. obst. —

en 1897 acc. norm. enf. mort pendant le travail ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — S. m. ; enf. mort ; P. enf. 2335 ; P. plac. — 610 ; S. C. — normales.

Obs. — Femme cardiaque. Bassin vicié. Procidence du cordon ; réduction impossible. Enfant mort pendant le travail.

139. (1901, n° 175) a. 29 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 acc. norm. enf. viv. S. m. 16 mois, b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4100, le 7^e j. 4130 ; ét. bon ; P. plac. — 770 ; S. C. — normales.

Obs. — Gros œuf. Liquide amniotique abondant.

140. (1901, n° 234) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3840, le 9^e j. 4250 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

141. (1901, n° 304) a. 23 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare p. d. ; A. Obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. bib. mort à 3 semaines ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 15 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3270, le 10^e j. 3480 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin rétréci. Accouchement spontané. Dégagement de la tête en occipito-postérieure directe.

142. (1901, n° 618) a. 23 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 3 ans ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1899 acc. norm. enf. viv. s. m. 15 mois, 6. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ;

P. enf. 3900, le 7^e j. 4100 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

143. (1901, n° 654) a. 23 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 40 ans ; A. P. — à 3 ans variole, à 5 ans scarlatine, anémie de 10 à 11 ans ; II-pare p. d. ; A. Obst. — en 1899 acc. à terme forceps enf. viv. ; bib., b. p. ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 16 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3630, le 8^e j. 3800 ; ét. bon ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales ; alb. disparaît.

144. (1901, n° 930) a. 21 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1899 acc. norm. enf. viv. s. m. 11 mois, mort alors de méningite ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 5 m. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3480, le 9^e j. 3420 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

145. (1901, n° 935) a. 22 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 36 ans ; A. P. — pneumonie à 18 mois ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3900, le 10^e j. 3990 ; ét. bon ; P. plac. — 750 ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation de la face.

146. (1901, n° 1031) a. 18 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900. — avortem. de 2 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 3/4 ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3510, le 8^e j. 3840 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

147. (1901, n° 1188) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst.

— en 1900 acc. norm. enf. viv. bib., b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. $3/4$; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3600, le 10e j. 3530 ; ét. bon ; P. plac. — 720 ; S. C. — normales.

148. (1901, no 1321) a. 37 ; A. H. — père mort de tuberculose à 37 ans ; A. P. — nuls ; R. — 16 ; II-pare ; A. obst. — en 1896, acc. norm. enf. v. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3000, le 9e j. 2970 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

149. (1901, no 1418) a. 19 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole et varicelle ; II-pare ; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — 9e m. ; tr. alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3110, le 8e j. 3400 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

150. (1901, no 1641) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — à 6 ans rougeole ; II-pare m. p. ; A. obst. — en février 1900 acc. prémat. enf. viv. s. m. 1 an, b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; enf. viv. ; P. enf. 3750, le 7e j. 3650 ; ét. bon ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

151. (1901, no 1794) a. 40 ; A. H. — père mort de tuberculose à 34 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 9 et à 28 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 acc. à terme forceps enf. viv. bib., b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. 4100, le 10e j. 3880 ; ét. bon ; P. plac. — 1100 ; S. C. — normales.

Obs. — Utérus fibromateux. Accouchement spontané.

152. (1901, no 1868) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose à 46 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. —

en février 1900 acc. gémeil. près du terme. 2 filles viv. s. m. 2 mois puis bib., la 1^{re} morte à 4 m. 1/2, la 2^e à 17 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3820, le 9^e j. 4060 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

153. (1901, n° 1945) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose à 39 ans ; A. P. — à 18 ans chloro-anémie ; R. — 15 1/2 ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 avortem. au 2^e m. ; a. gr. — près du terme ; pas d'album. ; Tr. — 13 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3250, le 7^e j. 3120 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

154. (1901, n° 2183) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose à 41 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. 3 mois puis bib., b. p. ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 12 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4.050 ; le 11^e j. 4120 ; ét. bon ; P. plac. — 680 ; S. C. — lymphangite du sein.

Obs. — Trois mois après son premier accouchement, cette femme s'était placée comme nourrice et y est restée jusqu'au 3^e mois de la grossesse actuelle.

155. (1902, n° 631) a. 29 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — à 18 ans rhumatisme dans les genoux, à 26 ans scarlatine ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. à terme, forceps, enf. mort 6 h. après la naissance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 19 h. 1/2 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3550, le 19^e j. 3390 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

156. (1902, n° 787) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 37 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1900 acc. prém. à 7 m. ; enf. viv. nourri

au verre avec du lait maternel. Mort à 14 jours ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2700, le 8^e j. 2610 ; ét. bon ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta prævia.

157. (1902, n° 1278) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. prém. à 6 m. enf. mort 4 h. après la naissance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3350, le 10^e j. 3220 ; P. plac. — 540 ; S. C. normales.

158. (1902, n° 1422) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose à 38 ans ; Ro. — 17 a. ; A. P. — nuls ; II-pare p. dif. ; A. obst. en 1900 — acc. à terme forceps enf. viv. s. m. 1 mois, puis bib., b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; alb. pendant la grossesse ; pas d'alb. pendant l'accouchement ; Tr. — 14 h. 1/2 ; Exp. 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3580, le 8^e j. 3000 ; ét. bon ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

Obs. — Enfant présente la polydactylie aux deux mains.

159. (1902, n° 1605) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — rhumatisme articul. aigu à 12 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — il y a 8 mois acc. prém. à 6 m. 1/2 d'un fœtus mort et macéré ; a. gr. — 8^e m. ; alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. 10 m. ; fœtus mort macéré ; P. enf. — 1050 ; P. plac. — 250 ; S. C. — normales.

160. (1902, n° 1698) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose laryngée ; A. P. — à 21 ans angine (durée plus d'un mois), maux de tête nocturnes à la même époque ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1901 — acc. prém. à 6 m. 1/2, fœtus mort et macéré ; a. gr. — 7 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/2 ;

Exp. — 15 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 1750, le 8^e j. 1520 ;
P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur.

161. (1902, n^o 1701) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose à 47 ans ; A. P. — rougeole et variole dans l'enfance ; R. — 19 a. ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1901 avortem. de 6 semaines ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3430, le 7^e j. 3450 ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

162. (1903, n^o 530) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. nuls ; R. — 19 a., devint enceinte pour la 1^{re} fois 3 m. après ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. s. m. 1 au b. p. ; a. gr. — 8 m. (?) ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3450, le 6^e j. 3390 ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

163. (1903, n^o 920) a. 19 ; A. H. — père mort de tuberculose à 44 ans ; A. P. — nuls ; II-pare ; A. obst. — en 1902 acc. norm., S. C. pathologiques, enf. viv. bib., mort à 1 mois de diarrhée ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3500, le 10^e j. 3500 ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

164. (1903, n^o 985) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 30 ans ; A. P. — à 15 ans chlorose ; R. — 15 a. ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1899 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3020, le 9^e jour 2800 ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

165. (1900, n^o 2039) a. 19 ; A. H. — père mort de tuberculose à 49 ans ; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance ; I-pare ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. ;

Exp. — 50 m. ; enf. mort macéré ; P. enf. 3250 ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège décomplété mode des fesses.

« (1903, n^o 1014) a. 22 ; II-pare m. p. ; A. Obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme, pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/4 ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3430, le 6^e j. 3210 ; ét. bon ; P. plat. — 530 ; S. C. — normales.

166. (1903, n^o 2027) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole et scarlatine en bas-âge ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1902 acc. norm. enf. viv. s. m. mort à 17 jours de broncho-pneumonie ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3200, le 10^e j. 3260 ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

167. (1898, n^o 1948) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose à 47 ans, 5 frères et sœurs morts de méningite et de tuberculose ; A. P. — à 12 ans lymphangite à la jambe gauche ; III-pare m. p. ; A. Obst. — 1) en 1896 — avortem. de 3 morts ; 2) en 1897 acc. norm. enf. mort à 2 mois de méningite ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2550, le 7^e j. 2480 ; ét. bon ; P. plac. — 380 ; S. C. — normales.

168. (1899, n^o 1240) a. 30 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — fièvre typhoïde à 15 ans ; III-pare p. d. ; A. Obst. — en 1893 et 1896 deux acc. normaux enf. viv. s. m. b. p. (même père) ; — a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/4 ; Exp. — 1 h. 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3750, le 9^e j. 3420 ; ét. bon ; P. plac. — 740 ; S. C. — normales.

169. (1899, n^o 1471) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 21 ans ; II-pare p. d. ; A. Obst. — en 1893 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — 8^e m. ; pas

d'alb.; Tr. — 5 h.; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 2285, le 8^e j. 2020; ét. bon; P. plac. — 580; S. C. — normales.

Obs. — Placenta prævia. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 11 mois 1/2 de diarrhée.

« (1901, n^o 248) a. 29; III-pare p. d.; A. Obst. — (v. ci-dessus); a. gr. près du terme; pas d'alb.; Tr. — 6 h. 1/2; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 2970, le 9^e j. 2680; ét. bon; P. plac. — 400; S. C. — normales.

170. (1899, n^o 1951) a. 25; A. H. — père mort de tuberculose à 33 ans; A. P. — fluxion de poitrine dans l'enfance; III-pare p. d.; A. Obst. — 1) en 1893 acc. norm. enf. v. s. m. puis bib. b. p.; 2) en 1897 acc. norm. enf. v. s. m. 14 mois b. p.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 6 h. 1/2; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 3630, le 8^e j. 3600; ét. bon; P. plac. — 540; S. C. — normales.

171. (1899, n^o 2233) a. 37; A. H. — père mort de tuberculose à 32 ans; A. P. — fièvre typhoïde à 7 ans; III-pare m. p.; A. obst. — en 1886 et 1888 deux acc. normaux enf. viv., bib., b. p.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 4 h.; Exp. — 50 m.; enf. viv.; P. enf. — 4000, le 4^e j. 3840; ét. bon; P. plac. — 555; S. C. — normales.

172. (1900, n^o 416) a. 36; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — rougeole dans l'enfance; R. — 19 a.; III-pare m. p.; A. obst. — 1) en 1893 acc. norm. enf. viv. s. m. 2 mois, puis nourrice, b. p.; — 2) en 1895 avortem. de 3 mois; a. gr. — à terme; tr. alb.; enf. viv.; P. enf. — 3300, le 9^e j. 3400; P. plac. — 560; S. C. — normales.

Obs. — Utérus cordiforme. — Présentation du siège.

173. (1900, n^o 670) a. 25; A. H. — père mort de tuberculose à 35 ans; A. P. — rougeole à 8 ans, coqueluche à 11

ans; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — 9e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. 1/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3220, le 9e j. 3230 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 8 mois de diarrhée.

« (1901, no 2056) a. 27 ; III-pare m. p. ; A. Obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. — 9e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 1/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2990, le 8e j. 3200 ; ét. bon ; P. plac. — 380 ; S. C. — normales.

174. (1900, no 1076) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — nuls ; III-pare p. d. ; A. Obst. — en 1895 et 1897 deux acc. normaux enf. viv., le 1er s. m. 11 m. b. p., le 2e bib. mort à 11 mois de tuberculose ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; T. — 5 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3590, le 8e j. 3440 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

Obs. — Le père des deux premiers enfants est mort de tuberculose.

175. (1900, no 1389) a. 26 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — à 2 ans fièvre typhoïde, à 15 ans amygdalite ; III-pare p. d. ; A. obst. — 1) en 1893 avortem. de 6 semaines ; 2° en 1896 acc. norm. enf. viv. s. m. 11 mois b. p. ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 20 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2500 ; le 7e j. 2570 ; ét. bon ; P. plac. — 360 ; S. C. — normales.

Obs. — Dernier rapport conjugal il y a 2 jours.

176. (1900, no 1481) a. 28 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1896 et 1898 deux acc. norm. enf. viv., le 1er s. m. 12 mois b. p., le 2e mort à 22 jours de méningite ; a. gr. — à terme ; pas

d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3830, le 8^e j. 4070 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

177. (1900, no 2068) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose à 43 ans ; A. P. — scarlatine à 8 ans, rougeole à 10 ans ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 et 1898 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 5 m. puis bib. b. p., le 2^e s. m. 12 mois b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4.400, le 8^e j. 4540 ; ét. bon ; P. plac. — 710 ; S. C. — normales.

178. (1900, no 2159) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — fièvre typhoïde à 23 ans ; III-pare m. p. ; A., obst. — 10 en 1898 acc. norm. enf. mort pendant le travail, 2^e en 1899 acc. prém. à 7 mois siège enf. mort-né ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4010 ; le 9^e j. 4190 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

179. (1901, no 381) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 25 ans ; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 et 1899 deux acc. norm. enf. viv. bib. morts à 3 m. 1/2 de diarrhée ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3280, le 6^e j. 3190 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

180. (1901, no 434) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; III-pare m. p. ; A. Obst. — 1) en 1898 acc. prém. à 8 m. enf. mort 5 jours après de convulsions ; 2) en 1900 acc. prém. à 7 m. 1/2 enf. mort quelques instants après ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2820, le 6^e j. 2690 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

181. (1901, no 721) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — à 10 ans fièvre typhoïde ; syphilis ; III-pare m. p. ; A. obst. en 1899 et 1900 deux acc. prém. à 7. m. fœtus morts et macérés ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3600, le 8^e j. 3350 ; ét. bon ; P. plac. — 670 ; S. C. — normales.

Obs. — Traitement spécifique pendant la grossesse actuelle.

182. (1901, no 722) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — alb. pendant les 2 grossesses antérieures ; R. — 16 a. ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 et 1900 deux acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 2 h. 3/4 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3020, le 9^e j. 3340 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

183. (1901, no 1306) a. 26 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; III-pare p. d. ; A. obst. — 1) en 1895 acc. norm. enf. viv. s. m. 4 mois puis bib. mort de diarrhée alors ; 2) en 1896 acc. prém. à 8 m. enf. viv. s. n. mort à 6 semaines de diarrhée ; a. gr. — 6 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 850 ; P. plac. 300 ; S. C. — normales.

Obs. — Enfant est mort quelques heures après la naissance.

184. (1901, no 1398) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 18 ans ; III-pare m. p. ; A. Obst. — 1) en 1898 acc. norm. enf. v. bib. b. p. ; 2) en 1899 acc. prém. à 7 m. enf. viv. s. m. mort à 2 mois de convulsions ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 1 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. P. enf. — 2850, le 8^e j. 2970 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

185. (1902, no 84) a. 18 ; A. H. — père mort de tuberculose

à 39 ans; A. P. — rougeole et petite variole dans le jeune âge; III-pare m. p.; A. Obst. — 1) en 1899 acc. prém. à 7 m. enf. mort 2 jours après; 2) en 1900 acc. norm. enf. viv. nourrice mort à 6 semaines d'athrepsie; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 2 h. 14; enf. viv.; P. enf. — 3200, le 11^e j. 3100; ét. bon; P. plac. — 470; S. C. — lymphangite du sein gauche.

186. (1902, n^o 100) a. 25; A. H. — père mort de tuberculose à 32 ans; A. P. — Scarlatine à 7 ans, rougeole à 11 ans, ostéomyélite du tibia droit à 12 ans; III-pare m. p.; A. Obst. — 1) en 1897 acc. à terme siège enf. viv. s. m. 12 jours puis bib. mort à 6 m. de diarrhée; 2) en 1899 acc. norm. enf. viv. s. m. 9 mois b. p.; a. gr. — 8 m.; pas d'alb.; Tr. — 3 h.; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 2650, le 13^e j. 2580; ét. bon; P. plac. — 480; S. C. — lymphangite du sein gauche.

187. (1902, n^o 1804) a. 34; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans; A. P. — rougeole à 8 ans; R. — 17 a. irrégul.; III-pare m. p.; A. Obst. — en 1895 et 1897 — deux acc. normaux enf. viv., le 1^{er} s. m. 17 mois b. p., le 2^e s. m. 3 mois puis bib. b. p.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 20 h. 1/2; Exp. — 1 h. 20 m.; enf. viv.; P. enf. 3600, le 9^e j. 3620; ét. bon; P. plac. — 830; S. C. — normales.

188. (1903, n^o 71) a. 26; A. H. — père mort de tuberculose à 45 ans; A. P. — à 12 ans fièvre typhoïde; — R. 16 a. irrég.; III-pare m. p.; A. Obst. en 1900 et 1901 deux avortem. de 6 et de 5 m., fœtus morts; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 15 h. 1/2; Exp. — 25 m.; enf. viv.; P. enf. — 2600, le 8^e j. 2530; P. plac. — 350; S. C. — normales.

189. (1903, n^o 417) a. 34; A. H. — père mort de tuberculo-

se à 44 ans ; A. P. — à 6 ans scarlatine, coqueluche, à 7 ans fièvre typhoïde ; R. — 17 a. irrég. ; III-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1899 acc. à 6 m. 1/2 enf. mort 12 h. après ; 2) en 1895 acc. norm. enf. viv. s. n. 21 mois b. p. ; a. gr. — ? ; alb. ; Tr. — 9 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. 35 m. ; enf. mort ; P. enf. — 3440 ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

Obs. — Insertion vélamenteuse du cordon. Procubitus du cordon. Réduction impossible. Enfant mort pendant le travail. Hémorrhagie de la délivrance.

190. (1903, n° 539) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose à 51 ans, deux sœurs mortes de tuberculose, une sœur vivante b. p. ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. ; A. Obst. — 1) en 1899 acc. norm. enf. viv. s. m. 22 mois b. p. ; 2) en 1901 avortem. œuf complet de 35 gr. ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3040, le 8^e j. 2960 . P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

191. (1903, n° 1265) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose à 44 ans ; A. P. — Anémie jusqu'à l'âge de 13 ans ; R. — 12 ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 et 1902 deux acc. normaux enf. viv. bib., le 1^{er} mort à 5 semaines, le 2^e b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2520, le 7^e j. 2380 ; ét. bon ; P. plac. — 370 ; S. C. — normales.

192. (1898, n° 899) a. 34 ; A. H. — père mort de tuberculose à 35 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance et coqueluche, fièvre typhoïde à 11 ans ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — 1) en 1887 acc. norm. enf. viv. b. p. ; 2) en 1889 avortem. de 6 semaines ; 3) en 1890 acc. à terme, épaule, version, enf. viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h ; Exp. —

15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3850, le 4^e j. 3550 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

193. (1898, no 2115) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 40 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance, à 16 ans fièvre typhoïde ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — en 1895, avortem. de 4 mois, en 1896 et 1897 deux acc. normaux enf. viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3650, le 5^e j. 3680 ; ét. bon ; P. plac. — 660 ; S. C. — normales.

194. (1898, no 2250) a. 19 1/2 ; A. H. — père mort de tuberculose à 32 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; I-pare ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3190, le 7^e j. 3090 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 3 ans de croup.

« (1901, no 972) a. 22 ; II-pare p. d. ; A. Obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. 1/4 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3930, le 8^e j. 4050 ; ét. bon ; P. plac. — 590 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 18 mois de fluxion de poitrine.

« (1904, no 235) a. 24 ; IV-m. p. ; A. Obst. (1^{re} et 2^e v. ci-dessus) ; 3) en 1902 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3020, le 8^e j. 3130 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur.

195. (1899, no 72 a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose à 34 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; III-pare

m. p. ; A. Obst. 1) en 1895 acc. à 8 m ; enf. viv., mort à 13 mois de méningite ; 2) en 1897 acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. $1/4$; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3540, le 7^e j. 3810 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

« (1900, n^o 2441) a. 25 ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. $1/2$; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3400, le 10^e j. 3650 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

Obs. — Le 3^e enfant, élevé au sein maternel 14 mois, était viv. et bien portant à l'époque du 4^e accouchement de cette femme.

196. (1899, n^o 801) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose à 44 ans ; A. P. — nuls ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — en 1895 et 1896 deux acc. norm. enf. viv. 5 m., morts à un an de méningite tuberculeuse ; 3) en 1897 acc. gémellaire à 6 mois, enf. morts 1 h. $1/2$ après la naissance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. $1/2$; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3580, le 7^e j. 3650 ; ét. bon ; P. plac. — 690 ; S. C. — normales.

Obs. — Le mari de cette femme est mort de tuberculose il y a 8 mois.

197. — (1899, n^o 877) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — en 1895 et 1896 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 13 m. b. p., le 2^e s. m. mort à 1 mois ; 3) en 1897 avortem. de 4 mois ; a. gr. — à terme ; alb. légère ; Tr. — 18 h. $3/4$; Exp. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 7^e j. 3270 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

198. (1900, n^o 805) a. 26 ; A. H. — père mort de tuberculose

à 43 ans ; A. P. — syphilis ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — en 1896, 1897 et 1898 trois avortem. de 6 mois, fœtus morts et macéré ; a. gr. — 9e m. ; tr. alb. ; Tr. — 3 h. ; Exp. — 25 m. ; enf. mort macéré ; P. enf. — 3000 ; P. plac. — 870 ; S. C. — normales.

199. (1900, no 908) a. 23 ; A. H. — père mort de tuberculose laryngée ; A. P. — fièvre typhoïde à 17 ans ; III-pare m. p. pour 2 dern. ; A. Obst. — 1) en 1896 acc. norm. enf. viv. s. m. 3 mois puis bib. b. p. ; 2) en 1899 acc. prém. à 7 m. ; enf. mort et macéré ; a. gr. — 8 m. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. mort et macéré ; P. enf. — 2740 ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

Obs. — présentation du siège complet.

« (1701, no 938) a. 24 ; IV-pare m. p. ; A. Obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/4 ; Exp. 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3960, le 7e j. 3700 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

200. (1901, no 100) a. 29 ; A. H. — père mort de tuberculose à 39 ans, un frère mort de tuberculose à 30 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 18 ans ; IV-pare p. d. ; A. Obst. — en 1893 et 1896 deux acc. norm. enf. viv., le 1er s. m. mort à 4 ans de méningite tuberculeuse, le 2e s. m. 20 mois b. p. ; 3e en 1899 acc. prém. à 8 m. enf. mort pendant le travail ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — 2 h. 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3700, le 10e j. 3450 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

Obs. Le père des premiers enfants était tuberculeux.

201. (1901, no 336) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — en 1895, 1896 et 1897 trois acc. normaux ; le 1er enf.

mort pendant le travail, le 2^e enf. viv. s. m. mort à 6 semaines, le 3^e enf. viv. s. m. 2 ans b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 3/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3140 ; P. plac. — 380 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant avait l'imperforation anale. Il est mort le 3^e jour.

202. (1901, n^o 777) a. 43 ; A. H. — père mort de tuberculose à 38 ans, une sœur morte de tuberculose à 14 ans (cette femme est une jumelle, son frère jumeau est b. p.) ; A. P. — nuls ; R. — 22 a. ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — en 1894, 1897 et 1899, trois acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 9 mois b. p., le 2^e s. m. 1 mois puis bib. mort à 3 mois, le 3^e s. m. 13 mois mort 6 jours après le sevrage ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1) 2520, le 6^e j. 2360. — 2) 2420, le 6^e j. 2300 ; ét. bon ; P. plac. — 830 ; S. C. — normales.

Obs. — Grossesse gémellaire (2 filles). Placenta prævia. Rupture prématurée des membranes.

203. (1902, n^o 1069) a. 30 ; A. H. — père mort de tuberculose il y a 30 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 12 ans ; III-pare m. p. pour 2 dern. ; A. Obst. — en 1894 et 1900 deux acc. norm. enf. viv. s. m. 16 mois b. p. ; a. gr. — 4^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/2 ; enf. mort ; P. enf. — 120 ; P. plac. — 140 ; S. C. — normales.

Obs. — Le père du premier enfant est mort de tuberculose. Le deuxième père est peintre en bâtiments.

« (1903, n^o 1890) a. 31 ; IV-m. p. ; A. Obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3220, le 7^e j. 3350 ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

204. (1902, n° 1155) a. 35 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. 1/2 irrégul. ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — en 1894, 1896 et 1901 trois acc. normaux enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3050, le 7^e j. 2890 ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

205. (1903, n° 1671) a. 29 ; A. H. — Père mort de tuberculose, un frère mort de méningite tuberculeuse à 19 ans ; A. P. — nuls ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — 1) en 1896 acc. norm. enf. viv. ; mort à 1 an de méningite ; 2) en 1898 acc. norm. ; 3) en 1899 avortem. de 6 semaines ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 3/4 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3740, le 8^e j. 3880 ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

206. (1898, n° 192) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 33 ans ; A. P. — rougeole et scarlatine dans l'enfance ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1897 avortem. de 2 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. ; Exp. — 1 h. 50 m. ; enf. viv. ; P. enf. 4220, le 9^e j. 4070 ; ét. bon ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel pendant 15 mois, était bien portant en 1903.

« (1903, n° 1150) a. 30 ; V-pare m. p. ; A. Obst. — (v. ci-dessus), en avril et en août 1901 deux avortem. de 2 mois ; a. gr. — 8^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. mort macéré ; P. enf. 2310 ; P. plac. — 850 ; S. C. — normales.

207. (1898, n° 2009) a. 31 ; A. H. — père mort de tuberculose à 32 ans, 3 frères et sœurs morts en bas-âge ; A. P. — variole à 18 mois, — jambes torses jusqu'à 2 ans, — névralgie inter-

costale depuis 20 ans, — ne tousse pas ; IV-pare m. p. pour 3 dern. ; A. Obst. — en 1889, 1893 et 1896 — trois acc. normaux enf. viv., le 1^{er} mort à 3 mois ; le 2^e bib. mort à 6 m. de convulsions, le 3^e s. m. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; enf. viv. ; P. enf. 3580, le 9^e j. 3710 ; ét. bon ; P. pl. — 560 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 3 ans de croup.

« (1903, n^o 1056) a. 36 ; V-pare m. p. ; A. Obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 3/4 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2440, le 9^e j. 2100 ; P. pl. 400 ; S. C. — normales.

Obs. — Le mari de cette femme est tuberculeux.

208. (1898, n^o 2063) a. 28 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; V-pare m. p. ; A. Obst. — en 1889, 1892, 1894 et 1897 quatre acc. normaux enf. viv., le 1^{er} est b. p., les 3 derniers sont morts ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 1/2 ; Exp. ; — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4170, le 7^e j. 3860 ; ét. bon ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

209. (1898, n^o 2197) a. 30 ; A. H. — père mort de tuberculose à 32 ans ; A. P. — à 14 ans arthrite du genou droit ; V-pare — 5 frères différents ; A. Obst. — en 1889, 1891, 1894 et 1897 quatre acc. norm. enf. viv., b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3650, le 8^e j. 3700 ; ét. bon ; P. plac. — 515 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin rétréci. Accouchement spontané.

210. (1898, n^o 2219) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose à 58 ans, une sœur morte de tuberculose à 21 ans ; A. P. — nuls ; IV-pare m. p. ; A. Obst. — en 1892, 1894

et 1896 trois acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. mort à 6 sem., le 2^e s. m. mort à 5 mois de méningite, le 3^e s. m. 26 mois b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3630, le 4^e j. 3470 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, était bien portant à 2 ans.

« (1900, n^o 2310) a. 29 ; V-pare m. p. ; A. Obst. (V. ci-dessus) ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3560, le 8^e j. 3660 ; ét. bon ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

211. (1899, n^o 449) a. 29 ; A. H. — père mort de tuberculose à 33 ans ; A. P. — à 2 ans varicelle, — depuis le 1^{er} acc. troubles de menstruation, leucorrhée ; V-pare p. d. ; A. Obst. — en 1889, 1891 et 1893 trois acc. norm. enf. viv., en 1890 avortem. de 1 mois ; les 3 enf. sont vivants, les 2 premiers s. m., les 2^e et 3^e sont tuberculeux (même père pour tous) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2750, le 8^e j. 3020 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

Obs. — Le premier mari de cette femme est mort de tuberculose.

212. (1899, n^o 1238) a. 32 ; A. H. — père mort de tuberculose à 25 ans ; A. P. — nuls ; R. — 16 1/2 ; V-pare m. p. ; A. Obst. — en 1893, 1894, 1896 et 1897 quatre acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3020, le 7^e j. 2870 ; ét. bon ; P. plac. — 350 ; S. C. — normales.

213. (1900, n^o 309) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose à 44 ans ; A. P. — rougeole et scarlatine dans l'en-

fance, diphtérie à 13 ans. — toujours malade; V-pare : A. Obst. — 1) en 1893 et 1894 deux acc. norm. enf. viv., en 1895 avortem. de 3 m. 1/2, en 1897 acc. prém. à 8 m. siège enf. viv., les 2^e et 3^e enf. s. m. morts de broncho-pneumonie; a. gr. — 9^e m.; alb.; Tr. — 16 h.; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 3200, le 7^e j. 3350; ét. bon; P. plac. — 590; S. C. — normales.

214. (1900, n^o 697) a. 19 1/2; A. H. — père mort de tuberculose à 29 ans; A. P. — coqueluche et scarlatine dans l'enfance; II-pare m. p. (saturn.) ; A. Obst. — en 1899 — avortement; a. gr. — 7^e m.; pas d'alb.; Tr. — 11 h. 1/2; enf. mort et macéré; P. enf. — 750; P. plac. — 250; S. C. — normales.

« (1901, n^o 363) a. 20 1/2; III-pare m. p.; A. Obst. — (v. ci-dessus); a. gr. — 8^e m.; pas d'alb.; Tr. — 11 h. 1/4; Exp. — 15 m.; enf. mort et macéré; P. enf. — 3000; P. plac. — 1040; S. C. — normales.

« (1902, n^o 1768) a. 22; IV-pare p. dif.; A. Obst. — (v. ci-dessus); a. gr. 9 m.; pas d'alb.; Tr. 7 h.; Exp. — 5 m.; enf. viv. faible; P. enf. — 2750; P. plac. — 720; S. C. — normales.

Obs. — Placenta présente des cotylédons hypertrophiés. Enfant mort 10 heures après la naissance.

« (1904, n^o 243) a. 23; V-pare m. p. (pour 2 dern.); A. Obst. (v. ci-dessus); a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 6 h. 1/2; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 3590, le 6^e j. 3360; ét. bon; P. plac. — 650; S. C. — normales.

215. (1901, n^o 9) a. 23; A. H. — père mort de tuberculose à 45 ans; A. P. — rougeole et scarlatine dans l'enfance; R. — 15 1/2; V-pare m. p. pour 4 dern.; A. Obst. — 1) en 1894

acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; 2) en 1896 avortement de 6 m. ; 3) en 1898 acc. gémellaire à 7 m. ; 2 garçons morts 5 h. après, 4) en 1899 acc. norm. enf. mort pendant le travail ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3320, le 9^e j. 3490 ; ét. bon ; P. plac. — 473 ; S. C. — normales.

216. (1901, no 1053) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 40 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance, dyssentérie à 23 ans ; V-pare m. p. ; A. Obst. — 1) en 1896 acc. norm. enf. viv. s. m. 7 mois puis bib. b. p. ; 2) en 1897 acc. prém. à 7 m. siège enf. viv. — mort à 3 semaines ; 3) en 1897 avortem. de 6 semaines ; 4) en 1898 acc. norm. enf. viv. s. m. 1 an mort à 2 ans de dysentérie ; a. gr. 2 m. ; pas d'alb. ; œuf entier de 45 gr. ; S. C. — normales.

Obs. — A la suite d'un rapport conjugal, cette femme a eu une hémorrhagie continue et accouche 3 jours après.

217. (1898, no 681) a. 30 ; A. H. — père mort de tuberculose à 34 ans ; A. P. — nuls ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1889, 1891, 1894 et 1897 quatre acc. normaux, en 1895 avortem. de 3 mois, les 3 premiers enf. s. m. ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 2530, le 11^e j. 2580 ; ét. bon ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes.

218. (1899, no 2285) a. 35 ; A. H. — père mort de tuberculose à 29 ans ; A. P. — nuls ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1885, 1887, 1891, 1894 et 1897 cinq acc. normaux enf. viv., le 1^{er} enf. mort à 15 j. d'entérite, les autres sont b. p., les 2 derniers s. m. pendant 20 mois ; a. gr. — à terme : pas d'alb. ;

Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3680, le 9^e j. 3770 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

219. (1900, n^o 572) a. 36 ; A. H. — père mort de tuberculose il y a 27 ans ; A. P. — nuls ; VI-pare m. p. pour 5 dern. (mort albuminurique) ; A. obst. — 1) en 1883 acc. prém. à 7 m. 1/2 enf. viv. s. m. 7 mois b. p. (son père est mort alcoolique), en 1892, 1893 et 1894 trois acc. norm. enf. viv. élevés à la cuillère, tous morts, 5) en 1898 avortem. de 4 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. 3650, le 7^e j. 3770 ; ét. bon ; P. plac. — 630 ; S. C. — normales.

220. (1900, n^o 1010) a. 31 ; A. H. — père mort de tuberculose à 36 ans ; A. P. — à 6 ans fièvre typhoïde, à 22 et 30 ans rhumatisme artic. aigu ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1890 et 1892 deux acc. norm. enf. viv. b. p. ; le 2^e s. m. 14 mois, en 1894, 1895 et 1898 trois avortem. ; a. gr. — 4 m. ; pas d'alb. ; fœtus mort ; S. C. — normales.

Obs. — Avortement fait en ville. Curage digital de l'utérus.

221. (1900, n^o 1411) a. 31 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — atrophie de l'avant-bras gauche ; VI-pare m. p. ; A. Obst. — en 1887 et 1892 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} bib. b. p., le 2^e s. m. 9 mois b. p., en 1895, 1896 et 1898, trois avortem., a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 17 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3550, le 10^e j. 3870 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — périphlébite à la face interne de la jambe droite.

Obs. — Femme sortie en bon état.

222. (1900, n^o 2025) a. 34 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; VI-pare m. p. ; A. Obst. — en 1889, 1891,

1895, 1897 et 1898 cinq acc. norm. enf. viv. b. p., tous bib. sauf le 4^e (s. m. 18 mois) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/4 ; enf. viv. ; P. enf. — 1) 2800, le 8^e j. 2790 ; — 2) 2820, le 8^e j. 2780 ; ét. bon ; P. plac. — 990 ; S. C. — normales.

Obs. — Accouchement gémellaire.

223. (1900, no 1340) a. 36 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — scarlatine, rougeole, pneumonie dans l'enfance, angines à 10 et à 11 ans, chlorose à 18 ans ; VI-pare m. p. ; A. Obst. — en 1886 et 1888 deux acc. à terme, face, forceps, enf. viv. s. m. 17 et 18 m., le 1^{er} b. p., le 2^e mort à 5 ans tde méningite, en 1890 — insert. vic. du plac. acc. provoqué basiotripsie, en 1894 — acc. norm. enf. viv. s. m. 17 m. b. p., en 1897 acc. à terme siège enf. mort pend. le travail ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. 1/4 ; enf. mort ; P. enf. — 3600 (sans la substance cérébrale) ; P. plac. — 780 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin vicié. Enfant mort pendant le travail. Basiotripsie. Délivrance artificielle.

224. (1900, no 2113) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose il y a 16 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance, vers 15 ans chlorose pend. 8 mois ; R. — 17 a. irrég. ; IV-pare p. d. (le 1^{er} mari mort de tuberculose) ; A. Obst. — en 1896, 1897 et 1899 trois acc. norm. enf. viv., les 2 prem. bib. b. p., le 3^e s. m. 1 mois puis bib. mort à 5 mois de tuberculose ; a. gr. — 7 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 5 m., enf. viv. ; P. enf. — 1850 ; P. plac. — 390 ; S. C. — normales.

Obs. — La femme avait avant l'accouchement : températ. 38°5 et pouls : 104. — Enfant mort 12 heures après la naissance.

« (1903, no 284) a. 29 ; VI-pare m. p. pour 3 dern. ; A.

obst. — (v. ci-dessus), le 2^e enf. est mort à 3 ans 1/2 de croup; 5) en 1901 acc. prém. à 7 m., épaule, version, enf. viv., mort 15 jours après; a gr. — 8 m.; pas d'alb.; Tr. — 15 h. 1/4; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 2410, le 9^e j. 2170; P. plac. — 400; S. C. — normales.

225. (1901, n^o 899) a. 32; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — rougeole plusieurs fois (?), la dernière fois à 16 ans, scarlatine à 3 ans; R. — 16 a.; VI-pare m. p.; A. obst. — en 1887, 1890, 1892, 1895 et 1898 cinq acc. norm. enf. viv. s. m. 22 mois b. p.; a. gr. — à terme; Tr. — 5 h.; Exp. — 1 h. 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 3470, le 6^e j. 3700; P. plac. — 560; S. C. — normales.

226. (1902, n^o 1846) a. 33; A. H. — père mort de tuberculose à 36 ans; A. P. — à 30 ans rhumatisme artic. aigu, depuis douleurs vagues dans les articulations, pas de lésions cardiaques; V-pare m. p.; A. obst. — en 1888, 1892, 1896 et 1899 quatre acc. normaux enf. viv. s. m. b. p.; a. gr. — près du terme; alb. légère; Tr. — 4 h. 1/2; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 2550, le 9^e j. 2700; ét. bon; P. plac. — 490; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant était allaité par la mère pend. 6 semaines, quand une attaque de rhumatisme a pris de nouveau la femme. On a mis donc alors enfant au biberon. Il était bien port. à 2 ans.

» (1904, n^o 192) a. 35; VI-pare m. p.; A. obst. (v. ci-dessus); a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 6 h.; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 4700, le 11^e j. 4670; P. plac. — 700; S. C. — normales.

227. (1903, n^o 1079) a. 34; A. H. — père mort de tuberculose à 40 ans (cette femme est une jumelle née à 7 mois, sa

sœur est bien portante ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1889, 1891, 1893, 1894 et 1899 cinq acc. normaux enf. viv. s. m. 12 mois (sauf le 3^e), les 1^{er}, 2^e et 5^e sont b. p., le 3^e mort à 6 mois de méningite, le 4^e mort à 5 ans d'accident ; a. gr. — 7^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — instantanée ; fœtus mort et macéré ; P. enf. — 740 ; P. plac. — 210 ; S. C. — normales.

Obs. — Le cordon ombil. était fortement tordu sur lui-même (5 tours de spire) et présentait 2 rétrécissements considérables.

228. (1903, no 2110) a. 41 ; A. H. — père mort de tuberculose à 38 ans ; A. P. — nuls ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1884, 1892, 1893, 1898 et 1901, cinq acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. sauf le 2^e, mort à 11 mois de coqueluche ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3620, le 9^e j. 4020 ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

229. (1898, no 2147) a. 24 ; A. H. — père mort de tuberculose à 28 ans, 5 frères et sœurs morts de tuberculose ; A. P. — diphtérie à 16 ans ; VII-pare m. p. ; A. obst. — en 1892, 1893 et 1895 — trois acc. norm., en 1895, 1896 et 1897 trois avortem., les 2 prem. enf. s. m. viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 9 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3300, le 9^e j. 3370 ; ét. bon ; P. plac. — 660 ; S. C. — normales, alb. disparaît.

230. (1900, no 17) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — rougeole à 5 ans ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 et 1896 deux acc. prém. à 8 m. enf. viv., en 1897 acc. norm. enf. viv., en 1898 avortem. de 3 m. 1/2, les enf. bib., le 1^{er} mort à 9 mois, les deux autres b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf.

viv. ; P. enf. — 3860, le 5^e j. 3780 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant élevé au biberon est mort 15 jours après la naissance.

« (1902, no 1283) a. 30 ; VII-pare m. p. ; A. obst. (v. ci-dessus) ; 6) en 1901 acc. norm. enf. viv. bib. ; a gr. — 2 m. ; S. C. — ictere qui disparaît le 3^e jour après l'avortement.

Obs. — Avortement fait en ville.

231. (1899, no 1196) a. 36 ; A. H. — Père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — nuls ; IX-pare p. d. ; A. obst. — sept. acc. norm., un acc. prém. à 7 m., enf. bib., le 1^{er} b. p., les autres morts à quelques mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3550, le 6^e j. 3600 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

232. (1901, no 143) a. 39 ; A. H. — Père mort de tuberculose ; A. P. — ? ; IX-pare m. p. pour 6 dern. ; A. obst. — sept acc. norm., un acc. prém. à 7 mois, enf. s. m., les 5 enf. sont morts, les 2 sont viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/2 ; Exp. 30 m. ; enf. mort sitôt né ; P. enf. — 3870 ; P. plac. 950 ; S. C. — normales.

Obs. — Gros œuf. Excès de liquide.

233. (1901, no 958) a. 41 ; A. H. — père mort de tuberculose à 48 ans, un frère tuberculeux ; A. P. — nuls ; XIV-pare m. p. pour 2 dern. (le 1^{er} mari mort de tuberculose) ; A. obst. — treize acc. normaux (le dernier en 1895) enf. viv. s. m. quelque temps puis bib., tous morts d'entérite entre 1 et 6 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 1/4 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4180, le 8^e j. 4160 ; ét. bon ; P. plac. — 610 ; S. C. — normales.

234. (1902, no 1692) a. 41 ; A. H. — père mort de tubercu-

lose à 39 ans ; A. P. — nuls ; R. — 12 a. ; XVI-pare m. p. ; A. obst. — depuis 1875 (à 14 ans 1/2) jusqu'à décembre 1900 quatorze acc. normaux, en 1884 — un acc. prém. à 7 m. siège, enf. mort-né, des autres enfants : 1 est mort pend. le travail, les autres s. m., 5 morts de convulsions, 1 mort d'angine à 5 ans, 7 viv. b. p. ; a. gr. — 9e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 1/2 ; Exp. — 3 h. 1/2 ; enf. mort ; P. enf. — 4100 ; S. C. — normales.

Obs. — Siège décomplété mode des fesses. — Placenta sur le segment inférieur. Enfant mort pendant le travail.

TABLEAU II. — *Parturientes non tuberculeuses.*
Prédisposition à la tuberculose par hérédité du
côté de la mère.

A. — *Primipares.*

1. (1898, n° 13) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 23 ans ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 27 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3580, le 11^e j. 3480 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

2. (1898, n° 114) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — scarlatine à 18 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Exp. — 1 h. 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2480, le 8^e j. 2530 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

3. (1898, n° 441) a. 29 1/2 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — fièvre typhoïde à 20 ans ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 27 h. ; Exp. — 5 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3220, le 8^e j. 3190 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin rétréci. Application de forceps dans l'excavation pour modification des bruits du cœur. Paralyse faciale gauche.

4. (1898, n° 724) a. 21 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. —

8 h. 1/2 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2980, le 8e j. 2870 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

5. (1898, no 934) a. 36 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 42 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 4 h. 1/4 ; enf. viv. ; P. enf. — 2710, le 9e j. 2710 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

Obs. — Utérus fibromateux. Bruits du cœur irréguliers. Rotation incomplète. Application de forceps dans l'excavation.

6. (1898, no 2032) a. 21 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 7 ans ; R. — 16 a. ; a. gr. — 9e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 17 h. ; Exp. — 50 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2560, le 5e j. 2400 ; ét. bon ; P. plac. — 350 ; S. C. — alb. ; pas de fièvre.

Obs. — Femme sortie en bon état.

7. (1898, no 2266) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 29 h. ; Exp. — 1 h. 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2370, le 8e j. 2390 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — lymphangite des deux seins.

8. (1898, no 2283) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 40 ans ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. ; a. gr. — 3e m. ; pas d'alb. ; S. C. — normales.

Obs. — Avortem. fait avant l'entrée de la femme dans le service. — Délivrance faite quelque temps après son entrée.

9. (1899, no 204) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2550, le 8e j. 2310 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — alb., pas de fièvre.

10. (1899, no 223) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuber-

culose, père alcoolique ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3750, le 7^e j. 2750 ; ét. bon ; P. plac. — 440 ; S. C. — normales.

11. (1899, n^o 267) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — fièvre typhoïde à 13 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 3/4 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3595, le 9^e j. 3500 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

12. (1899, n^o 329) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 18 a. irrég. ; a. gr. — 9^e m. (?) ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/2 ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2500, le 8^e j. 2660 ; ét. bon ; P. plac. — 490 ; S. C. — lymphangite des deux seins.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes.

13. (1899, n^o 687) a. 19 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 25 h. 1/4 ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2800, le 8^e j. 2770 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — angine avec fièvre.

Obs. — Femme sortie en bon état.

14. (1899, n^o 1007) a. 19 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 17 Exp. ; h. — 50 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2750, le 8^e j. 2970 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

15. (1899, n^o 1036) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 39 ans ; A. P. — rougeole à 12 ans ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 48 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2000 ; P. plac. — 300 ; S. C. — normales.

Obs. — Fœtus araignée, mort le 2^e jour.

16. (1899, n^o 1055) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuber

culose à 44 ans ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. $3/4$; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2780, le 8^e j. 2550 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

17. (1899, n^o 1376) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 44 ans ; A. P. — rougeole à 6 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 20 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2920, le 8^e j. 3030 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

18. (1899, n^o 1779) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — sujette à des évanouissements ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 19 h. ; Exp. — 2 h. 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3480, le 9^e j. 3400 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Application de forceps dans l'excavation pour défaut de progression de tête.

19. (1899, n^o 1897) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 25 ans ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. $3/4$; Exp. 1 h. 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3150, le 9^e j. 3300 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

20. (1899, n^o 2045) a. 30 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 30 ans ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 27 h. ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3420, le 10^e j. 3070 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — un peu fébriles d'abord, puis normales.

21. (1899, n^o 2198) a. 31 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 19 a. irrég. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. $1/2$; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3070, le 9^e j. 3140 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin rétréci. Accouchement spontané.

22. (1899, n° 2216) a. 21 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme, pas d'alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 1 h. s. m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3250, le 13^e j. 3010 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — lymphangite du sein gauche.

23. (1899, n° 2224) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans ; A. P. — varicelle à 2 ans, fièvre muqueuse à 10 ans, rhumatisme artic. aigu à 22 ans ; a. gr. — 8 m. ; forte alb. ; Tr. — 12 h. ; Exp. — 15 m. ; P. enf. viv. ; enf. — 2430, le 8^e j. 2350 ; ét. bon ; P. plac. — 455 ; S. C. — alb., lymphangite du sein droit.

Obs. — Enfant mis chez une nourrice. Femme sortie en bon état 1 mois 1/2 après l'accouchement.

24. (1899, n° 2312) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans ; A. P. — angines, à 5 ans chorée qui disparaît à l'apparition des règles pour réapparaître à 20 ans ; R. — 16 a. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. 11 h. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2600, le 9^e j. 2720 ; ét. bon ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

25. (1899, n° 2333) a. 17 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 28 ans ; A. P. — rougeole à 2 ans ; a. gr. — à terme ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2700, le 10^e j. 3170 ; ét. bon ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

26. (1899, n° 2387) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 29 ans, un frère tuberculeux ; A. P. — rougeole à 2 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. ; Exp. — 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2950, le 10^e j. 3050 ; ét. bon ; P. plac. — 250 ; S. C. — normales.

27. (1899, n° 2413) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rhumatisme artic. subaigu ; a. gr. — à terme ;

tr. alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 1 h. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3130, le 9^e j. 3250 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

28. (1899, no 2418) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2470, le 12^e j. 2280 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — lymphangite du sein gauche.

Obs. — Bassin rétréci. Accouchement spontané.

29. (1900, no 12) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; enf. viv. ; P. enf. — 2960, le 8^e j. 2470 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

30. (1900, no 462) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole dans l'enfance, à 18 ans albuminurie (?) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 31 h. ; Exp. 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3240, le 8^e j. 3150 ; ét. bon ; P. plac. — 555 ; S. C. — normales.

31 (1900, no 1062) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole et scarlatine dans l'enfance, rhumatisme artic. aigu à 13 et 22 ans ; R. — 16 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 23 h. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2950, le 9^e j. 3130 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

32. (1900, no 1074) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3060, le 8^e j. 2920 ; ét. bon ; P. plac. — 390 ; S. C. — normales.

33. (1900, no 1146) a. 34 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 20 ans ; A. P. — à 2 ans rachitisme (cyphose dorso-lombaire), à 16 ans fièvre typhoïde ; R. — 19 a. ; a. gr. —

près du terme ; Tr. — 16 h. ; Exp. — 6 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3160, le 24^e j. 3470 ; ét. bon ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin cyphotique. Symphyséotomie. Forceps. Délivrance artificielle.

34. (1900, n^o 1401) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; a. gr. — 9^e m. ; tr. alb. ; Tr. — 6 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. P. ; enf. — 2720, le 9^e j. 2630 ; ét. bon ; P. plac. — 300 ; S. C. — normales.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur.

35. (1900, n^o 1488) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 31 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance, influenza à 12 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/2 ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2570, le 6^e j. 2480 ; ét. bon ; P. plac. — 375 ; S. C. — normales.

36. (1900, n^o 1639) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. ; Exp. — 1 h. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2500, le 10^e j. 2720 ; ét. bon ; P. plac. — 410 ; S. C. — lymphangite du sein droit.

37. (1900, n^o 2091) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. 16 a. irrég. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1920, le 17^e j. 2260 ; ét. bon ; P. plac. — 340 ; S. C. — lymphangite du sein droit.

38. (1900, n^o 2145) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole dans l'enfance, chlorose à 18 ans ; R. — 16 a. ; a. gr. — 8^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 2270, le 12^e j. 2080 ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège décomplété mode des fesses. Insertion du placenta sur le segment inférieur.

39. (1900, n° 2255) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance; a. gr. à terme; pas d'alb.; Tr. — 25 h.; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3300, le 8^e j. 3360; ét. bon; P. plac. — 500; S. C. — normales.

40. (1900, n° 2276) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans; A. P. — nuls; R. — 18 a. irrégul.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 23 h. 1/2; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 3010, le 8^e j. 3080; ét. bon; P. plac. — 440; S. C. — normales.

41. (1901, n° 123) a. 22; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — nuls; a. gr. à terme; pas d'alb.; Tr. — 20 h. 1/2; enf. viv.; P. enf. — 3250, le 8^e j. 3030; ét. bon; P. plac. — 540; S. C. — normales.

Obs. — Présent. du siège décomplété mode des fesses: Vaginite graguleuse. Végétations vulvaires.

42. (1901, n° 154) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 33 ans; A. P. — coqueluche à 10 ans; R. — 20 a.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 12 h.; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 3030, le 9^e j. 2780; ét. bon; P. plac. — 470; S. C. — normales.

43. (1901, n° 229) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — rougeole à 4 ans, psoriasis à l'âge de 8 ans; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 12 h. 3/4; Exp. — 50 m.; enf. viv.; P. enf. — 3320, le 8^e j. 3820; ét. bon; P. plac. — 610; S. C. — normales.

44. (1901, n° 281) a. 29; A. H. — mère morte de tuberculose à 30 ans; A. P. — chloro-anémie de 22 à 24 ans; R. —

18 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. 2620, le 6^e j. 2460 ; ét. bon ; P. plac. — 340 ; S. C. — normales.

45. (1901, n° 539) a. 18 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 54 ans, un frère (à 31 ans) et 2 sœurs (à 24 ans et 27 ans) — morts de tuberculose, 3 frères vivants ; A. P. — chloro-anémie à 17 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2720, le 8^e j. 2880 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

46. (1901, n° 696) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 45 ans ; A. P. — enfance malade ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2920, le 8^e j. 3020 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — alb., pas de fièvre.

47. (1901, n° 800) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/4 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 14^e j. 3170 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

Obs. — Double luxation congénitale de la hanche.

48. (1901, n° 994) a. 18 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3020, le 9^e j. 3170 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — une fois températ. = 38°1.

49. (1901, n° 1004) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 31 ans ; A. P. — coqueluche à 3 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 3/4 ; Exp. 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2950, le 10^e j. 2980 ; ét. bon ; P. plac. — 370 ; S. C. — normales.

50. (1901, n° 1086) a. 16 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr.

— 4 h. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3000, le 9^e j. 2920 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

51. (1901, n^o 1190) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; a. gr. — 9^e m. ; alb. ; Tr. — 18 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 3500, le 18^e j. 3500 ; ét. bon ; P. plac. — 610 ; S. C. — normales.

Obs. — Hémorrhagie de la délivrance.

52. (1901, n^o 1233) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans ; A. P. — coqueluche dans l'enfance ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. 1/2 ; Exp. ; 2 h. 20 m. enf. viv. ; P. enf. — 3350, le 7^e j. 2830 ; ét. bon ; P. plac. — 625 ; S. C. — normales.

53 (1901, n^o 1271) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. 8^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; — Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2240, le 9^e j. 2230 ; ét. bon ; P. plac. — 370 ; S. C. — normales.

54. (1901, n^o 1284) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — Rougeole à 8 ans, fièvre typhoïde à 20 ans ; a. gr. 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. 3/4 ; Exp. — 5 m. ; enf. mort macéré ; P. enf. — 2350 ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

55. (1901, n^o 1375) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — gastrite à 14 ans ; a. gr. — à terme alb. (?) ; Tr. — 32 h. ; enf. mort ; P. enf. — 3200 (sans subst. cérébrale) ; P. plac. — 610 ; — S. C. — alb. les premiers jours, les 2^e, 3^e et 4^e jours, températ. au-dessus de 38^o.

Obs. — Enfant mort pendant le travail. Basiotripsie. — Femme sortie en bon état.

56. (1901, n^o 1381) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuber-

culose à 32; A. P. — scarlatine à 5 ans; rougeole à 16 ans, angine à 18 ans; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 8 h.; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 3450; le 8^e j. 3600; ét. bon; P. plac. — 730; S. C. — normales.

57. (1901, n^o 1338) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans; A. P. — rougeole à 3 ans: fièvre typhoïde à 7 ans; dilatation de l'estomac à 22 ans; R. — 19 a. irrég.; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 12 h. 1/2; Exp. — 10 m; enf. viv.; P. enf. — 2400, le 9^e j. 2600; ét. bon; P. plac. 360; S. C. — normales.

58. (1901, n^o 1453) a. 20; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — rougeole à 5 ans; a. gr. — 9^e m. (3); pas d'alb.; Tr. — 5 h.; Exp. — 25 m.; enf. viv. faible; P. enf. 1870; P. plac. — 420; S. C. — normales.

Obs. — Enfant mort le lendemain de la naissance.

59. (1901, n^o 1592) a. 15 1/2; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — rougeole à 10 ans; céphalées fréquentes; R. — 11 a., leucorrhée depuis; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 7 h. 1/2; Exp. — 50 m; enf. viv.; P. enf. 3320, le 8^e j. 3250; ét. bon; P. plac. — 510; S. C. — normales.

60. (1901, n^o 1721) a. 17; A. H. — mère morte de tuberculose à 33 ans; A. P. — nuls; a. gr. — 8 m.; tr. alb.; Tr. — 5 h. 1/2; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 2420, le 9^e j. 2290; ét. médiocre; P. plac. — 450; S. C. — Alb., — température une fois 380.

61. (1901, n^o 1849) a. 22; A. H. — mère morte de tuberculose à 26 ans; A. P. — rougeole dans l'enfance, scarlatine à 19 ans; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 47 h.; Exp. — 1 h.; enf. viv.; P. enf. — 2950, le 9^e j. 2800; ét. bon; P. plac. 493; S. C. — normales.

Obs. — Dernier rapport conjugal la veille du début de travail.

62. (1901, n° 2014) a. 24; A. H. — mère morte de tuberculose à 46 ans; A. P. — à 12 ans paralysie infantile, atrophie du membre infér. gauche; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 15 h. 1/2; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 3160, le 9^e j. 3430; ét. bon; P. plac. — 530; S. C. — normales.

63. (1901, n° 2116) a. 19; A. H. — mère morte de tuberculose à 38 ans; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance; R. — 17 a.; a. gr. — 8 m.; pas d'alb.; Tr. — 7 h. 1/2; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 2450, le 8^e j. 2500; ét. bon; P. plac. — 460; S. C. — normales.

64. (1902, n° 14) a. 26; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans; R. — 16 a.; A. P. — à 18 ans chloro-anémie pendant 5 mois avec suppression des règles; a. gr. — 8 m.; pas d'alb.; Tr. — 9 h. 1/2; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 2400, le 9^e j. 2300; ét. bon; P. plac. — 420; S. C. — lymphangite des deux seins.

65. (1902, n° 86) a. 19; A. H. — mère morte de tuberculose à 30 ans; A. P. — nuls; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 11 h.; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 2800, le 9^e j. 3220; ét. bon; P. plac. — 530; S. C. — normales.

Obs. — Vaginite granuleuse et leucorrhée depuis le début de la grossesse.

66. (1902, n° 90) a. 17; A. H. — mère morte de tuberculose à 46 ans; A. P. — rougeole à 6 mois; a. gr. — près du terme; pas d'alb.; Tr. 15 h. 1/2; Exp. — 43 m.; enf. viv.; P. enf. — 3000, le 9^e j. 2930; P. plac. — 450; S. C. — normales.

67. (1902, n° 315) a. 32; A. H. — mère morte de tuber-

culose à 25 ans; A. P. — nuls; a. gr. — 9^e m.; Exp. — 55 m.; enf. viv.; P. plac. — 3140, le 4^e j. 2910; ét. bon; P. plac. — 480; S. C. — normales.

68. (1902, n^o 343) a. 20; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans (il y a 9 ans); A. P. — nuls; R. — 18 a.; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 6 h. 3/4; Exp. — 1 h.; enf. viv.; P. enf. — 2420, le 8^e j. 2370; ét. bon; P. plac. — 440; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège complet.

69. (1902, n^o 405) a. 24; A. H. — mère morte de tuberculose à 40 ans; A. P. — nuls; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 12 h. 1/2; Exp. — 1 h.; enf. viv.; P. enf. — 3320, le 10^e j. 3600; ét. bon; P. plac. — 500; S. C. — normales.

70. (1900, n^o 462) a. 19; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — nuls; a. gr. — 8 m.; pas d'alb.; Tr. — 3 h. Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 2780, le 9^e j. 3040; ét. bon; P. plac. — 500; S. C. — normales.

71. (1902, n^o 547) a. 22; A. H. — mère morte de tuberculose à 49 ans; A. P. — rougeole dans l'enfance, angine à 10 ans; a. gr. — 4 m.; pas d'alb.; enf. mort; P. enf. — 150; P. plac. — 150; S. C. — normales.

Obs. — Dernier rapport conjugal il y a 3 jours. Hémorrhagie continue depuis 2 jours.

72. (1902, n^o 566) a. 20; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans; A. P. — fièvre typhoïde à 18 ans; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 14 h.; Exp. — 10 m.; enf. viv. P. enf. — 3630, le 5^e j. 3520; ét. bon.; P. plac. — 550; S. C. — normales.

73. (1902, n^o 866) a. 22; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans; A. P. — rougeole à 3 ans, fièvre typhoïde

à 20 ans ; R. — 17 a. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2590, le 7^ej. 2560 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — crevasses des seins.

74. (1902, n^o 947) a. 30 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 34 ans ; A. P. — rougeole et bronchite dans l'enfance, à 6 ans scarlatine, à 12 ans fièvre typhoïde, à 18 ans, anémie ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 14 h. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050 ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

Obs. — Enfant parti en nourrice le lendemain de sa naissance.

75. (1900, n^o 1003) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose il y a 19 ans ; A. P. — rhumatisme aigu à 14 ans et à 16 ans, depuis douleurs articul. fréquentes ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 17 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 9^ej. 3080 ; P. — plac. — 510 ; S. C. — fébriles : quatre fois température a dépassé 38^o.

Obs. — Femme sortie en bon état.

76. (1902, n^o 1391) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 47 ans ; A. P. — Nuls ; R. — 17 a. ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 14 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3330, le 9^ej. 3450 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

77. (1902, n^o 1467) a. 21 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. 3/4 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2750, le 9^ej. 3030 ; ét. bon ; P. plac. — 440 ; S. C. — lymphangite des deux seins.

78. (1900, n^o 1703) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans ; A. P. — à 9 ans rhumatisme art. aigu,

depuis tous les ans crises de douleurs articulaires ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. 1/4 ; Exp. — 1 h. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 8^e j. 3150 ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

79. (1902, n° 1706) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans ; A. P. — Rougeole dans l'enfance, anémie de 16 à 20 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. 3/4 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3030, le 10^e j. 180 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

80. (1902, n° 1751) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 33 ans ; A. P. — coqueluche à 6 ans, scarlatine à 10 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. — 3220, le 10^e j. 3250 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — lymphangite légère du sein gauche.

81. (1902, n° 1790) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 40 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. 11 1/4 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3530, le 9^e j. 3120 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

82. (1902, n° 1806) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 44 ans ; A. P. — scarlatine à 14 ans ; R. — 14 a., mal, ; a. gr. — (?) ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1420 ; P. plac. — 360 ; S. C. — normales.

Obs. Présentation transversale ; tête ramenée en bas, placenta sur le segment inférieur. Enfant mort le deuxième jour.

83. (1902, n° 1984) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 28 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 19 h. 1/4 ; Exp. — 4 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3670, le 9^e j. 3850 ; ét. bon ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

84. (1903, n^o 58) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; sœur morte de méningite tuberculeuse ; R. — 17 a. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 2450, le 9^e j. 2870 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

85. (1903, n^o 239) a. 19 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 26 ans ; A. P. — à 11 ans fièvre typhoïde, à 17 et à 18 ans érysipèle de la face ; a. g. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 4 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3350, le 8^e j. 3220 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

86. (1903, n^o 793) a. 18 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 44 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. 3/4 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3100, le 8^e j. 3270 ; P. plac. 480 ; S. C. — normales.

87 (1903, n^o 799) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 45 ans ; A. P. — méningite à 11 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 29 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3590, le 7^e j. 3570 ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

88. (1903, n^o 1220) a. 18 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2670, le 9^e j. 2600 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

89. (1903, n^o 1312) a. 32 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 40 ans ; A. P. — rougeole à 6 ans ; a. gr. — 9^e m. ; alb. ; Tr. — 12 h. 1/2 ; Exp. — 50 m. : 1) enf. viv. ; 2) mort-né ; P. enf. — 1) 2170, le 19^e j. 2860 ; 2) 2850 ; P. plac. — 820 ; S. C. — alb., pas de fièvre.

Obs. — Fièvre avant l'accouchement. Accouchement gémellaire.

90. (1903, n° 1350) a. 32 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans ; A. P. — rougeole et variole dans l'enfance, — palpitations ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 27 h. ; Exp. — 2 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 10^e j. 3410 ; ét. bon ; P. plac. — 380 ; S. C. — normales.

91. (1903, n° 1701) a. 19 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/4 ; Exp. — 1 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 9^e j. 3190 ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

92. (1903, n° 1878) a. 30 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — variole à 9 ans ; R. — 17 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 51 h. 1/2 ; Exp. — 5 h. 5 m. ; enf. né en état de mort apparente, ranimé ; P. enf. 3050, le 10^e j. 3070 ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin rétréci ; promontoire accessible. Travail long. Accouchement spontané.

93. (1903, n° 1922) a. 32 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 27 ans ; A. P. — gastralgie depuis l'âge de 22 ans. R. — 19 a. irrégul. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 42 h. ; Exp. — 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3280, le 9^e j. 2920 ; P. plac. — 535 ; S. C. — fissures des seins.

94. (1903, n° 1938) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. 3300, le 6^e j. 2900, P. plac. — 620 ; S. C. — frisson et fièvre, deux fois températ. 39°5, puis normales.

95. (1903, n° 2146) a. 21 ; A. H. — mère morte de tuberculose, trois frères et sœurs morts de méningite tuberculeuse ; A. P. — Scarlatine compliquée d'angine ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 34 h. 1/4 ; Exp. — 1 h. 1/4 ; enf. viv. ;

P. enf. 3700. le 9^e j. 3800 ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

B. — *Multipares.*

96. (1898, n^o 267) a. 28 ; A. H. — nuls ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1889 acc. norm. enf. viv. s. m. 3 mois mort à 6 mois de muguet ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3400, le 10^e j. 3460 ; ét. bon ; P. plac. — 780 ; S. C. — normales.

97. (1898, n^o 322) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole à 2 ans ; R. — 16 a. irrégul. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1894 acc. à terme, siège, enf. viv. s. m. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; tr. alb. ; Tr. — 27 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3000, le 5^e j. 2780 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

98. (1898, n^o 345) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 34 ans ; A. P. — à 21 ans pyélonéphrite à droite (néphrotomie) ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1895, acc. prém. à 8 m. (insert. vic. du placenta) enf. viv. s. m. 14 mois b. p. ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3900, le 12^e j. 4200 ; ét. bon ; P. plac. — 630 ; S. C. — normales.

99. (1898, n^o 365) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 45 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1896 avortem. de 6 mois, fœtus mort macéré ; a. gr. à terme ; alb. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2610, le 19^e j. 2810 ; ét. b ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

100. (1898, n^o 467) a. 22; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. nuls; II-pare m. p.; A. obst. — en 1897 acc. prém. à 8 m. 1/2 enf. viv. élevé chez une nourrice, mort à 15 jours; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 45 h. 1/4; Exp. 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 2900, le 4^e j.; 2650; ét. bon; P. plac. — 460; S. C. — normales.

101. (1898, n^o 661) a. 25; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans; A. P. — nuls; II-pare m. p.; A. obst. — en 1896 acc. norm. enf. viv. s. m. 10 mois mort alors de convulsions; a. gr. — près du terme; tr. alb.; — Tr. 13 h. 1/2; Exp. — 1 h. 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 2720, le 7^e j. 2610; ét. bon; P. plac. 420; S. C. — normales.

Obs. — Siége décomplété mode des fesses.

102. (1892, n^o 865) a. 33; A. H. — mère morte de tuberculose à 42 ans; A. P. — nuls; II-pare m. p.; A. obst. — en 1889 acc. norm. enf. viv. s. m. 7 mois puis bib. b. p.; a. gr. — près du terme; alb.; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 2600, le 9^e j. 2880; ét. bon; P. plac. — 560; S. C. — normales.

103. (1898, n^o 1000) a. 28 ans; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans; A. P. — nuls; II-pare p. d.; A. obst. — en 1892 acc. à terme, forceps; a. gr. — à terme; Tr. — 4 h.; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 3680, le 10^e j. 3250; ét. bon; P. plac. — 550; S. C. — normales.

104. (1898, n^o 1213) a. 35; A. H. — mère morte de tuberculose à 45 ans; A. P. — phlébite double aux jambes il y a 3 mois; R. — 18 a.; II-pare p. d.; A. obst. — en 1893 acc. norm. enf. viv. mort à 6 mois; a. gr. — 9^e mois; pas d'alb.; Tr. — 6 h. 1/2; enf. viv.; P. enf. — 3300, le 9^e j. 3630; ét. bon; P. plac. 510; S. C. — normales.

105. (1898, n° 1639) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1896, acc. norm. ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3080, le 7^e j. 3150 ; ét. bon ; P. plac. — 670 ; S. C. — normales.

106. (1898, n° 1686) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 42 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — avortem. de 2 mois ; a. gr. — 9^e m ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2900, le 15^e j. 3070 ; ét. bon. P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

107. (1898, n° 1821) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans ; A. P. — rougeole à 12 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1896 acc. norm. enf. viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4150, le 9^e j. 4350 ; ét. bon ; P. plac. — 790 ; S. C. — normales.

108. (1899, n° 411) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 41 ans ; A. P. — rougeole et croup ; dans l'enfance ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1895 acc. norm. enf. mort 5 jours après ; a. gr. — 9^e m. ; tr. alb. Tr. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3400, le 8^e j. 3200 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

109. (1899, n° 691) a. 33 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 28 ans ; A. P. — rougeole à 25 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 acc. prém. à 7 m. fœtus mort et macéré ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. P. enf. — 3070, le 8^e j. 3000 ; P. plac. — 490 ; S. C. — normales.

110. (1899, n° 799) a. 26 ; A. H. — mère tuberculeuse ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; II-pare m. p. ; A. obst. — en

1897 acc. norm. enf. viv. s. m. 2 mois puis au verre b.p.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 4 h.; Exp. — quelques minutes; enf. viv.; P. enf. — 3720, le 7^e j. — 3650: ét. bon; P. plac. — 580; S. C. — normales.

111. (1899, n^o 1093) a. 24; A. H. — mère et une sœur mortes de tuberculose; A. P. — nuls; II-pare m. p., A. obst. — en 1896 acc. norm. enf. mort 3 h. après; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 5 h. 3/4; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3070, le 9^e j. — 2910; ét. bon; P. plac. — 480; S. C. — normales.

112. (1899, n^o 1345) a. 20; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance, métrite et annexite après le 1^{er} acc.; II-pare m. p.; A. obst. en 1898 acc. norm. enf. viv. s. m. 3 semaines; mort à 3 mois d'entérite; pas de Rét. de C.; a. gr. — ?; pas d'alb.; Tr. — 2 h.; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 3130, le 9^e j. 3220; ét. bon; P. plac. — 455; S. C. — normales.

113. (1899, n^o 1398) a. 29; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — nuls; R. — 16 a.; II-pare m. p.; A. obst. — en 1894 acc. norm. enf. viv. bib. b. p.; a. gr. — ?; tr. alb.; Tr. — 6 h. 1/4; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 2000, le 7^e j. 1720; ét. bon; P. plac. — 350; S. C. — lymphangite des deux seins.

Obs. — La femme a perdu quelques gouttes de sang la veille et le jour de l'acc.

114. (1899, n^o 1999) a. 20; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans; A. P. — rougeole à 5 ans, rhumatisme artic. aigu à 16 et à 19 ans; II-pare p. d.; A. obst. — en 1897; acc. norm. enf. viv. bib.; mort à 3 mois de convulsions; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 3 h. 1/2; Exp. 30 m., enf. viv.; P.

enf. — 3480, le 8^e j. 3450; ét. bon; P. plac. — 540; S. C. — crevasses des seins.

115. (1899, n^o 2023) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 34 ans; A. P. — méningite à 3 ans; II-pare p. d.; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib., mort à 4 m. de diarrhée; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 4 h. 1/2; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 2990, le 9^e j. 3100; ét. bon; P. plac. — 450; S. C. — normales.

116. (1898, n^o 30) a. 24; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans; A. P. — rougeole dans l'enfance, chlorose de 18 à 20 ans; I-pare; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 14 h. 1/2; Exp. — 55 m.; enf. viv.; P. enf. — 3350, le 10^e j. 3670; ét. bon; P. plac. — 630; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, était bien portant à 2 ans.

« (1899, n^o 2282) a. 26; II-pare m. p.; A. obst. — (v. ci-dessus); a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 4 h. 1/2; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3850, le 8^e j. 4300; ét. bon; P. plac. — 630; S. C. — normales.

117. (1899, n^o 2448) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 34 ans; A. P. — nuls; II-pare m. p; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. s. m. 3 mois puis bib., mort à 14 mois de diarrhée; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 4 h. 1/4; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 3810, le 9^e j. 3880; ét. bon; P. plac. — 720; S. C. — normales.

118. (1899, n^o 2467) a. 25; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — rougeole dans l'enfance, à 13 ans rhumatisme artic. aigu; II-pare p. d.; A. obst. — en 1896 acc. norm. enf. viv. s. m. 2 mois, puis bib., mort à 4 mois de bronchite; a. gr. — ; à terme; pas d'alb.; Tr. — 18 h.; Exp

— 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4030, le 8^e j. 4120 ; ét. bon ; P. plac. — 670 ; S. C. — normales.

119. (1900, n^o 49) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — à 12 ans fièvre typhoïde ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1894 acc. à terme forceps enf. viv. s. m. 11 mois b. p. ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 3/4 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 8^e j. 3430 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur.

120. (1900, n^o 51) a. 18 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole et fluxion de poitrine dans l'enfance ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 acc. à 8 m. enf. hydrocéphale mort le lendemain ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2280, le 8^e j. 2100 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

Obs. — Endométrite hémorrhagique.

121. (1900, n^o 270) a. 31 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — à 26 ans fièvre muqueuse ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. à terme *symphyséotomie* délivr. artific. enf. viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3200, le 12^e j. 2770 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — lymphangite des deux seins.

Obs. — Bassin canaliculé. Accouchement spontané.

122. (1900, n^o 488) a. 30 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 38 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance, scarlatine à 6 ans, métrite et cystite à 28 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1894 acc. norm. (S. C. pathol.) enf. viv. s. n. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. 1/2 ; Exp. — quelques

minutes ; enf. viv. ; P. enf. 3070, le 8^e j. 3230 ; ét. bon ; P. plac. — 670 ; S. C. — normales.

123. (1900, n^o 761) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans ; A. P. — nuls ; R. — 18 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 acc. norm. enf. viv. s. m. 12 mois b. p. ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. $1/4$; Exp. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2770, le 7^e j. 2850 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

124. (1900, n^o 1149) a. 27 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare p. dif. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib. mort à 1 an d'entérite ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 21 h. ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3520, le 9^e j. 3710 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

125. (1900, n^o 1172) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 38 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 9 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. $1/2$; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3330, le 6^e j. 3200 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

126. (1900, n^o 1928) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — scarlatine à 17 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. allaitem. mixte 3 mois puis bib. b. p. ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. $3/4$; enf. viv. ; P. enf. — 3560 ; le 7^e j. 3500 ; ét. bon ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

127. (1900, n^o 2089) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — fièvre typhoïde à 18 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 20 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ;

P. enf. — 1) 2840, le 12^e j. 3400; 2) 2630, le 12^e j. 2840; ét. bon;
P. plac. — 965; S. C. — normales.

Obs. — Accouchement gémellaire.

128. (1898, no 1114) a. 25; A. H. — mère morte de tuberculose à 43 ans; A. P. — dans l'enfance : rougeole, rhumatisme, une maladie du cœur et fièvre typhoïde; R. — 19 a.; I-pare; a. gr. — à terme; alb.; Tr. — 22 h. 1/4; Exp. — 1 h. 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 3080, le 8^e j. 2720; ét. bon; P. plac. — 400; S. C. — normal.

Obs. — Femme cardiaque. — Enfant, élevé au sein maternel 16 mois, était bien portant 2 ans après.

« (1900, no 2253) a. 27; II-pare m. p.; A. obst. — (v. ci-dessus); a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 13 h.; Exp. — 1 h.; enf. viv.; P. enf. — 3520, le 8^e j. 3570; ét. bon; P. plac. — 520; S. C. — normales.

129. (1900, no 2313) a. 21; A. H. — mère morte de tuberculose à 40 ans; A. P. — il y a 4 ans une éruption généralisée et chute des cheveux; II-pare m. p.; A. obst. — en 1898, acc. prém. à 7 h. 1/2 fœtus mort et macéré; a. gr. — 7^e m.; pas d'alb.; Tr. — 2 h. 1/2; Exp. — 10 m.; enf. mort et macéré; P. enf. — 1480; P. plac. — 330.; S. C. — normales.

130. (1901, no 102) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 43 ans; A. P. — nuls; II-pare m. p.; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. bib., mort à 8 m. de diarrhée; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 6 h. 1/4; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 2700, le 8^e j. 3690; ét. bon; P. plac. — 560; S. C. — normales.

131. (1901, no 135) a. 25; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans; A. P. — à 20 ans fièvre typhoïde; R. — 19 a.;

II-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. bib., mort à 1 mois de diarrhée ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3530, le 8^e j. 3630 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

132. (1901, n° 172) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 39 ans ; A. P. — coqueluche et scarlatine dans l'enfance, angine à 14 ans, arthrite du genou droit à 21 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 acc. norm. enf. viv. s. m. 4 mois puis bib., mort à 10 m. de diarrhée ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2920, le 8^e j. 3110 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

133. (1901, n° 95) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 44 ans ; A. P. — rougeole à 7 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 acc. au 9^e m. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 10 m. enf. viv. ; P. enf. 2900, le 8^e j. 2820 ; ét. bon ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

134. (1901, n° 227) a. 22 ; A. H. — Mère morte de tuberculose à 26 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. Obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. s. m. 10 m. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. 2860, le 8^e j. 3180 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

135. (1898, n° 1325) a. 19 ; A. H. — Mère morte de tuberculose à 32 ans ; A. P. rougeole dans l'enfance ; R. — 16 a. ; I-pare ; a. gr. — à terme ; alb. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3400, le 4^e j. 3300 ; ét. bon ; P. plac. — 560 ; S. C. — alb. persistante.

Obs. — Cet enfant est parti le 4^e j. chez une nourrice au biberon, où il est mort le 20^e jour.

« (1901, n° 552) a. 22 ; II-pare m. p. ; A. Obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3610, le 5^e j. 3530 ; ét. bon ; P. plac. — 490 ; S. C. — normales.

136. (1901, n° 653) a. 32 ; A. H. — Mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole à 3 ans, scarlatine à 13 ans ; II-pare ; A. obst. — en 1891 acc. norm. enf. viv. bib., mort à 7 m. de variole ; a. gr. — 7 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h./12 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1840, le 10^e j. 1680 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

137. (1901, n° 707) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — depuis 4 ans métrite, hystéropexie (en mars 1900), double rein flottant ; II-pare ; A. obst. — en 1897 acc. à terme siège enf. mort le 3^e jour ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 3/4 ; Exp. — 1 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 3900, le 10^e j. 3850 ; ét. bon ; P. plac. — 640 ; S. C. — lymphangite du sein gauche.

138. (1901, n° 1163) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans : A. P. — rougeole à 14 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 acc. norm. enf. viv. s. m. 2 mois puis bib., mort à 3 mois ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3240, le 8^e j. 3420 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

139. (1901, n° 1221) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 42 ans ; A. P. — broncho-pneumonie à 6 mois ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. mort 1 heure après ; a. gr. — 7^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp.

— 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1) 1220 ; 2) 1350 ; P. plac. — 610 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin vicié. Maladie mitrale. Accouchement géme-laire. Le 1^{er} enfant est mort 12 h., le 2^e — 10 h. après la nais-sance.

140. (1899, n° 1307) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 28 ans ; A. P. — nuls ; I-pare ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 3/4 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2620, le 9^e j. 2800 ; ét. bon ; P. plac. — 350 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel 15 mois, était bien portant 2 ans après.

« (1901, n° 1247) a. 24 ; II-pare m. p. ; A. obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3530, le 7^e j. 3660 ; ét. bon ; P. plac. — 425 ; S. C. — normales.

141. (1901, n° 1588) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuber-culose ; A. P. — variole à 3 ans, chloro-anémie à 15 ans, — leucorrhée ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2650, le 9^e j. — 2700 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

142. (1901, n° 2123) a. 26 ; A. H. — mère morte de tubercu-lose à 30 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1894 acc. norm., enf. viv. ; bib. b. p. ; à gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. 3680, le 9^e j. 3570 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

143. (1901, n° 2142) a. 24 ; A. H. — mère mort de tuber-culose ; A. P. — fièvre typhoïde à 14 ans ; II-pare m. p. ; A.

obst. — en 1898 acc. à 8 m. forceps, enf. viv. s. n. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 10^e j. 3210 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

144. (1902, n^o 618) a. 27 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans ; A. P. — rougeole à 3 ans ; II-pare m. p. — A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 12 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3480, le 8^e j. 3620 ; ét. bon ; P. plac. — 490 ; S. C. — normales.

145. (1902, n^o 620) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 28 ans ; A. P. — rougeole et coqueluche à 5 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1901 acc. à 8 m. enf. viv. bib., mort à 7 mois de diarrhée ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2800, le 9^e j. 3660 ; ét. bon ; P. plac. — 525 ; S. C. — normales.

146. (1902, n^o 623) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 46 ans ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. 3 semaines puis s. n., mort à 9 mois (impétigo ?) ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2520, le 9^e j. 2280 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

147. (1902, n^o 680) a. 32 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — à 18 ans scarlatine ; à 19 ans fièvre typhoïde, à 20 ans grippe ; II-pare ; A. Obst. — en 1901 avortem. de 6 semaines ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 4 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3880, le 12^e j. 3720 ; ét. bon ; P. plac. — 578 ; S. C. — normales.

Obs. — Application de forceps.

148. (1902, n° 978) a. 21; A. H. — mère morte de tuberculose à 40 ans; A. P. — nuls; II-pare m. p.; A. obst. — acc. norm. enf. viv. s. m. b. p.; a. gr. — ?; pas d'alb.; Tr. — 4 h.; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 2120, le 8^e j. 2080; ét. bon; P. plac. — 410; S. C. — normales.

Obs. — La femme est devenue enceinte en allaitant le 1^{er} enfant.

149. (1902, n° 1095) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 48 ans; A. P. — nuls; R. — 18 a.; II-pare m. p.; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. bib. b. p.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 6 h.; Exp. — 25 m.; enf. viv.; P. enf. — 3910, le 7^e j. 3830; P. plac. — 700; S. C. — normales.

150. (1902, n° 1251) a. 24; A. H. — mère morte de tuberculose il y a 15 ans; A. P. — fièvre typhoïde à 18 ans; R. — 16 a.; II-pare m. p.; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. 1 an b. p.; a. gr. — près du terme; pas d'alb.; Tr. — 9 h.; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. — enf. — 2910, le 9^e j. 3050; P. plac. — 500; S. C. — normales.

151. (1902, n° 1429) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 43 ans; A. P. — nuls; R. — 19 a.; II-pare m. p.; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. 1 an b. p.; a. gr. — près du terme; pas d'alb.; Tr. — 12 h. 3/4; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 3400, le 8^e j. 3580; P. plac. — 620; S. C. — normales.

152. (1902, n° 1551) a. 27; A. H. — mère morte de tuberculose à 38 ans; A. P. — nuls; II-pare p. d.; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. s. n. b. p.; a. gr. — à terme; Tr. — 6 h. 3/4; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3500, le 9^e j. 3700; ét. bon; P. plac. — 1520; S. C. — normales.

153. (1902, n° 1876) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans; A. P. — scarlatine à 5 ans; II-pare m. p.; A. obst. — en 1901 acc. norm. enf. viv. bib. b. p.; a. gr. — 9^e m.; forte alb.; Tr. — 10 h.; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 3070, le 9^e j. 3290; ét. bon; P. plac. — 600; S. C. — normales.

154. (1903, n° 67) a. 28; A. H. — mère morte de tuberculose à 46 ans; A. P. — coqueluche et rougeole dans l'enfance; II-pare m. p.; A. obst. — en 1896 acc. à 8 m. 1/2 enf. viv. s. n. b. p.; a. gr. — 9^e m.; tr. alb.; Tr. — 6 h. 1/2; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. 2500, le 10^e j. 2480; ét. bon; P. plac. — 500; S. C. — normales.

155. (1903, n° 318) a. 36; A. H. — mère morte de tuberculose à 38 ans; A. P. — rougeole et fièvre typhoïde dans l'enfance; II-pare p. d.; A. obst. — en 1890 acc. norm. enf. viv. s. m. 14 mois, morte à 4 ans de méningite tuberculeuse; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 5 h. 1/4; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 3000, le 9^e j. 3160; ét. bon; P. plac. — 515; S. C. — normales.

156. (1903, n° 327) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans; A. P. — rougeole dans l'enfance; II-pare p. d.; A. obst. — en 1901 acc. norm. enf. viv. s. m. 1 mois puis bib.; b. p.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 11 h. 3/4; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. ^m 2850, le 10^e j. 2880; ét. bon; P. plac. — 400; S. C. — normales.

157. (1903, n° 663) a. 22; A. H. — mère morte de tuberculose à 27 ans; A. P. — fièvre puerpérale à la suite de son 1^{er} acc.; II-pare m. p.; A. obst. — en 1901 acc. norm. enf. viv. bib. b. p.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. —

4 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3100, le 9^e j. 3000 ; P. plac. — 440 ; S. C. — normales.

158. (1903, n^o 697) a. 30 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans, une sœur morte de tuberculose à 29 ans ; A. P. — nuls ; R. — 19 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1902 acc. à 8 m. 1/2 enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — 9e m. (?) ; tr. alb. ; Tr. — 12 h. 1/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3720, le 7^e j. 3700 ; ét. bon ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

159 (1901, n^o 1732) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 48 ans ; A. P. — très faible jusqu'à l'âge de 7-8 ans, rougeole 3 fois ; R. — 15 a. ; I-pare ; a. gr. — 9e m. ; tr. alb. ; Tr. — 16 h. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3000, le 9^e j. 3200 ; ét. bon ; P. plac. — 440 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant élevé au sein maternel, est mort d'entérite à 4 mois 1/2.

« (1903, n^o 1266) a. 21 1/2 ; II-pare m. p. ; A. obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 15 h. ; Exp. — 6 h. 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3630, le 9^e jour 3780 ; ét. bon ; P. plac. — 670 ; S. C. — lymphangite du sein gauche.

160. (1903, n^o 1625) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1902 acc. norm. enf. viv. s. m. 8 mois b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2480, le 8^e j. 2540 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

161. (1903, n^o 1916) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. 5 mois puis bib. b. p. ; a. gr. —

à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3950., le 8^e j. 4180 ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

162. (1898, no 60) a. 29 ; A. H. mère morte de tuberculose ; A. P. — coqueluche dans l'enfance, variole à 10 ans, chlorose ; III-pare ; A. obst. — en 1890 et 1892 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} bib. mort à 5 mois de méningite, le 2^e s. m. viv. mais maladif ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3500, le 10^e j. 3850 ; ét. bon ; P. plac. — 545 ; S. C. — normales.

163. (1898, no 235) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — salpingo-ovarite à 21 ans (après son 1^{er} acc.) ; III-pare p. d. ; A. Obst. — en 1889 et 1890 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} b. p. ; le 2^e mort à 5 mois ; a. gr. — 3^e m. ; pas d'alb. ; P. plac. — 200 ; S. C. — normales.

Obs. — Avortement fait en ville.

164. (1898, no 274) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole à 13 ans, érysipèle de la face à 11 ans, fièvre typhoïde à 15 ans, syphilis à 15 ans ; III-pare p. d. ; A. obst. — en 1895 et 1897 deux acc. à terme, fœtus morts et macérés (même père) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. mort macéré ; P. enf. — 1330 ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

165. (1898, no 464) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — syphilis depuis sa 1^{re} grossesse (en 1895), traitement spécifique à 2 reprises ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1896 acc. norm. enf. viv. atteint de syphilis congénitale, traitem. spécif., s. m. 15 mois mort à 2 ans de bronchopneumonie ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 17 h. ;

Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3380, le 9^e j. 3560 ; ét. bon ; P. plac. — 630 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel 18 mois, était bien portant 2 ans après.

« (1900, n^o 1719) a. 27 ; III-pare m. p. ; A. obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3760, le 10^e j. 3900 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

166. (1898, n^o 790) a. 38 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 28 ans (il y a 34 ans) ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. 1/2 ; III-pare p. d. ; A. obst. — en 1885 et 1890 deux acc. norm. enf. viv. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2800, le 10^e j. 3080 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

167. (1898, n^o 965) a. 31 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 42 ans ; A. P. — coqueluche dans l'enfance ; R. — 16 a. irrég. ; III-pare m. p. ; A. — obst. — en 1893 et 1896 deux acc. norm. enf. viv. s. m. 17 et 14 mois b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. , P. enf. — 3470, le 21^e j. 3680 ; ét. bon ; P. plac. — 550.

Obs. — Pneumonie qui apparût 48 heures avant l'accouchement, guérie. Femme sortie en bon état.

168. (1898, n^o 1012) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 22 ans ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1896 avortem. de 4 m. ; 2) en 1897 acc. norm. enf. viv. s. m. 10 mois ; a. gr. — ? ; Tr. — 7 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 2540, le 9^e j. 2320 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Cette femme est devenue enceinte en allaitant.

169. (1898, n^o 1042) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuber-

culose à 39 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 acc. norm. enf. viv. s. m. 14 m. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 3510, le 7^e j. 3460 ; ét. bon ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel 16 mois, est mort à 3 ans 1/2 de diphtérie.

« (1902, n^o 94) a. 26 ; III-pare m. p. ; A. obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 1 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3580, le 7^e j. 3560 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

170. (1898, n^o 1145) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole ; III-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1895 acc. norm. enf. viv. s. m. 16 mois mort à 2 ans de tuberculose ; 2) en 1897 acc. gémeil. enf. viv. s. m. morts à 2 m. 1/2 ; pas de Rét. de C. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3150, le 8^e j. 3200 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

171. (1898, n^o 1565) a. 40 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; III-pare p. d. ; A. obst. — en 1885 et 1888 deux acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3280, le 7^e j. 3400 ; ét. bon ; P. plac. — 700 ; S. C. — normales.

172. (1898, n^o 1822) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; I-pare ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 10 h. 1/4 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3460, le 9^e j. 3410 ; P. plac. — 575 ; S. C. — fissures des seins.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, était bien portant à 3 ans.

« (1899, no 2341) a. 27; II-pare m. p. ; A. obst. (v. ci-dessus); a. gr. — à terme; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. $1\frac{1}{4}$; Exp. — quelques minutes; enf. viv. ; P. enf. — 3440, le 8^e j. 3300 ; P. plac. — 650 ; S. C. — lymphangite des seins.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, était bien portant à 2 ans.

« (1901, no 905) a. 29; III-pare m. p. ; A. obst. — (v. ci-dessus); a. gr. — près du terme; pas d'alb. ; Tr. 5 h. $3\frac{3}{4}$; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3230, le 8^e j. 3380, ét. bon; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

173. (1898, no 1916) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 26 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance, syphilis à 18 ans ; III-pare m. p. ; A. obs. — 1) en. févr. 1897 acc. norm. enf. viv. p. d. ; 2) en juill. 1897 avortem. de 2 mois ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2650, le 8^e j. 2380 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Brièveté congénitale du cordon.

174. (1899, no 97) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 19 ans ; A. P. — rougeole à 5 ans ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 et 1896 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} mort à 15 j. d'entérite, le 2^e b. p. ; a. gr. à terme; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3070, le 10^e j. — 3030 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

175. (1899, no 171) a. 30 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans, père mort alcoolique ; A. P. — scarlatine à 12 ans ; III-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1891 acc. norm. ; 2) en 1897 avortem. de 3 mois ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. $3\frac{3}{4}$; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3410, le 4^e j. 3340 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

176. (1899, n° 596) a. 30; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — nuls; R. — 16 a.; III-pare p. d.; A. obst. — en 1889 et 1893 deux acc. norm. enf. viv. b. p.; a. gr. — 9e m.; pas d'alb.; Tr. — 9 h. 1/2; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 2920, le 7e j. 3250; ét. bon; P. plac. — 470; S. C. — normales.

177. (1899, n° 1127) a. 30; A. H. — mère morte de tuberculose à 30 ans; A. P. — de 17 à 22 ans maladie d'estomac, à 24 ans métrite (après le 2e acc.), à 29 ans avait beaucoup maigri (pas de signes de bacillose); III-pare m. p.; A. obst. — en 1888 et 1892 deux acc. norm. enf. viv. s. m. 15 et 9 mois, viv. mais malades; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 3 h. 1/4; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3450, le 9e j. 3730; ét. bon; P. plac. — 650; S. C. — lymphangite des seins.

178. (1899, n° 1791) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — nuls; III-pare m. p.; A. obst. — en 1897 et 1898 deux avortem. au 3e mois; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 22 h.; Exp. — 45 m.; enf. viv.; P. enf. — 2900, le 7e j. 3000; P. plac. — 480; S. C. — normales.

179. (1899, n° 1914) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose, père mort alcoolique; A. P. — nuls; R. — 16 a.; III-pare m. p.; A. obst. — en 1897 et 1898 deux acc. norm. enf. viv. s. m. 6 semaines puis bib.; le 1er b. p.; le 2e mort à 4 m. de diarrhée; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 9 h.; Exp. — 15 m.; P. enf. viv.; P. enf. 3550, le 8e j. 3730; ét. bon; P. plac. — 550; S. C. — normales.

180. — (1900, n° 597) a. 26; A. H. — mère morte de tuberculose à 38 ans (il y a 20 ans); A. P. — nuls; II-pare p. d.; A. obst. — en 1894 acc. norm. enf. viv. s. m. 15 j.

puis bib. ; mort à 4 ans ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. — enf. — 3260, le 6^e j. 3520 ; ét. bon ; P. plac. — 440 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel 4 mois puis au biberon, était bien portant à 3 ans.

« (1903, n° 316) a. 28 ; III-pare m. p. ; A. obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3700, le 8^e j. 3970 ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

181. (1900, n° 896) a. 32 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1896 acc. à terme face enf. viv. bib. mort à 15 mois de rougeole ; 2) en 1899 avortem. de 3 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 3/4 ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4220, le 12^e j. 3960 ; ét. bon ; P. plac. — 720 ; S. C. — deux fois tempér. au-dessus de 39°, inject. utérines.

Obs. — Gros œuf procubitus du cordon. — Femme sortie en bon état.

182. (1900, n° 1383) a. 33 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — fièvre typhoïde à 21 ans ; R. — 17 a. ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1893 et 1896 deux acc. norm. enf. viv. bib. ; a. gr. — à terme ; Tr. — 12 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3330, le 9^e j. 3520 ; ét. bon ; P. plac. — 490 ; S. C. — normales.

183. (1900, n° 2284) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — nuls ; III-pare p. d. ; A. obst. — en 1897 et 1898 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} bib. b. p., le 2^e s. m. et bib. 4 m. 1/2, puis remis à l'assistance publique ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ;

enf. viv. ; P. enf. — 3560, le 7^e j. 3580 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

184. (1900, n^o 2305) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 46 ans ; A. P. — rougeole et variole dans l'enfance ; III-pare m. p. pour 2 dern. ; A. obst. = en 1897 et 1898 deux acc. norm. enf. viv. s. n., morts de diarrhée (à 18 et à 10 mois) ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2280 ; le 7^e j. 2860 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

Obs. — Le père du 1^{er} enfant est mort de tuberculose.

185. — (1901, n^o 256) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1894 et 1895 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 1 mois puis bib. b. p., le 2^e bib mort à 5 mois d'athrepsie ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3080, le 10^e j. 3290 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

186. (1901, n^o 690) a. 36 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole, coqueluche, fièvre typhoïde dans l'enfance ; R. — 16 a. ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1893 et 1899 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. n. mort à 18 mois, le 2^e bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3460, le 10^e j. 3380 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

187. (1901, n^o 1293) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 8 ans, une sœur morte de tuberculose à 5 ans ; A. P. — chloro-anémie de 15 à 18 ans ; III-pare m. p. ; A. obst. — deux avortements en mai et en décembre 1900 ; a. gr. — 5^e m. ; pas d'alb. ; Tr. 11 h. ; enf. mort ; P. enf. — 445 ; P. plac. — 175 ; S. C. — normales.

Obs. — Intoxication par CO (?), la femme étant repasseuse.

188. (1901, no 1359) a. 32 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole, coqueluche dans l'enfance, à 21 ans péritonite (S. C.) ; III-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1890 acc. norm. enf. viv. s. n. mort à 10 mois de fluxion de poitrine ; 2) en 1893 avortem. de 5 mois ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 2 h. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3330 le 10^e j. 3600 ; ét. bon ; P. plac. — 610 ; S. C. — normales.

189. (1901, no 1387) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 43 ans ; A. P. — depuis l'âge de 20 ans crises d'épilepsie ; III-pare m. p. ; A. Obst. — en 1896 et 1898 deux acc. norm. enf. viv., bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3850, le 9^e j. 3920 ; ét. bon ; P. plac. — 630 ; S. C. — a eu une attaque après l'accouchement, puis normaux.

190. (1901, no 1735) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 43 ans, père mort de pneumonie à 43 ans ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 et 1900 deux acc. norm. enf. viv., bib., le 1^{er} b. p., le 2^e mort à 11 mois de congestion pulmonaire ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3060, le 8^e j. 3100 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

191. (1902, no 536) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole et fièvre muqueuse dans l'enfance ; III-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. ; 2) avortem. de 2 mois ; a. gr. — à terme ; Tr. — 5 h. 3/4 ; Exp. — 1 h. 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3480, le 9^e j. 3600 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — fébriles : trois

fois au-dessus de 380, une fois même au-dessus de 390, inject. utérines.

192. (1902, no 873) a. 31; A. H. — mère morte de tuberculose à 44 ans; A. P. — rougeole à 4 ans; III-pare m. p.; A. obst. — en 1892 et 1894 deux acc. à terme, forceps enf. viv., le 1er s. m. 1 an b. p., le 2e s. m., mort à 6 semaines; a. gr. — à terme; alb. légère; Tr. — 4 h.; Exp. — 35 m.; enf. viv.; P. enf. — 3430, le 9e j. 3510; ét. bon; P. plac. — 550; S. C. — normales.

193. (1902, no 1387) a. 28; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — rougeole à 2 ans; III-pare m. p.; A. obst. — en 1896 et 1900 deux acc. norm. enf. viv.; le 1er bib. b. p., le 2e s. m. b. p.; a. gr. — 9e m.; pas d'alb.; Tr. — 12 h. 1/4; Exp. — 15 m.; enf. vivi.; P. enf. — 2990, le 9e j. 3120; ét. bon; P. plac. — 520; S. C. — normales.

194. (1903, no 554) a. 30; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — nuls; III-pare m. p.; A. obst. — en 1894 et 1901 deux acc. norm. enf. viv. s. m. (15 et 14 mois) b. p.; pas de Rét. de C.; a. gr. — ?; pas d'alb.; Tr. — 13 h. 1/2; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 2890, le 7e j. 2700; ét. bon; P. plac. — 470; S. C. — normales.

195. (1903, no 1837) a. 28; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — nuls; R. — 16 a.; III-pare m. p.; A. obst. — en 1900 et 1902 deux acc. norm. enf. viv., le 1er s. n. b. p., le 2e bib. b. p.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 3 h.; Exp. — 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 3520, le 8e j. 3520; P. plac. — 600; S. C. — normales.

196. (1903, no 1861) a. 31; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — nuls; R. — 17 a.; III-pare m. p.; A. obst. 1) en 1899 acc. norm. enf. viv. s. m. 18 mois b. p.; 2) avortem.

de 6 semaines ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 4 h. 1/4 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3240, le 7^e j. 3300 ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

197. (1903, no 2101) a. 34 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 23 ans, 2 sœurs mortes de tuberculose à 23 (7) et à 27 (m.) ans ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. pour 2 dern. ; A. obst. — en 1891 et 1895 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} bib. mort à 18 mois, le 2^e s. m. 18 mois b. p. ; a. gr. 9^e m. ; alb. ; Tr. — 6 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 1450, le 15^e j. 1380 ; P. plac. — 350 ; S. C. — normales.

198. (1898, no 547) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 42 ans ; A. P. — nuls ; R. — 19 a. ; IV-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1889 acc. à terme basiotripsie, — en 1892 et 1895 deux acc. à terme, symphyséotomies, enf. viv. s. m. 22 mois, le 1^{er} b. p., le 2^e mort à 2 ans de méningite tuberculeuse ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3370, le 27^e j. 3600 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin rachitique. *Symphyséotomie*. Déchirure transversale des tissus, située au-dessous de l'urèthre. Délivrance artificielle. Femme sortie en bon état.

199. (1898, no 771) a. 33 1/2 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 42 ans, une sœur morte de tuberculose à 16 ans ; A. P. — nuls ; R. — 18 a. ; IV-pare m. p. ; A. obst. — en 1889 1891 et 1895 trois acc. norm. enf. viv. s. m. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; enf. viv. ; P. enf. — 2640, le 9^e j. 2980 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

200. (1998, no 1092) a. 27 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole à 4 ans ; fièvre (?) à 13 ans ; IV-pare m. p. ; A. obst. — en 1894, 1896 et 1897 trois acc.

norm. enf. viv. bib., le 1^{er} mort à 7 m. de convulsions, les 2^e et 3^e b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3330, le 7^e j. 3490 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

201. (1898, n^o 1428) a. 35 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; IV-pare p. d. pour chaque ; A. obst. — en 1892, 1893 et 1894 trois acc. norm. enf. viv., les 2^e et 3^e s. m. ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2270, le 10^e j. 3020 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

202. (1898, n^o 1989) a. 21 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans ; A. P. — nuls ; I-pare ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 1 h. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2760, le 8^e j. 2820 ; ét. bon ; P. plac. — 495 ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège décomplété mode des fesses.

L'enfant élevé au sein maternel et au biberon est mort à 6 mois de diarrhée.

« (1900, n^o 584) a. 23 ; II-pare p. d. ; A. obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; enf. viv. ; P. enf. — 2920, le 7^e j. 2940 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 4 mois de diarrhée.

« (1901, n^o 458) a. 24 ; III-pare m. p. que pour la 1^{re} ; A. obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 15 h. 1/2 ; Exp. — 6 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3100, le 6^e j. 3200 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant était élevé au sein maternel 3 mois, puis sein et bouillie. Il était bien portant à 2 ans.

« (1903, n^o 477) a. 26 ; IV-pare m. p. ; A. obst. (v. ci-des-

sus); a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 3 h. $1/4$; enf. viv.; P. enf. — 3350, le 8^e j. 3440; P. plac. — 560; S. C. — normales.

203. (1899, n° 679) a. 19; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans, une sœur tuberculeuse; A. P. — fièvre typhoïde à 17 ans; R. — 17 a. irrég.; I-pare; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 20 h. $1/2$; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 2880, le 9^e j. 3040; ét. bon; P. plac. — 450; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 4 mois de méningite tuberculeuse.

« (1900, n° 407) a. 20; II-pare m. p.; A. obst. — (v. ci-dessus); a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 8 h. $3/4$; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3270, le 11^e j. 3410; ét. bon; P. plac. — 570; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant était élevé au sein maternel.

« (1903, n° 1044) a. 23; IV-pare m. p.; A. obst. — Ces 2 prem. v. ci-dessus; 3) en 1902 acc. norm. enf. viv. bib., mort à 1 mois de méningite tuberculeuse; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 11 h. $3/4$; Exp. — 15 m; enf. viv.; P. enf. — 3550, le 10^e j. 3820; P. plac. — 560; S. C. — normales.

204. (1899, n° 1802) a. 25 $1/2$; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans; A. P. — nuls; IV-pare p. d.; A. obst. — en 1894 et 1896 deux acc. norm. enf. viv., morts au bout de 6 m. et de 4 mois; 3) en 1898 présent. de l'épaule version enf. mort au bout de 14 jours; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 7 h.; Exp. 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 3030, le 3^e j. 2900; ét. bon; P. plac. — 450; S. C. — normales.

205. (1900, n° 1115) a. 36; A. H. — mère morte de tuberculose à 29 ans; A. P. — arthrite du genou après son dernier acc.; IV-pare m. p.; en 1883, 1885 et 1896 trois acc. norm.

enf. viv., le 1^{er} s. m. 15 mois mort alors de diarrhée, le 2^e s. m. 1 an b. p., le 3^e bib. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2720, le 7^e j. 2440 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

206. (1900, n^o 1706) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans, une sœur tuberculeuse ; A. P. — cyphose dorsale depuis l'âge de 4 ans, coqueluche et rougeole dans l'enfance ; R. — 19 a. ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 et 1899 deux acc. norm. enf. viv. s. m. morts au bout de 3 semaines ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 15 m. enf. viv. ; P. enf. — 2750, le 9^e j. 2620 ; ét. bon ; P. plac. — 410 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin ciphotique. Accouchement spontané. L'enfant élevé au sein maternel 3 semaines, puis chez une nourrice, est mort de diarrhée à 2 m. 1/2.

« (1901, n^o 1802) a. 27 ; IV-pare m. p. ; A. obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 2620, le 10^e j. 2520 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

207. (1901, n^o 96) a. 30 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 25 ans ; A. P. — scarlatine à 12 ans ; IV-pare m. p. ; A. obst. — en 1894, 1897 et 1898 trois acc. norm. enf. viv. bib., le 1^{er} mort de méningite à 3 ans 1/2, le 2^e b. p., le 3^e mort de méningite à 4 mois 1/2 ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. — P. enf. — 2650, le 3^e j. 2500 ; ét. bon ; P. plac. — 350 ; S. C. — normales.

208. (1901, n^o 103) a. 33 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 30 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 16 ans ; IV-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1893 acc. à terme siège enf. viv., mort à 14 mois ; 2) en 1895 acc. à terme som. forceps enf. viv.

s. m. 16 mois b. p. ; 3) en 1898 acc. norm. enf. viv. s. m. mort à 11 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3770, le 8e j. 3940 ; ét. bon ; P. plac. — 630 ; S. C. — normales.

209. (1902, no 1324) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 47 ans ; A. P. — à 10 ans méningite, depuis céphalalgies violentes presque tous les jours ; IV-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1895 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; 2) et 3) en 1900 et 1901 deux avortements ; a. gr. — près du terme ; alb. au 7e mois ; Tr. — 6 h. ; Exp. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2720, le 8e j. 2610 ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

210. (1902, no 1774) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose, trois sœurs vivantes, dont une a une tumeur blanche du genou ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; III-pare m. p. ; A. Obst. — en 1899 et 1900 deux acc. norm. enf. viv., le 1er bib. mort à 6 mois, le 2e s. m. b. p. ; a. gr. — 9e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2600, le 9e j. 2590 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, était bien portant à 2 ans.

« (1904, no 257) a. 24 ; IV-pare p. dif. ; A. obst. — (v. ci-dessus) ; a. gr. — 9e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3400, le 8e j. 3210 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

Obs. — Dégagement de la tête en occipito-postérieure directe.

211. (1903, no 479) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole à 6 ans ; IV-pare m. p. pour 3 dern. ; A. obst. — en 1896 et 1898 deux acc. norm. enf. viv., le 1er bib. mort le 20e jour, le 2e s. n. b. p., — en 1902 avortem. de

2 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. $1/2$; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4440, le 6^e j. 4200 ; P. plac. — 760 ; S. C. — normales.

212. (1903, no 1324) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 25 ans ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. irrég. ; IV-pare m. p. ; A. obst. — en 1898, 1899 et 1901 trois acc. norm. enf. viv. bib., les 1^{er} et 2^e b. p., le 3^e mort à 7 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3600 ; le 6^e j. 3640 ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

213. (1903, no 1951) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; IV-pare m. p. ; A. obst. — en 1900, 1901 et 1902 trois acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 11 mois b. p., le 2^e allaitem. mixte 6 mois puis bib. mort à 7 mois 112, le 3^e bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3920, le 7^e j. 3850 ; P. plac. — 470 ; S. C. — lymphangite du sein gauche.

214. (1898, no 799) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 39 ans ; A. P. — à 21 ans fièvre typhoïde ; V-pare m. p. ; en 1890, 1894, 1895 et 1897 quatre acc. norm., les 3^e et 4^e enf. viv. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; Tr. — 4 h. $1/2$; Exp. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2630, le 8^e j. 2640 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

215. (1898, no 1247) a. 31 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — fièvre typhoïde à 8 ans ; V-pare m. p. pour 4 dern. ; A. obst. — en 1884, 1892, 1894 et 1897 quatre acc. norm. enf. viv., les 3 premiers enf. s. m., les 1^{er} et 3^e b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 4^e j. 3120 ; ét. bon ; P. plac. — 680 ; S. C. — normales.

216. (1898, n^o 1608) a. 33 ; A. H. — mère morte de tubercu-

lose à 38 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 5 ans ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1883, 1886, 1888 et 1890 quatre acc. norm. enf. viv. s. m., le 2^e viv. b. p., les autres morts ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2910, le 9^e j. 2730 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

217. (1899, no 473) a. 41 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1890, 1892, 1894 et 1896 quatre acc. norm. enf. viv. s. m., les 3 premiers viv. b. p., le 4^e mort à 15 mois de tuberculose ; pas de Rét. de C. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3270, le 7^e j. 3310 ; ét. bon ; P. plac. — 585 ; S. C. — normales.

218. (1899, no 1406) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 33 ans ; A. P. — variole et scarlatine dans l'enfance ; rougeole à 23 ans ; V-pare m. p. pour 2 dern. ; A. obst. — en 1892, 1894, 1896 et 1897 quatre acc. norm. enf. viv., le 4^e viv. b. p. ; les trois premiers morts ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3570, le 9^e j. 3730 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

Obs. — Le père des 3 premiers enfants est mort de tuberculose à 28 ans.

279. (1900, no 374) a. 34 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — variole à 5 ans ; V-pare m. p. pour 2 dern. ; A. obst. — en 1885, 1887, 1891 et 1895 quatre acc. normaux enf. viv. s. m. 18 mois b. p. ; a. gr. — 3 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; P. enf. — 90 ; P. plac. — 110 ; S. C. — normales.

Obs. — 8 jours avant l'avortement cette femme portait un

lourd fardeau ; elle était prise ensuite de douleurs et a eu des pertes sanguines quelques jours après.

220. (1901, no 564) a. 37 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 37 ans ; une sœur morte de tuberculose à 33 ans ; A. P. — nuls ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1889, 1891, 1893 et 1896 quatre acc. norm. enf. viv. s. m. 15 mois, le 3^e est mort de diarrhée à 19 mois, les autres viv. b. p. ; — a. gr. — 9^e m. (?) ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3750, le 8^e j. 3430 ; ét. bon ; P. plac. — 680 ; S. C. — normales.

221. (1901, no 1566) a. 18 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole et fièvre typhoïde dans l'enfance, céphalées et constipation habituelles ; V-pare m. p. ; A. obst. — en mai 1898 avortem. de 4 m. 1/2, en février et décembre 1899 et avril 1900 trois acc. prém. à 7 m. enf. morts ; a. gr. — 7 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. mort et macéré ; P. enf. — 2000 ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

Obs. — Syphilis ? — placenta pâle, à sillons profonds.

222. (1901, no 1697) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1892, 1894, 1897 et 1898 quatre acc. norm. enf. viv., le 1^{er} bib. mort à 15 mois de choléra, les 3 autres s. m. 18 mois viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 17 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3650, le 9^e j. 3780 ; ét. bon ; P. plac. — 610 ; S. C. — normales.

223. (1902, no 338) a. 38 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — nuls ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1889, 1891 1893 et 1897 quatre acc. norm. enf. viv. bib., le 3^e mort de diarrhée à 3 semaines, les autres viv. b. p. ;

a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. $\frac{3}{4}$; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3700, le 4^e j. 3330 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

224. (1903, n^o 203) a. 31 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 30 ans, père mort de pneumonie à 50 ans ; A. P. — nuls ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1889, 1893, 1899 et 1901 quatre acc. norm. enf. viv. s. m. 16 mois (sauf le dernier, s. m. 6 mois puis bib.) b. p. ; pas de Rét. de C. ; a.gr. — ? pas d'alb. ; Tr. — 10 h. $\frac{3}{4}$; enf. viv. ; P. enf. — 3750, le 7^e j. 3750 ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Femme accouchée en voiture, en arrivant à la clinique.

225. (1900, n^o 612) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 39 ans ; A. P. — à 12 ans fièvre typhoïde et scarlatine ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1890, 1892, 1893, 1896 et 1898 cinq acc. norm. enf. viv. s. m. (de 6 à 19 mois), le 2^e mort de croup à 4 ans, les autres viv. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3400, le 8^e j. 3300 ; ét. bon ; P. plac. — 680 ; S. C. — une fois tempér. = 38°5, inj. utér., puis normales.

226. (1900, n^o 627) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 43 ans ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1895, 1896 et 1897 trois acc. norm. ; enf. viv., en 1898 et 1899 deux avortem. de 4 mois, le 1^{er} s. m. 4 mois puis bib. viv. p. ; les 2 autres bib. morts de diarrhée ; a. gr. — 8^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 2530, le 8^e j. 2390 ; ét. bon ; P. plac. — 640 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta prævia. Hémorrhagies à répétition pendant la grossesse.

227. (1901, no 119) a. 31 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; VI-pare p. d. ; A. obst. — en 1893, 1894, 1895, 1896 et 1900 cinq acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 1 an mort, le 2^e bib. v. b. p., les 3 autres bib. morts ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3450, le 8^e j. 3540 ; ét. bon ; P. plac. — 475 ; S. C. — normales.

228. (1901, no 988) a. 40 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 30 ans ; A. P. — variole pendant cette grossesse (au 7^e m.) ; R. — 17 a. ; VI-pare m. p. pour 4 dern. ; A. obst. — en 1881 avortem. de 6 m., en 1883, 1886, 1894 et 1898 quatre acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 1/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2900, le 8^e j. 3090 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

229. (1902, no 37) a. 35 ; A. H. — mère et deux frères morts de tuberculose ; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance, polype intra-utérin (opéré en 1897) ; VI-pare p. d. ; A. obst. — en 1889 acc. norm. enf. mort après quelques heures, — en 1894 acc. norm. enf. viv. s. m. 1 an b. p., — en ?, 1896 et 1897 trois avortements ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3210 ; P. plac. 570 ; S. C. — normales.

Obs. — Enf. envoyé le lendemain chez une nourrice.

230. (1902, no 1032) a. 27 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 46 ans ; A. P. — nuls ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1892, 1894, 1897, 1899 et 1901 cinq acc. norm. enf. viv. s. m. (de 16 à 18 mois), les 2 premiers viv. b. p., les 3 derniers morts ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2750, le 8^e j. 2700 ; P. plac. — 440 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur. Hémorrhagie *post-partum*.

231. (1903, no 1970) a. 38 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; VI-pare m. p. pour 4 dern. ; A. obst. — en 1890, 1892, 1898, 1900 et 1902 cinq acc. norm. enf. viv. s. m., les 4 premiers mois, le dernier viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 2 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3800, le 8^e j. 4000 ; P. plac. — 610 ; S. C. — normales.

232. (1899, no 844) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 44 ans ; A. P. — rougeole à 19 ans ; IV-pare p. d. ; A. obst. — en 1893, 1895 et 1898 trois acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 22 mois viv. malade, le 2^e s. m. 16 mois mort alors de coqueluche, le 3^e bib. viv. b. p. ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; enf. mort ; P. enf. — 2830 ; P. plac. — 570 ; S. C. — une fois le 6^e j. températ. = 39°6, puis normale.

Obs. — Présentation de l'épaule droite ; enfant mort. Embryotomie cervicale. Délivrance artificielle. Femme sortie en bon état.

« (1903, n° 2046) a. 29 ; VI-pare m. p. pour 3 dern. ; A. obst. (V. ci-dessus), en 1900 acc. à 8 m. enf. viv. bec-de-lièvre mort le 10^e jour (de tous les enfants seul le 1^{er} est vivant) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2880, le 5^e j. 2900 ; P. plac. — 490 ; S. C. — normales.

233. (1902, no 887) a. 34 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans ; A. P. — rougeole à 9 ans ; R. — 17 a. ; VII-pare m. p. pour 3 dern. ; A. obst. — en 1885, 1892, 1896, 1897 et 1900 cinq acc. norm. enf. viv. bib., les 3 premiers viv. b. p., les 2 derniers morts de méningite tuberculeuse, —

en 1889 un acc. prémât. à 7 m. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. $1/4$; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2730, le 9^e j. 2750 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

234. (1903, n° 418) a. 31 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 34 ans ; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance, chlorose à 21 ans ; VII-pare m. p. ; A. obst. — en 1892, 1896, 1898 et 1901 quatre acc. norm. enf. viv., s. m. 13 mois b. p., — en 1894 et 1897 deux avortements de 6 semaines ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 17 h. $1/2$; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2950, le 8^e j. 2980 ; ét. bon ; P. plac. — 640 ; S. C. — normales.

235. (1903, n° 858) a. 30 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans ; A. P. — à 12 ans fièvre typhoïde ; VII-pare m. p. ; A. obst. — six grossesses, toutes terminées par des avortements de 4 à 6 mois, dont le dernier date du mois de novembre 1901 ; a. gr. — 7^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. $1/2$; Exp. — 50 m. ; enf. mort et macéré ; P. enf. — 1350 ; P. plac. — 330 ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège complet.

236. (1898, n° 5) a. 39 ; A. H. — mère et deux frères morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 18 a. ; VIII-pare m. p. pour 2 dern. ; A. obst. — en 1880, 1883, 1885, 1886, 1887 et 1892 six acc. norm., en 1896 acc. à 8 m. $1/2$ — enf. viv. s. m. (sauf le 2^e), 3 morts, 4 viv. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; Tr. — 7 h. $1/2$; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2930, le 9^e j. 3170 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

Obs. — La père des 6 premiers enfants est mort de tuberculose il y a 3 ans.

237. (1902, n° 1786) a. 41 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans, père mort de pneumonie à 51 ans ; A. P. —

nuls; R. — 15 a. $1/2$; VIII-pare m. p. (alcoolique); A. obst. — de 1883 à 1900 sept acc. norm., les 5 derniers enf. s. m 22 mois, les 3^e, 5^e et 7^e viv. b. p., les autres morts; a. gr. — à terme; alb.; Tr. — 5 h. $1/4$; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3890, le 9^e j. 3920; ét. bon; P. plac. — 500; S. C. — normales.

238. (1899, n^o 1169) a. 40; A. H. — mère morte de tuberculose à 42 ans; A. P. — nuls; IX-pare m. pour les 3 dern.; A. obst. — de 1877 à 1897 sept acc. norm. enf. viv., en 1898 avortem. de 4 m. $1/2$, — enf. s. m. (sauf les 1^{er} et 4^e) viv. b. p.; a. gr. — près du terme; tr. alb.; Tr. — 12 h. $1/2$; Exp. — quelques minutes; enf. mort; P. enf. — 2200; P. plac. — 530; S. C. — normales.

Obs. — Décollement prématuré du placenta. Enfant mort pendant le travail.

239. (1901, n^o 2195) a. 28; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — rougeole à 5 ans; VIII-pare m. p.; A. obst. — en 1893, 1894, 1895, 1897 et 1900 cinq. acc. norm. enf. viv., en ? — avortem. de 2 mois, en 1898 accouch. prém. à 7 m., les 3^e, 5^e et dernier enf. s. m. les 3^e et dernier viv. b. p., les autres morts; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 12 h.; Exp. — 25 ans; enf. viv.; P. enf. — 5210, le 7^e j. 4970; ét. bon. P. plac. — 860; S. C. — normales.

Obs. — Gros œuf. — Cet enfant, élevé 6 mois au sein maternel, puis au biberon, était bien portant à 2 ans.

« (1903, n^o 1736) a. 30; X-pare m. p.; A. obst. — v. ci-dessus, 9) en 1902 avortem. de 2 mois; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 8 h.; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 4720; — le 10^e j. 4750; ét. bon; P. plac. — 850; S. C. — normales.

240. (1902, n^o 635) a. 34; A. H. — mère morte de tubercu-

lose à 39 ans ; A. P. — à 29 ans arthrite puerpérale du genou droit, ankylose consécutive ; X-pare m. p. pour 7 dern. ; A. obst. — depuis 1886 huit acc. norm. enf. viv., en 1897 un avortem. de 2 m. 1/2, — enf. bib., 4 morts, 4 viv. b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 17 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4150, le 8^e j. 4050 ; ét. bon ; P. plac. — 590 ; S. C. — normales.

Obs. — Hydramnios : 1600 gr. de liquide amniotique.

241. (1898, no 1555) a. 33 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — nuls ; X-pare p. d. ; de 1883 à 1897 sept acc. norm. enf. viv., en 1885 et 1888 deux avortem., tous les enf. viv. b. p., les 6 premiers s. m. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2720, le 5^e j. 2720 ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, était bien portant 1 an après.

« (1899, no 1915) a. 35 ; XI-pare m. p. ; A. obst. — v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 1 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3270, le 8^e j. 3160 ; ét. bon ; P. plac. — 670 ; S. C. — normales.

242. (1898, no 566) A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — nuls ; XII-pare m. p. pour 2 dern. ; A. obst. — de 1878 à 1896 onze acc. norm. enf. viv. s. m., six viv. b. p. ; a. gr. — 7 mois ; enf. mort et macéré ; P. enf. — 550 ; P. plac. — 250 ; S. C. — normales.

Obs. — Femme accouchée en ville.

243 (1902, no 414) a. 31 ; A. H. — mère morte de tuberculose il y a 29 ans ; A. P. — nuls ; XII-pare m. p. ; A. obst. — de 1889 à 1900 huit acc. norm. enf. viv., en 1895, 1897 et 1901 trois avortements, le 1^{er} et le dernier enf. s. m., les

autres bib., 6 enf. viv. b. p. ; a. gr. — 4 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; P. enf. — 260 ; P. plac. — 130 ; S. C. — normales.

244. (1899, n° 2415) a. 39 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — nuls ; XI-pare m. p. pour 10 dern. ; A. obst. — de 1881 à 1898 dix acc. norm. enf. viv. s. m., les 2^e, 5^e, 9^e et 100 viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 8^e j. 2980 ; ét. bon ; P. plac. — 465 ; S. C. — normales.

Obs. — Le père de son premier enfant est mort de tuberculose. Elle est devenue enceinte en allaitant. Cet enfant, élevé au sein maternel, est mort à 16 mois.

« (1902, n° 1620) a. 42 ; XIII-pare m. p. ; A. obs. — (v. ci-dessus), 12 en 1901 acc. norm. enf. viv. s. m. 4 mois puis bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 1 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3800, le 11^e j. 3290 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel, était bien portant 1 an après.

« (1903, n° 1939) a. 44 ; XIV-pare m. p. ; A. obst. — (v. ci-dessus) a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. ; Exp. — 2 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3000, le 10^e j. 2610 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

Obs. — La femme est devenue enceinte en allaitant.

TABLEAU III. — *Parturientes non-tuberculeuses, avec prédisposition héréditaire à la tuberculose du côté des deux parents.*

A. — *Primipares.*

1. (1898, n° 77) a. 16 1/2; A. H. — père mort de tuberculose à 52 ans, mère morte de tuberculose à 32 ans; A. P. — syphilis depuis le début de la grossesse; R. — 15 a. 1/2; a. gr. — 7^e m.; pas d'alb.; Exp. — 30 m.; enf. viv. faible; P. enf. — 1500; P. plac. — 450; S. C. — pathologiques, inj. utérines.

Obs. — Enfant mort le 8^e jour. Femme sortie le 11^e jour en bon état.

2. (1898, n° 101) a. 18; A. H. — parents vivants tuberculeux; A. P. — rougeole dans l'enfance, chlorose de 16 à 17 ans; a. gr. — 9^e m.; tr. alb.; Tr. — 9 h. 3/4; Exp. — 45 m.; enf. viv.; P. enf. — 2980, le 8^e j. 2730; ét. bon; P. plac. — 570; S. C. — normales.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur.

3. (1898, n° 812) a. 28; A. H. — parents morts de tuberculose; A. P. — fièvre typhoïde à 12 ans; a. gr. — ?; alb.; Exp. — 45 m.; enf. viv. faible; P. enf. — 1690, le 9^e j. 1740; ét. bon; P. plac. — 360; S. C. — normales.

4. (1898, n° 1031) a. 21; A. H. — parents morts de tuberculose; père à 36 a., mère à 47 ans; A. P. — rougeole et varicelle dans l'enfance; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. —

6 h. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2620, le 8^e j. 2520 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — lymphangite des seins.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes.

5. (1898, n^o 1947) a. 21 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 44 a., mère à 26 ans ; A. P. — nuls ; R. — 19 a. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. ; Exp. — 50 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2340, le 10^e j. 2480 ; ét. bon ; P. plac. — 260 ; S. C. — normales.

6. (1898, n^o 1964) a. 25 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. ; a. gr. — 8 m. ; tr. alb. ; Tr. — 15 h. ; Exp. — 1 h. 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2235, le 11^e j. 2320 ; ét. bon ; P. plac. — 380 ; S. C. — légère poussée fébrile.

Obs. — Femme sortie en bon état.

7. (1899, n^o 897) a. 20 1/2 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — variole à 3 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; enf. viv. ; P. enf. — 2310, le 9 j. 2190 ; ét. bon ; P. plac. — 340 ; S. C. — fièvre typhoïde.

Obs. — Femme arrivée, tête à la vulve. Fièvre typhoïde. Passée dans un service de médecine.

8. (1899, n^o 1075) a. 22 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 31 a., mère à 31 ans ; A. P. — à 20 ans rhumatisme artic. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2950, le 10^e j. 2640 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

9. (1899, n^o 1079) a. 25 ; A. H. — parents morts de tuberculose, A. P. — Syphilis au début de la grossesse, traitement spécifique ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 30 h. ; Exp.

— 3 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 2960, le 10^e j. 2630 ; ét. médiocre ; P. plac. — 800 ; S. C. — normales.

10. (1899, no 1452) a. 23 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — ? ; pas d'alb. Tr. — 14 h. ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2750, le 9^e j. 2665 ; ét. bon ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

11. (1899, no 1907) a. 37 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 39 a., mère à 30 ans ; — A. P. — ophtalmie purulente après la naissance : a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 19 h. 1/2 ; Exp. — 4 h. 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2650, le 14^e j. 2900 ; ét. bon ; P. plac. — 470 ; S. C. — fébriles : les 2^e, 3^e, 4^e, 6^e et 8^e jours tempér. au-dessus de 38°.

Obs. — Application de forceps dans l'excavation, la tête ne progressant pas. Femme sortie en bon état.

12. (1899, no 1926) a. 21 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — bronchite à 4 ans ; R. — 18 a irrég. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. Tr. — 16 h. 1/2 ; Exp. — 2 h. 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2750, le 8^e j. 2910 ; ét. bon ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

13. (1899, no 1987) a. 22 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — fluxion de poitrine à 5 ans ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 2070, le 8^e j. 1630 ; ét. médiocre ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

Obs. — Dégagement de la tête en occipito-postérieure directe.

14. (1900, no 260) a. 21 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; père à 49 ans., mère à 47 ans ; A. P. — diphtérie à 4 ans, chlorose de 16 à 19 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 24 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2480,

le 9^e j. 2540 ; ét. bon ; P. plac. — 360 ; S. C. — normales.

15. (1900, n^o 296) a. 30 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 11 h. ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2780, le 7^e j. 2700 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

16. (1900 n^o 458) a. 18 1/2 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 28 h. ; Exp. 1 h. 10 m. enf. viv. ; P. enf. — 3580, le 8^e j. 3620 ; ét. bon ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

17. (1900, n^o 560) a. 20 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — péritonite à 10 ans ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 17 h. ; Exp. — 1 h. 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2910, le 2^e j. 2710 ; ét. bon ; P. plac. — 380. ; S. C. — normales.

18. (1900, n^o 647) a. 20 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; tous les deux à 42 ans ; A. P. — scarlatine à 8 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. Tr. — 9 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2500, le 3^e j. 2300 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

19. (1900, n^o 1098) a. 23 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. 1/4 ; Exp. — 4 h. 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2790 ; P. plac. — 390 ; S. C. — normales.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur. L'enfant était cyanosé, a eu des convulsions ; il est mort le 3^e jour.

20. (1900, n^o 1137) a. 19 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; père à 40 a., mère à 28 ans ; A. P. — à 10 ans rhumatisme artic. aigu ; a. gr. — 5^e m. ; pas d'alb. ; Tr. —

24 h. ; Exp. — 40 m. ; P. plac. — 280 ; S. C. — fébriles d'abord, normales dès le 7^e jour.

Obs. — Femme arrivée à la clinique avec températ. de 40°9. Curettage. Inject. utérine à l'aniodol. S. A. 20 gr.

21. (1900, n° 1229) a. 21 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3360, le 2^e j. 3200 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

22. (1900, n° 1435) a. 17 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — atrophie de l'avant-bras gauche (dès la naissance, au dire de la femme) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 14 h. ; Exp. — 2 h. 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3550, le 8^e j. 3670 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — alb. passagère.

23. (1900, n° 1922) a. 41 ; A. H. — parents mort de tuberculose ; A. P. — érysipèle à 19 ans ; R. — 17 a. ; a. gr. — à terme ; alb., qui disparaît au moment de l'acc. ; Tr. — 6 h. 1/2 ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4000, le 11^e j. 3710 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

24. (1901, n° 221) a. 44 ; A. H. — parents mort de tuberculose : mère à 36 ans, père à 62 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. 9 h. 3/4 ; Exp. — 50 m. enf. viv., P. enf. — 3070, le 8^e j. 3000 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

25. (1901, n° 238) a. 32 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; père à 33 ans, mère à 52 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; enf. viv. ; P. enf. — 2600, le 9^e j. 2540 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes.

26. (1901, no 1094) a. 20 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; père à 50 ans, mère à 39 ans ; A. P. — nuls ; R. — 17 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 10 h. $1/4$; Exp. — 2 h. 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4300, le 12^e j. 4380 ; ét. bon ; P. plac. — 880 ; S. C. — normales.

Obs. — Gros œuf liquide amniotique abondant.

27. (1901, no 1720) a. 19 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — rougeole à 8 ans ; diphtérie à 10 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3090, le 11^e j. 3150 ; ét. bon ; P. plac. — 610 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur.

28. (1901, no 1755) a. 18 ; A. H. — père mort de tuberculose à 35 ans, mère tuberculeuse ; A. P. — rougeole à 4 ans ; R. — 14 ans, mal, n'a pas vu ses règles depuis 1 an ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. $1/2$; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3250, le 8^e j. 3250 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

29. (1901, no 1951) a. 22 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; père à 40 a., mère à 33 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. $1/2$; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2350, le 8^e j. 3500 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

30. (1901, no 2057) a. 17 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; père à 35 ans, mère à 33 ans ; A. P. — variole dans l'enfance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 12 h. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3200, le 9^e j. 3460 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — le 3^e j. frisson, températ. — 40°5, inject. utér., — normales ensuite.

Obs. — Femme sortie en bon état.

31. (1902, n^o 185) a. 23; A. H. — parents morts de tuberculose : mère à 31 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2900, le 9^e j. 3020 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales,

Obs. — Présentation du siège complet.

32. (1902, n^o 630) a. 22; A. H. — parents morts de tuberculose vers l'âge de 40 ans ; A. P. — à 9 ans variole, vers 17 ans leucorrhée pend. 6 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 24 h. 1/2 ; Exp. — 40 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3820, le 9^e j. 3700 ; ét. bon ; P. plac. 680 ; S. C. — normales.

33. (1902, n^o 750) a. 22; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 46 a., mère à 36 ans — trois frères et sœurs (sur 8) morts de tuberculose jeunes ; A. P. — bronchites légères dans l'enfance ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 6 h. 1/2 ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3320, le 8^e j. 3560 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

34. (1902, n^o 758) a. 20 ; A. H. — parents morts de tuberculose : mère à 36 a., père à 51 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 8 h. 3/4 ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3400, le 9^e j. 3400 ; ét. bon ; P. plac. — 630 ; S. C. — normales.

35. (1902, n^o 829) a. 25 ; A. H. — parents morts de tuberculose (mère il y a 24 ans, père il y a 2 ans) ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 4 h. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3180, le 16^e j. 3070 ; ét. bon ; P. plac. — 440 ; S. C. — lymphangite du sein gauche.

36. (1902, n^o 1178) a. 25 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. 17 a. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ;

Tr. — 17 h. ; Exp. — 1 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 2290, le 8^e j. 2210 ; P. plac. — 300 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta bordé, entièrement découronné.

37. (1902, n^o 1196) a. 25 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — convulsions jusqu'à l'âge de 2 ans, ophtalmie jusqu'à 3 ans, rougeole à 5 ans, incontinence d'urine nocturne ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. 13 h. 1/2 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2820, le 6^e j. 2710 ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

38. (1903, n^o 191) a. 21 ; A. H. — père et mère morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 7^e j. 2770 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

39. (1903, n^o 483) a. 21 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 30 a., mère à 35 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 9 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. 1/4 ; enf. viv. ; P. enf. — 2850, le 8^e j. 2810 ; ét. bon ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

40. (1903, n^o 667) a. 22 ; A. H. — parents morts de tuberculose : mère à 32 a., père à 45 ; A. P. — à 12 ans bronchite, à 19 ans opérée pour un kyste du col de l'utérus ; R. — 17 a. ; a. gr. — 5 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 19 h. ; enf. mort ; P. enf. — 280 ; P. plac. — 150 ; S. C. — normales.

Obs. — Saturnisme paternel ?

41. (1903, n^o 708) a. 24 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; mère à 36 ans, père à 45 ans, — une sœur morte de tuberculose à 20 ans ; A. P. — nuls ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 26 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. — enf. 2420, le 9^e j. 2400 ; P. plac. — 280 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur.

42. (1903, n^o 1389) a. 25 ; A. H. — parents morts de tuber-

culose ; A. P. — anémie à 15 ans ; a. gr.— 9^e m. ; alb. ; Tr. — 14 h. 3/4 ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3120, le 9^e j. 3060 ; P. plac. — 610 ; S. C. — normales.

43. (1903, n^o 1871) a. 32 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 126 h. ; Exp. — 2 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3900, le 16^e j. 3770 ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin rétréci ; promontoire accessible. Travail très long. Application de forceps dans l'excavation en GT.

B. — *Multipares.*

44. (1898, n^o 153) a. 24 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 33 a., mère à 23 ans ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1896 acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3030, le 8^e j. 3120 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — grippe.

Obs. — La femme est devenue enceinte en allaitant. Sortie le 9^e jour en bon état.

45. (1898, n^o 445) a. 27 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — rougeole à 6 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 acc. norm. enf. viv. s. m. puis bib. b. p. ; a gr. — à terme. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 4220, le 7^e j. 3990 ; ét. bon ; P. plac. — 670 ; S. C. — normales.

46 (1898, n^o 1850) a. 20 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; I-pare ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 1 h. ; enf. viv. ; P. enf. 3550, le 7^e j. 3850 ; ét. bon ; P. plac. 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel 3 mois, puis au biberon, est mort à 6 mois de rougeole.

« (1900, n° 70) a. 21 ; II-pare m. p. ; A. obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 2 h. 1/4 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. — enf. 3160, le 10^e j. 3500 ; ét. bon ; — P. plac. 460 ; S. C. — normales.

47. (1898, n° 1983) a. 31 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare, m. p. ; A. obst. — en 1887 acc. norm. enf. viv., mort de méningite à 2 ans 1/2 ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. 3/4 ; Exp. — 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3610, le 7^e j. 3330 ; ét. bon ; P. plac. — 630 ; S. C. — normales.

48. (1899, n° 1997) a. 24 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. s. m. 8 mois b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2710, le 8^e j. 2730 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

49. (1899, n° 2293) a. 23 ; A. H. — parents morts de tuberculose : mère à 20 a. ; père à 42 ans ; A. P. — rougeole et croup dans l'enfance ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib. mort à 6 mois de diarrhée ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3520, le 8^e j. 3510 ; ét. bon ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales.

50. (1899, n° 2340) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose pulmonaire, mère morte de tuberculose laryngée ; A. P. — nuls ; I-pare ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 22 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2840, le 8^e j. 3030 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel 15 mois, était bien portant à 2 ans.

« (1901, n° 2160) a. 24 ; II-pare m. p. ; A. obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3000, le 8^e j. 3180 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

51. (1899, n° 2359) a. 23 ; A. H. — parents morts de tuberculose : mère à 33 ans, père à 57 ans ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 acc. norm. enf. viv. s. m. 14 mois b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/4 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. 4140, le 8^e j. 4100 ; ét. bon ; P. plac. — 630 ; S. C. — normales.

52. (1900, n° 222) a. 33 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. s. m. 2 ans b. p. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; S. C. — fébriles, inject. utér. répétées.

Obs. — Femme accouchée chez elle. Délivrance artificielle, tentée chez elle sans résultat, faite à la Clinique. Sortie en bon état.

53. (1900, n° 477) a. 24 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 15 a. 1/2 ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. s. m., mort à 1 mois de broncho-pneumonie ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 5 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3150, le 9^e j. 3160 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

54. (1900, n° 1404) a. 21 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 25 a., mère à 29 ans ; A. P. — rougeole à 2 ans, angine à répétition de 6 à 10 ans, anémie à 18 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. en 1899, avortement de 5 mois ; a. gr. — 3^e m. ; pas d'alb. ; S. C. — normales.

55. (1900, n° 2115) a. 20 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib., mort à 3 mois ; a. gr. — 7^e m. ; pas d'alb. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 1500, le 12^e j. 1370 ; ét. faible ; P. plac. — 380 ; S. C. — normales.

56. (1902, n° 268) a. 25 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — diphtérie vers 6 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. prém. à 8 m. enf. viv. s. m. 15 mois b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3650, le 10^e j. 3780 ; ét. bon ; P. plac. — 680 ; S. C. — normales.

57. (1902, n° 640) a. 31 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 30 a., mère à 29 ans ; A. P. — rhumatisme articulaire à 27 ans ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1900 acc. prém. à 6 mois fœtus mort et macéré ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 5 h. ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. — enf. 2950, le 5^e j. 2940 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

58. (1902, n° 847) a. 26 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 42 a., mère à 37 ans ; A. P. — nuls ; — R. 16 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1901 avortem. de 6 semaines ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 15 h. 3/4 ; Exp. — 50 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3070, le 7^e j. 2800 ; ét. bon ; P. plac. — 380 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur.

59. (1902, n° 1208) a. 21 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — fièvre typhoïde à 11 ans ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1900 acc. à terme forceps enf. viv. bib., mort à 1 mois ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3000, le 7^e j. 2790 ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

60. (1901, no 1261) a. 21 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 18 a. irrégul. ; I-pare ; a. gr. — à terme ; alb. légère ; Tr. — 7 h ; Exp. — 30 m. ; enfant viv. ; P. enf. — 2330, le 16^e j. 2440 ; ét. bon ; P. plac. — 380 ; S. C. — normales.

Obs. — Insertion vélamenteuse du cordon. Cet enfant, élevé au sein maternel 17 mois, était bien portant à 2 ans.

« (1903, n° 525) a. 23 ; II-pare ; A. obst. (v. ci-dessus) ; a. gr. — 4 m. 1/2 ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 1/4 ; enf. viv., mort bientôt ; P. enf. — 305 ; P. plac. — 150 ; S. C. — normales.

Obs. — Enfant expulsé vivant. Placenta extrait 15 h. après.

61. (1903, no 662) a. 22 ; A. H. — parents morts de tuberculose, un frère tousse toujours ; A. P. — nuls ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1902 acc. norm. enf. viv. nourri au verre b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 1/4 ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3090, le 8^e j. 3130 ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

62. (1903, no 1253) a. 24 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; II-pare p. d. ; A. obst. en 1902 acc. prémat. à 8 m. enf. viv. s. m. 2 m. 1/2 puis bib., mort à 4 mois de méningite ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3630, le 8^e j. 3990 ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

63. (1898, no 1170) a. 27 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. ; A. obst. en 1894 et 1897 deux acc. norm. enf. viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 4 h. 1/4 ; Exp. — 1 h. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3860, le 5^e j. 3740 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

64. (1900, no 645) a. 30 ; A. H. — parents morts de tuber-

culose ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1890 acc. prém. à 8 m. hémorrhagie travail long enf. mort-né ; 2) en 1895 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Exp. — 10 m. , enf. viv. ; P. enf. — 3280, le 11^e j. 3350 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — lymphangite des deux seins.

65. (1900, n^o 1588) a. 35 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; III-pare p. d. ; A. obst. en 1888 et 1894 deux acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 12 h. 1/2 ; Exp. 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2850, le 11^e j. 3020 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

66. (1900, n^o 1788) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans, père mort de pleurésie à 35 ans ; A. P. — chloro-anémie de 16 à 20 ans ; III-pare m. p. ; A. obst. en 1897 et 1899 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 3 mois, puis s. n. 14 mois, b. p., le 2^e bib. mort à 4 mois ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. 20 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 2050, le 8^e j. 2110 ; P. plac. — 300 ; S. C. — lymphangite du sein droit.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur. Ophtalmie purulente bilatérale.

67. (1901, n^o 902) a. 25 ; A. H. — parents tuberculeux ; A. P. — bronchite dans l'enfance ; a vomi du sang à partir de l'âge de 14 ans jusqu'à l'apparition des règles ; R. — 17 a. 1/2 ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 deux avortements ; a. gr. — 7 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. mort et macéré ; P. enf. — 1900 ; P. plac. — 560 ; S. C. — une fois températ. = 39°4.

Obs. — Le père de l'enfant est syphilitique.

68. (1901, n^o 2070) a. 26 ; A. H. — parents morts de tuber-

culose : père à 45 a., mère à 36 ans ; A. P. — nuls ; III-pare m. p. ; A. obst. en 1897 et 1899 deux acc. près du terme enf. viv. s. m. 15 et 17 mois b. p. ; a. gr. — 8^e m. ; tr. alb. ; Tr. 1 h. 1/2 ; Exp. momentanée ; enf. viv. ; P. enf. — 2400, le 9^e j. 2500 ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes,

69. (1902, n^o 1153) a. 24 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 16 a. irrégul. ; III-pare m. p. ; A. obst. 1) en 1898 acc. à terme siège enf. viv. s. m. 15 mois b. p. ; 2) en 1901 acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 14 h. ; Exp. 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2820, le 8^e j. 2720 ; P. plac. — 460 ; S. C. — normales,

Obs. — Hernie inguinale dans la grande lèvre droite.

70. (1898, n^o 1895) a. 40 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 48 ans, mère à 39 ans ; A. P. — métrite du col à 36 ans ; IV-pare m. p. pour 2 dern. ; A. obst. — en 1880 et 1884 deux acc. norm., en 1895 avortem. de 2 mois ; a. gr. — 9^e m. ; tr. alb. ; Exp. 1) 10 m., 2) 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1) 2250, le 10^e j. 2390 ; 2) 2250, le 10^e j. 2350 ; ét. bon ; P. plac. — 780 ; S. C. — normales.

Obs. — Accouchement gémellaire : 1) siège, 2) sommet.

71. (1901, n^o 105) a. 28 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 32 ans, mère à 25 ans ; A. P. — chloro-anémie de longue durée, à 25 ans salpingite à droite ; R. — 9 ans ; IV-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 avortem. de six semaines, en 1896 et 1898 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} bib. b. p., le 2^e s. m. 16 mois b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr.

6 h. 1/2; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3390, le 7^e j. 3530; ét. bon; P. plac. — 530; S. C. — normales.

72. (1901, n° 869) a. 34; A. H. — parents morts de tuberculose; A. P. — coqueluche à 14 mois, à 16 ans fièvre typhoïde, jusqu'à l'âge de 18 ans incontinence d'urine nocturne, — depuis l'âge de 18 ans absences fréquentes; IV-pare m. p.; A. obst. en 1891 et 1899 deux acc. norm. enf. viv., en 1896 acc. à terme forceps enf. viv., les 3 enf. s. m. (de 12 à 14 mois), les 2^e et 3^e b. p., le 1^{er} mort à 9 ans de fièvre typhoïde; a. gr. — près du terme; pas d'alb.; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 3120, le 8^e j. 3060; ét. bon; P. plac. — 460; S. C. — normales.

73. (1902, n° 522) a. 22; A. H. — parents morts de tuberculose; A. P. — nuls; IV-paré p. d.; A. obst. 1) acc. à 8 m. 1/2 enf. viv., mort à 9 mois; 2) acc. à 7 m. enf. mort au bout de 12 jours; 3) acc. norm. enf. viv.; bib. b. p.; a. gr. — près du terme; pas d'alb.; Tr. — 1 h.; enf. viv.; P. enf. — 3500, le 8^e j. 3270; ét. bon; P. plac. — 550; S. C. — normales.

74. (1903 n° 566) a. 20; A. H. — parents morts de tuberculose; père à 57 a., mère à 52 ans; A. P. — nuls; IV-pare m. p. pour 2 derniers; A. obst. — en 1898 et 1899 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} bib. mort à 11 mois de méningite, le 2^e s. m. 4 mois puis allaitem. mixte b. p., — en 1901 acc. prémat. à 6 m. 1/2 enf. mort au bout de 2 heures; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 6 h. 1/2; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 2400, le 7^e j. 2500; ét. bon; P. plac. — 450; S. C. — normales.

75. (1898, n° 979) a. 40; A. H. — parents morts de tuberculose; A. P. — nuls; VI-paré m. p.; A. obst. — en 1881.

1882, 1885, 1887 et 1889 cinq acc. norm. enf. viv. bib., les 1^{er} et le 4^e viv. b. p. ; a. gr. 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. 9 h. 1/2 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2360, le 8^e j. 2490 ; ét. bon ; P. plac. — 410 ; S. C. — normales.

76. (1899, no 1607) a. 32 ; A. II. — parents morts de tuberculose : père à 36 a., mère à 44 ans ; A. P. — à 8 ans rougeole ; R. — 16 a., VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1887, 1889, 1892, 1904 et 1897 cinq acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. ; a. gr. 7^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1220 ; P. plac. — 280 ; S. C. — normales.

Obs. — Enfant mort le lendemain.

77. (1901, no 1141) a. 32 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. 9 a. ; VII-pare m. p. ; A. obst. — en 1893, 1894, 1895, 1896 et 1897 cinq acc. prém. (5 à 7 mois), en 1898 acc. à terme, toujours siège, le 1^{er} enf. s. m. mort à 3 mois, le dernier mort pendant le travail, tous les autres sont nés morts et macérés ; a. gr. — 9^e m. ; tr. alb. ; Tr. — 3 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3280, le 8^e j. 3350 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

Obs. — Saturnisme paternel. Endométrite hémorrhagique. Cette fois présentation du sommet.

78. (1898, no 700) a. 30 ; A. II. — parents morts de tuberculose dans la même année : père à 30 a., mère à 29 ans ; A. P. — scarlatine à 7 ans, fièvre typhoïde à 8 ans, rougeole à 14 ans, variole à 18 ans ; R. — 17 a. ; V-pare m. p. pour 4 dern. ; A. obst. — en 1892, 1893, 1895 et 1896 quatre acc. norm. enf. viv., les 1^{er} et 4^e viv. b. p., les autres mort ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Exp. — 5 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 2400 le 7^e j. 2320 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel 1 mois, puis au biberon, est mort à 1 mois 1/2 de tuberculose.

« (1899, n° 885) a. 32; VI-pare m. p. ; A. obst. (V. ci-dessus) ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2850, le 7^e j. 2950 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 3 m. de diarrhée.

« (1900, n° 1999) a. 33 ; VII-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 7 h. 1/4 ; enf. viv. ; P. enf. — 3340, le 7^e j. 3240 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 6 m. 1/2 de convulsions.

« (1902, n° 204) a. 35 ; VIII-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2900, le 5^e j. 2500 ; P. plac. — 590 ; S. C. — normales.

TABLEAU IV. — *Parturientes non tuberculeuses, avec prédisposition héréditaire à la tuberculose, ayant eu des affections diverses des voies respiratoires en dehors de la puerpéralité.*

A. — *Primipares.*

1. (1898, n^o 1629) a. 28 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — bronchite à 22 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 15 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2550, le 9^e j. 2650 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

2. (1901, n^o 419) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 40 ans ; A. P. — à 12 ans fluxion de poitrine, laryngites et bronchites fréquentes ; R. — 18 a. irrég. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. Tr. — 13 h. ; Exp. — 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2620, le 12^e j. 2630 ; ét. bon ; P. plac. — 420 ; S. C. deux fois temp. au-dessus de 38°.

3. (1901, n^o 446) a. 28 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — rougeole à 12 ans, influenza à 18 ans ; R. — 16 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. 1/4 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3280, le 5^e j. 3240 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

4. (1901, n^o 637) a. 23 ; A. H. — parents morts de tuberculose : mère à 39 a., père à 50 ans ; A. P. rougeole, bronchite dans le bas-âge (qui a duré jusqu'à 7 ans) ; a. gr. —

8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. $\frac{1}{4}$; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2430, le 9^e j. 2400 ; ét. bon ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

5. (1901, n^o 664) a. 19 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — à 6 ans coqueluche, scarlatine, à 16 ans bronchite ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3250, le 10^e j. 3320 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

6. (1901, n^o 1166) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 2 ans et à 9 ans, influenza à 18 ans, ensuite épistaxis pendant 3 mois et anémie pendant 1 an ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 11 h. $\frac{1}{2}$; Exp. — 1 h. $\frac{1}{2}$; enf. viv. ; P. enf. — 2550, le 9^e j. 3530 ; ét. bon ; P. plac. — 400 ; S. C. — normales.

7. (1901, n^o 1345) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — à 7 ans rougeole, à 9 ans typhus, à 20 ans bronchite aiguë ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 23 h. $\frac{1}{4}$; Exp. — 4 h. $\frac{1}{4}$; enf. viv. ; P. enf. — 3420, le 8^e j. 3450 ; P. plac. — 490 ; S. C. — normales.

Obs. — Application de forceps dans l'excavation, la tête ne progressant pas.

8. (1901, n^o 1570) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — dès l'âge de 23 ans chloro-anémie, leucorrhée, — tousses depuis 3 ans (pointes de feu sur le dos et sur la poitrine) ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3280, le 24^e j. 3460 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

9. (1902, n^o 157) a. 28 ; A. H. — père mort de tuberculose, mère morte de bronchite (tous les deux à 49 ans) ; A. P. — à 3 ans bronchite, jusqu'à l'âge de 12 ans a toujours

toussé, — voix enrouée, — leucorrhée; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 3 h. $\frac{3}{4}$; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3140, le 4^e j. 2890; ét. bon; P. plac. — 490; S. C. — normales.

Obs. — Le père de l'enfant est mort de tuberculose il y a 1 mois.

10. (1902, n° 515) a. 21; A. H. — mère morte de tuberculose à 29 ans; A. P. — rougeole à 10 ans, à 16 ans opérée pour tumeurs adénoïdes du pharynx, — s'enrhume facilement; a. gr. — 8 m.; pas d'alb.; Tr. — 9 h.; Exp. — 35 m.; enf. viv.; P. enf. — 2500, le 2^e j. 2460; ét. bon; P. plac. — 460; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes.

11. (1902, n° 1280) a. 23; A. H. — mère morte de tuberculose; A. P. — a toujours toussé; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 7 h. $\frac{3}{4}$; Exp. — 1 h.; enf. viv.; P. enf. — 3000, — le 3^e j. 2800; P. plac. — 600; S. C. — normales.

12. (1902, n° 1414) a. 36; A. H. — mère morte de tuberculose à 38 ans; A. P. — broncho-laryngite à 23 ans; R — 17 a.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 18 h.; Exp. — 4 h. 25 m.; enf. viv.; P. enf. — 3400, le 7^e j. 3310; ét. bon; P. plac. — 600; S. C. — normales.

13. (1903, n° 1488) a. 24; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — pneumonie à 20 ans; R. — 18 a.; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 27 h. $\frac{1}{4}$; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 2380, le 8^e j. 2250; ét. bon; P. plac. — 300; S. C. — normales.

14. (1903, n° 10) a. 38; A. H. — mère morte de tuberculose à 46 ans; A. P. — rougeole dans l'enfance, chlorose à 18 ans, —

à 25 ans maladie de poitrine, avait beaucoup maigri, depuis son état s'est amélioré; a. gr. — 5 m. environ; pas d'alb.; Tr. — 14 h. 1/4; Exp. — 40 m.; enf. mort après quelques inspirations; P. enf. — 650; P. plac. — 150; S. C. — normales.

15. (1903, n° 973) a. 27; A. H. — mère morte de tuberculose à 29 ans; A. P. — pieds bots de naissance, — anémie à 22 ans (était alors 8 mois sans être réglée), touse souvent; R. — 19 a.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 21 h. 1/2; Exp. — 2 h. 25 m.; enf. viv.; P. enf. — 2750, le 9^e j. 2770; P. plac. — 480; S. C. — normales.

B. — *Multipares.*

16. (1898, n° 827) a. 30; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — à 25 ans bronchite qui dura 3 mois, touse depuis tous les hivers; II-pare p. d.; A. obst. — en 1895 acc. norm. enf. viv., mort d'entérite à 18 mois; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 8 h. 1/2; Exp. — 20 m.; enf. viv.; P. enf. — 3360, le 22^e j. 3940; ét. bon; P. plac. — 500; S. C. — alb. avec fièvre, — alb. disparaît le 19^e jour.

17. (1898, n° 959) a. 33; A. H. — mère morte de tuberculose à 23 ans; A. P. — rougeole à 7 ans, influenza à 28 ans; II-pare m. p.; A. obst. — en 1897 acc. à terme forceps enf. viv., mort à 4 mois de broncho-pneumonie; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 9 h.; enf. viv.; P. enf. — 3600; le 12^e j. 3590; ét. bon; P. plac. — 640; S. C. — normales.

18. (1898, n° 1321) a. 27; A. H. — parents morts de tuberculose; A. P. — fluxion de poitrine à 7 ans; II-pare, m.

p. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib., mort à 13 mois ; a. gr. — à terme ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3170, le 7^e j. 3120 ; ét. bon ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

19. (1898, no 1661) a. 40 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — pneumonie à 2 ans, bronchite à 19 ans ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1884 acc. à terme forceps enf. viv. s. m. 22 mois b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2880, le 10^e j. 3030 ; ét. bon ; P. plac. — 490 ; S. C. — normales.

20. (1899, no 811) a. 27 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans (était déjà malade à l'époque de la naissance de cette femme), une sœur tuberculeuse ; A. P. — paralysie infantile à 3 ans, ayant entraîné l'atrophie de la jambe gauche, rougeole à 11 ans, bronchite à 24 ans, tousses tous les hivers ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. s. m., mort à 18 jours d'entérite ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 10 m ; enf. viv. ; P. enf. — 2820, le 10^e j. 3040 ; ét. bon ; P. plac. — 440 ; S. C. — lymphangite des seins.

21. (1899, no 1451) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 39 ans ; A. P. — à 10 ans fluxion de poitrine ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — 7 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. $\frac{1}{4}$; Exp. — 30. m ; enf. viv. faible ; P. enf. — 1550 ; P. plac. — 370 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur. Enfant mort le 10^e jour. Le père des enfants est tuberculeux.

22. (1900, n^o 496) a. 22 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — rougeole dans l'enfance, scarlatine à 13 ans, tousses souvent ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. s. m., mort à 6 mois de bronchopneu-

monie ; a. gr. — à terme ; tr. alb. ; Tr. — 14 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. P. enf. — 3520, le 6^e j. 3600 ; ét. bon ; P. plac. — 680 ; S. C. — normales.

23. (1900, n° 926) a. 31 ; A. H. — parents morts jeunes de tuberculose ; A. P. — à 24 ans rougeole compliquée de bronchopneumonie, s'enrhume facilement ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 acc. norm. enf. viv. s. n. 5 mois puis bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 3/4 ; Exp. b. 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3250, le 9^e j. 3280 ; ét. bon ; P. plac. — 660 ; S. C. — normales.

24. (1900, n° 1228) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 46 ans ; A. P. — bronchite à 22 ans ; R. — 15 a. 1/2 ; I-pare ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3000, le 11^e j. 3040 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au biberon, est mort à 3 mois de diarrhée.

« (1901, n° 2046) ; II-pare m. p. ; A. obst. (V. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3600, le 9^e j. 3500 ; ét. bon ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

25. (1900, n° 2387) a. 26 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 48 a., mère à 38 ans ; A. P. — scarlatine à 12, fluxion de poitrine à 13 ans ; I-pare ; a. gr. — 8 m. (?) ; pas d'alb. ; Tr. — 10 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3810, le 9^e j. — 3700 ; ét. bon ; P. plac. — 660 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta prævia. Hémorrhagies pendant la grossesse. L'enfant, élevé au sein maternel 12 mois, était bien portant en 1903.

« (1903, n° 277) a. 28 ; II-pare m. p. ; A. obst. (V. ci-dessus) ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. 13 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3750, le 7^e j. 3900 ; ét. bon ; P. plac. 730 ; S. C. — normales.

Obs. — Hémorrhagie de la délivrance.

26. (1901, n° 1785) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 24 ans ; A. P. — bronchite chronique depuis 10 ans ; R. — 17 a. ; II-pare m. p. , A. obst. en 1897 acc. norm. enf. viv. s. m. 6 semaines puis bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 8^e j. — 3440 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

27. (1902, n° 1047) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — dès l'âge de 15 ans la femme toussait pendant 3 ans, mais elle n'a pas maigri, — cette toux a disparu au début de la 1^{re} grossesse ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1896 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. 3/4 ; Exp. 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3650, le 7^e j. 3850 ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

28. (1903, n° 664) a. 29 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 50 a. ; mère à 53 ans ; A. P. — à 14 ans fièvre typhoïde, — bronchites fréquentes en automne et en hiver ; R. — 18 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1901 acc. norm. enf. viv. s. m. 14 mois mort alors de méningite tuberculeuse ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3620, le 8^e j. 3340 ; P. plac. — 710 ; S. C. — normales.

29. (1899, n° 263) a. 33 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 33 ans ; A. P. — fluxion de poitrine 2 fois à 11 et à 15 ans, — leucorrhée ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1892

enf. mort et macéré, en 1895 acc. norm. enf. viv. s. m. 22 mois b. p. ; a. gr. — 8^e m. ; alb. ; Exp. — quelques minutes ; enf. mort et macéré ; P. enf. — 1200 ; P. plac. — 190 ; S. C. — alb. sans fièvre.

Obs. — Infarctus multiples du placenta.

30. (1899, n^o 1510) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose, un frère tuberculeux ; A. P. — à 10 ans fièvre typhoïde, tousses tous les hivers ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. à 7 m. 1/2 enf. viv. s. m. 15 mois b. p. ; a. gr. à terme ; tr. alb. ; Tr. — 2 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3780, le 8^e j. 3970 ; ét. b. ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant élevé au sein maternel 20 mois était bien portant en 1902.

« (1902, n^o 43) a. 27 ; III-pare m. p. ; A. obst. (V. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4050, le 9^e j. 4080 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

31. (1901, n^o 98) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 39 ans ; A. P. — pneumonie à 20 ans ; III-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1897 acc. norm. enf. viv. s. m. 4 mois puis bib. mort à 18 mois ; 2) en 1899 acc. norm. enf. viv. s. n. 14 mois b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/2 ; Exp. — 35 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3600, le 7^e j. 3650 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

32. (1902, n^o 1514) a. 33 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — à 16 ans typhus, gripes fréquentes, tousses fréquemment ; R. 17 a. mal ; III-pare p. d. ; A. obst. — 1) en 1890 acc. à 8 m. 1/2 enf. viv. s. n. mort à 4 mois de choléra ; 2) en 1894 acc. norm. enf. viv. s. n. enf. atteint d'une

adénite tuberculeuse ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. $\frac{3}{4}$; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3950, le 10^e j. 3880 ; ét. bon ; P. plac. — 670 ; S. C. — normales.

33. (1898, n^o 634) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — à 7 ans bronchite (dont elle s'en ressent tous les hivers), depuis l'âge de 18 ans gastrite ; I-pare ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2900, le 7^e j. 3000 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, allaité par la mère, est mort à 1 mois.

« (1899, n^o 726) a. 27 ; II-pare m. p. ; A. obst. — (v. ci-dessus) ; au 3^e mois de cette grossesse elle a été opérée d'un kyste du vagin ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3820, le 9^e j. 3920 ; ét. bon ; P. plac. — 580 ; S. C. — normales.

Obs. — Gros œuf. — L'enfant, élevé au sein maternel 8 mois, puis au biberon, était bien portant en 1903.

« (1901, n^o 1530) a. 29 ; III-pare m. p. ; A. obst. (v. ci-dessus) ; une maladie de foie pendant les 3 premiers mois de cette grossesse ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. $\frac{1}{2}$; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3700, le 9^e j. 3800 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, allaité par la mère pendant 1 an, était bien portant en 1903.

« (1903, n^o 801) a. 31 ; IV-pare m. p. ; A. obst. (V. ci-dessus) ; la femme est devenue enceinte en allaitant ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. $\frac{1}{2}$; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3550, le 8^e j. 3500 ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

34. (1898, n^o 816) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — chlorose à 15 ans, variole à 24 ans ; s'enrhume

facilement ; IV-pare p. d. ; A. obst. — en 1889, 1890 et 1895 trois acc. norm. (m. p.) enf. viv., le 1^{er} mort d'érysipèle à 8 mois, le 2^e mort de tuberculose à 7 ans 1/2, le 3^e viv. b. p. ; a. gr. — 3 m. ; tr. alb. ; œuf entier de 140 gr. ; S. C. — normales.

Obs. — Membranes de l'œuf épaissies. Hémorrhagies sous-choriales.

35. (1898, n° 1816) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 34 ans. père tuberculeux ; A. P. — rougeole dans l'enfance, à 7 ans fièvre typhoïde, à 16 ans bronchite ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. prém. au 8^e m., enf. mort le lendemain ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. — Exp. — 15 m. ; enf. mort et macéré ; P. enf. — 2620 ; P. plac. — 630 ; S. C. — normales.

Obs. — Cessation des mouvements actifs depuis 15 jours.

« (1900, n° 2156) a. 23 ; III-pare p. d. ; A. obst. (V. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 12 h. 3/4 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3710, le 9^e j. 3970 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, allaité par la mère 2 mois, puis par une nourrice, était bien portant en 1902.

« (1902, n° 313) a. 24 ; IV-pare m. p. ; A. obst. (V. ci-dessus) ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Exp. une contraction ; — enf. viv. ; P. enf. — 3500, le 7^e j. 3330 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

36. (1902, n° 340) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 48 ans ; A. P. — fluxion de poitrine à 23 ans ; IV-pare ; A. obst. — en 1895 et 1897 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} sein et bib. mort de méningite à 3 ans 1/2, le 2^e bib. mort de méningite à 2 ans 1/2, — en 1899 avortem. de 2 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 7 h. 3/4 ; Exp. — 15 m. ; enf.

viv. ; P. enf. — 3630, le 8^e j. 3810; ét. bon ; P. plac. — 670 ; S. C. — normales.

37. (1902, n^o 688) a. 35 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 25 ans ; A. P. — fluxion de poitrine à 13 ans, de 7 à 15 ans a beaucoup toussé, plusieurs bronchites ; R — 18 a. ; IV-pare m. p. ; A. obst. — en 1892 et 1898 deux acc. à 7 m. siège compl. enf. morts macérés, en 1895 acc. norm. enf. viv. s. m. b. p. ; a. gr. — à terme ; forte alb. ; Tr. — 20 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2340, le 8^e j. 2350 ; ét. bon ; P. plac. — 390 ; S. C. — normales.

38. (1903, n^o 653) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 38 ans ; A. P. — anémie à 18 ans, pneumonie à 22 ans ; R. — 18 a. ; IV-pare m. p. ; A. obst. — en 1898, 1899 et 1901 trois acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 10 mois mort de croup à 4 ans ; le 2^e s. m. 3 mois puis bib. b. p. ; le 3^e s. m. 3 mois puis bib. mort de croup à 8 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 3/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3600, le 8^e j. 3480 ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

39. (1901, n^o 1282) a. 28 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; H. P. — rougeole à 9 ans, pneumonie à 22 ans ; IV-pare m. p. ; A. obst. — en 1891, 1893 et 1895 trois acc. norm. enf. viv. bib., le 1^{er} seul. b. p., les 2 autres morts de convulsions ; a. gr. 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2920, le 8^e j. 2880 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S.C. — le lendemain températ. — 38°8, inject. utérine, norm. ensuite.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur.

40. (1901, n^o 2048) a. 34 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 32 ans ; A. P. — variole à 18 mois, à 11 ans coxalgie gauche, à 16 ans érysipèle, à 30 ans bronchite ; s'enrhume

facilement; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1890, 1891, 1892, 1896 et 1898 cinq acc. norm. enf. viv. s. m., tous morts sauf le dernier b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. ; 2600, le 9^e j. 2800 ; ét. bon ; P. plac. — 320 ; S. C. — normales.

41. (1900, n° 775) a. 32 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 30 ans ; A. P. — à 20 ans fièvre typhoïde compliquée de phlébite à la jambe gauche, bronchites successives tous les hivers ; R. — 18 a. ; V-pare m. p. ; A. obst. — 1) en 1894 acc. à 8 m. 1/2 enf. viv. bib. mort à 5 ans de rougeole ; 2) en 1896 acc. norm. enf. viv. bib. mort à 2 a. 1/2 de rougeole ; 3) en 1897 acc. norm. enf. viv. s. m. 14 mois, mort alors ; 4) en 1899 avortem. de 2 m. 1/2 ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3900, le 8^e j. 3980 ; ét. bon ; P. plac. 720 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant est mort de tuberculose à l'âge de 2 ans.

« (1903, n° 1515) a. 35 ; VII-pare m. p. ; A. obst. (v. ci-dessus) et encore un avortement de 3 mois ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3600, le 7^e j. 3500 ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

42. (1898, n° 1142) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose à 47 ans ; A. P. — rougeole dans l'enfance, a toujours toussé, bronchites fréquentes ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1891, 1892, 1894 et 1896 quatre acc. norm. enf. viv. s. m., le 2^e mort à 6 ans de méningite, les autres viv. b. p., — en 1895 avort. de 5 mois ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 15 h. envir. ; Exp. — 1) 15 m. ; 2) 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1) 2600, le 10^e j. 2470 ; — 2) 2450, le 10^e j. 2280 ; ét. bon ; P. plac. — 1100 ; S. C. — normales.

Obs. — Accouch. gémellaire : 2 sièges décompl. mode des fesses, 2 filles élevées au sein maternel 14 mois, bien portantes en 1902.

« (1902, n° 1802) a. 30; VIII-pare m. p. ; A. obst (V. ci-dessus) et encore en 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. 13 m. b. p. ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1) 2070, le 8^e j. 1980 ; — 2) 2750, le 8^e j. 2540 ; P. plac. — 980 ; S. C. — normales.

Obs. — Accouch. gémellaire : 1) siège ; 2) sommet ; 2 filles. Placenta unique sur le segment inférieur.

43. (1902, n° 492) a. 32 ; A. H. — père mort de tuberculose à 46 ans, trois frères et sœurs morts de tuberculose entre 30 et 35 ans ; A. P. — bronchite à 28 ans ; X-pare ; A. obst. — en 1889, 1890, 1892, 1893, 1897, 1898 et 1899 sept acc. norm., enf. viv., en 1895 avortem. de 4 mois, en 1901 acc. à terme siège enf. viv., tous les enf. bib., 3 sont viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; Exp. 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3880, le 6^e j. 3300 ; ét. bon ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège complet.

TABLEAU V. — *Parturientes non tuberculeuses, avec la prédisposition héréditaire à la tuberculose, ayant eu des pleurésies ou des hémoptysies en dehors de la puerpéralité.*

A. — *Primipares.*

1. (1898, no 925) a. 22 ; A. H. — père mort de granulie ; A. P. — pleurésie à 7 ans, toussé toujours depuis ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 22 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 2640, le 9^e j. 2800 ; ét. bon ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

2. (1898, no 1664) a. 34 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — pleurésie dans l'enfance, fièvre typhoïde à 24 ans, péritonite à 25 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/4 ; Exp. — 2 h. 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3800, le 9^e j. 3640 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

Obs. — Application de forceps pour inertie utérine.

3. (1899, no 96) a. 20 ; A. H. — parents, un frère et une sœur morts de tuberculose ; A. P. — scarlatine à 14 ans, à 16 ans pleurésie gauche à deux reprises, ne toussé plus depuis deux ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2970, le 8^e j. 3070 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

4. (1899, no 170) a. 22 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — pleurésie à 17 ans ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. , P. enf. — 2870, le 8^e j. 2800 ; ét. bon ; P. plac. — 465 ; S. C. — normales.

5. (1899, n° 616) a. 28; A. H. — père mort de tuberculose, mère morte de congestion pulmonaire; A. P. — à 26 ans cette femme était alitée pendant 1 m. 1/2 pour point de côté (pleurésie?); a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 10 h. 1/2; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3300, le 7^e j. 3300; ét. bon; P. plac. — 550; S. C. — températ. 3 fois au-dessus de 38°, inject. utér.

6. (1900, n° 197) a. 21; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — pleurésie à 18 ans; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 15 h.; Exp. — 1 h. 5 m.; enf. viv.; P. enf. — 4080, le 8^e j. 4220; ét. bon; P. plac. — 680; S. C. — normales.

Obs. — Gros œuf.

7. (1901, n° 1476) a. 24; A. H. — père mort de tuberculose à 36 ans; A. P. — un abcès froid à 2 ans, pleurésie à 21 ans; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 7 h. 1/2; Exp. — 1 h. 45 m.; enf. viv.; P. enf. — 2590, le 8^e j. 2660; ét. bon; P. plac. — 370; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes.

8. (1902, n° 1245) a. 22; A. H. — père mort de tuberculose; A. P. — pleurésie à 17 ans; R. — 16 a.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 14 h. 1/2; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 2950, le 2^e j. 2820; ét. bon; P. plac. — 480; S. C. — normales.

9. (1902, n° 1418) a. 29; A. H. — père mort de tuberculose à 35 ans; A. P. — à 11 ans pleurésie gauche, pneumonie, à 14 ans anémie; R. — 16 a.; a. gr. — 9^e m.; tr. alb.; Tr. — 18 h. 1/2; Exp. — 30 m.; enf. viv.; P. enf. — 2730, le 9^e j. 2550; P. plac. — 410; S. C. — normales.

10. (1903, n° 238) a. 22; A. H. — père mort de congestion

pulmonaire (?) ; A. P. — fièvre typhoïde en bas-âge ; pleurésie à 12 ans ; bronchites à répétition ; a. gr. — 9e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2770, le 9e j. 2.470 ; P. plac. — 470 ; S. C. — normales.

11. (1903, n° 1800) a. 35 ; A. H. — mère morte de congestion pulmonaire (?) à 30 ans ; A. P. — à 27 ans pertes abondantes sans cause, à 33 ans pleurésie ; R. — 14 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 36 h. ; Exp. — 2 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 3350, le 14e j. 3090 ; P. plac. — 625 ; S. C. — lymphangite du sein droit.

12. (1903, n° 1840) a. 40 ; A. H. — père mort d'une affection pulmonaire (?) à 57 ans ; A. P. — pleurésie à 18 ans ; R. — 15 a. ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 22 h. ; Exp. — 1 h. 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2680, le 10e j. 3080 ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

B. — *Multipares.*

13. (1899, n° 1622) a. 38 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — scarlatine à 6 ans, bronchites à 16 et à 18 ans, à 32 ans pleurésie purulente (pend. 10 mois) ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 acc. à terme forceps enf. viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. 1/2 ; Exp. — 3 h. 50 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3880, le 13e j. 4210 ; ét. bon ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

Obs. — Application de forceps dans l'excavation pour inertie utérine.

14. (1900, n° 1841) a. 26 ; A. H. — père mort de tubercu-

lose ; A. P. — fluxion de poitrine à 14 et à 15 ans, pleurésie sèche à 17 ans, fièvre typhoïde à 21 ans ; R. — 17 a. ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1895 acc. norm. enf. viv. s. m. 6 mois puis bib., b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. 11 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. 3340. le 9^e j. 3430 ; ét. bon ; P. plac. — 490 ; S. C. — normales.

15. (1901, n^o 1010) a. 40 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 4 ans, variole à 9 ans, pleurésie droite à 32 ans, pneumonie à 38 ans ; R. 17 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. prém. 8 m. alb. ; enf. mort au bout de 48 h. ; a. gr. — 9^e m. ; alb. ; Tr. — 3 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2580, le 8^e j. 2450 ; ét. bon ; P. plac. — 320 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur.

16. (1901, n^o 1477) a. 36 ; A. H. — père mort de pleurésie ; A. P. — rougeole à 10 ans, pleurésie à 23 ans, pneumonie à 31 ans ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. prém. à 7 m. 1/2 enf. viv., s. m. 7 mois morte alors de broncho-pneumonie ; a. gr. — 6 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. mort ; œuf entier de 650 gr. ; S. C. — normales.

Obs. — Présentation du siège. Rupture prématurée des membranes après un rapport sexuel (la veille de l'accouchement).

17. (1902, n^o 864) a. 34 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 27 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 11 ans, métrite à 29 ans (curettage), toussé souvent, crache du sang parfois ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1890 acc. norm. enf. viv. s. m. 13 mois b. p. ; a. gr. — 9^e m. (?) ; pas d'alb. au moment de l'acc. ; Tr. — 8 h. 1/4 Exp. — 10 m. ; enf. viv. ;

P. enf. — 3470, le 11^e j. 3570 ; ét. bon ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

18. (1903, n^o 416) a. 23 ; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 34 a., mère à 27 ans ; A. P. — dysentérie à 4 ans, scarlatine à 10 ans, rougeole à 13 ans, leucorrhée depuis l'âge de 14 ans, touse souvent, *hémoptysies*, faiblesse générale depuis l'enfance plus accentuée pendant la grossesse ; R. — 17 a. irrégul. dysménorrhée ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. prém. à 8 m. enf. mort-né ; a. gr. — 9^e m. (?) ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 1960, le 8^e j. 1400 ; ét. bon ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

19. (1900, n^o 2303) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 22 ans ; A. P. — hémoptysies à 17 ans, 2 fois pleurésie droite à 19 et à 25 ans, à 22 ans grippe, puis rhumat. artic. aigu, touse tous les hivers ; R. — 17 a. ; I-pare ; a gr. — près du terme ; Tr. — 6 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 11^e j. 2940 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — lymphangite du sein droit.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein de nourrice 3 semaines, puis allaitement mixte par la mère, pendant 7 mois, était bien portant en 1902,

« (1902, n^o 643) a. 27 ; II-pare m. p. ; A. obst. (V. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. 3/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3200, le 8^e j. 3150 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

Obs. — La femme n'a pas toussé cet hiver.

20. (1903, n^o 908) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 35 ans ; A. P. — rougeole à 10 ans, pleurésie à 15 ans, à 24 ans ; bronchite pendant laquelle : épistaxis, troubles

de la vue, bourdonnements d'oreilles, 6 mois après, varicelle avec albuminurie qui persiste depuis. — leucorrhée depuis 3 ans ; R. — 14 a. ; II-pare p. d. ; A. obst. — en mai 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. 4 mois, puis allaitement mixte chez une nourrice (la mère s'étant placée comme nourrice) b. p. ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 7 h. Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2950, le 10^e j. 2960 ; P. plac. — 450 ; S. C. — alb. persistante, pas de fièvre.

Obs. — 4 mois après son premier acc. la femme s'était placée comme nourrice et remplissait cette fonction pendant 17 mois.

21. (1903, n^o 1245) a. 19 1/2 ; A. H. — père mort à 29 ans d'une affection pulmonaire (?) ; A. P. — scarlatine dans l'enfance, bronchites et hémoptysies fréquentes ; R. 15 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1901 acc. norm. enf. viv. s. m. 16 mois b. p. ; pas de Rét. de C. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3240, le 9^e j. 3590 ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

22. (1898, n^o 1454) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole à 2 et à 8 ans, cette dernière a été suivie d'un ictère, à 4 ans pleurésie avec épanchement ; III-pare p. d. ; A. obst. — en 1888 (?) acc. norm. enf. viv. b. p., en 1897 avortem. de 2 mois ; a. gr. — près du terme ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2710, le 6^e j. 2620 ; ét. bon ; P. plac. — 310 ; S. C. — normales,

Obs. — Placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes.

23. (1899, n^o 558) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — bronchites fréquentes, tousses presque tous les jours, il y a 4 ans *hémoptysie avec fièvre* ; III-pare p. dif. ;

A. obst. — en 1890 et 1893 deux acc. norm. enf. viv. s. m. 2 mois puis bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. 8 h. 1/2 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3220, le 8^e j. 3290 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

24. (1899, no 1286) a. 21 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 38 ans ; A. P. — pleurésie gauche à 12 ans ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 et 1897 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} s. m. 22 mois b. p., le 2^e s. m. 6 semaines puis bib. mort à 25 mois de rougeole ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3680, le 8^e j. 3620 ; ét. bon ; P. plac. — 940 ; S. C. — normales.

25. (1902, no 167) a. 30 ; A. H. — père mort de tuberculose (il y a 18 ans) ; A. P. — malade jusqu'à l'âge de 18 ans, pleurésie à 18 ans ; R. — 13 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. s. m. 8 mois b. p. ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3250, le 10^e j. 3120 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant élevé au sein maternel 6 mois puis au biberon est mort à 9 mois de diarrhée.

« (1903, no 230) a. 31 ; III-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 7^e j. 3080 ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

26. (1903, no 1724) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 40 ans ; A. P. — pleurésie à 26 ans ; R. 16 a. ; III-pare m. p. ; A. obst. — en 1898 et 1900 deux acc. norm. enf. viv., le 1^{er} bib. mort à 5 mois 1/2 d'entérite, le 2^e s. m. 16 mois b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. ; Exp.

— 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2900, le 8^e j. 2960 ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Le mari de la femme est probablement tuberculeux.

27. (1899, n^o 929) a. 29 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 25 ans ; A. P. — pleurésie à 20 ans, fièvre typhoïde à 25 ans ; IV-pare m. pour 2 dern. ; A. obst. — en 1890 et 1897 deux acc. norm. enf. viv., en 1896 acc. à terme siège enf. viv. ; le 1^{er} bib. b. p. ; le 2^e s. m. mort à 4 mois de bronchite, le 3^e s. m. 2 mois puis bib. mort à 4 mois de bronchopneumonie ; a. gr. — 8^e m. ; pas d'alb. Tr. — 3 h. 1/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2090, le 8^e j. 2060, ét. bon ; P. plac. — 375 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta prævia. Cet enfant, élevé au sein maternel 1 mois, puis au biberon, était vivant mais faible en 1901.

« (1901, n^o 1186) a. 30 ; V-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; alb. ; Tr. — 2 h. 1/4 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3300, le 9^e j. 3080 ; ét. bon ; P. plac. — 640 ; S. C. normales.

28. (1899, n^o 209) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose, un frère tuberculeux ; A. P. — pleurésie à 8 ans, bronchites fréquentes ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1893, 1894, 1896 et 1898 quatre acc. norm. enf. viv. s. m., tous morts à quelques jours ; a. gr. — près du terme ; tr. alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. P. enf. ; — 3260, le 5^e j. 3050 ; ét. bon. P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, envoyé chez une nourrice, y est mort le 7^e jour.

« (1899, n^o 2083) a. 27 ; VI-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) ; a. gr. — 7^e m. ; tr. alb. ; Tr. — 8 h. 3/4 ; Exp. —

15 m. ; enf. mort macéré ; P. enf. — 1400 ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

29. (1901, n° 1944) a. 29 ; A. H. — père mort de tuberculose à 30 ans ; A. P. — fièvre typhoïde à 4 ans, pleurésie à 26 ans ; R. — 12 a. ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1890, 1891, 1895, 1897 et 1900 cinq acc. norm. enf. viv. s. m. (11 à 17 mois), tous viv. et b. p. sauf le 4^e ; pas de Rét. de C. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. ; Exp. — 2 h. ; enf. viv. ; P. enf. : 1) 2650, le 7^e j. 2470 ; 2) 2600, le 7^e j. 2480 ; ét. bon ; P. plac. — 890 ; S. C. — normales.

Obs. — La femme est devenue enceinte en allaitant. Accouchement gémellaire ; 2 sommets, 2 filles, allaitées par la mère.

30. (1903, n° 1080) a. 37 ; A. H. — mère morte jeune de tuberculose ; A. P. — vers 7 ans coxalgie droite, bronchites fréquentes et hémoptysies depuis plusieurs années, amaigrissement depuis 5-6 ans ; R. — 15 a. ; VIII-pare m. p. pour 7 derniers ; A. obst. — 1) en 1889 acc. norm. enf. bib. mort à 3 ans 1/2 (idiot), 2) en 1892 acc. à 7 m. siège enf. mort au bout de 3 jours, 3) en 1897 avortem. de 3 m. 1/2, 4) en 1898 acc. à 8 m. 1/2 enf. viv. bib. mort à 3 ans de rougeole, 5) en 1899 acc. près du terme enf. viv. bib., maladif, 6) en 1901 acc. à 8 m. 1/2 siège enf. viv. bib. mort à 8 mois, 7) en 1902 acc. norm. enf. viv. ; pendant cette grossesse, vertiges et chutes ; a. gr. — 7 m. (?) ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 2 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3500, le 5^e j. 3380 ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin asymétrique. Le mari de cette femme tousse depuis 8 ans.

31. (1901, n° 88) a. 36 ; A. H. — mère et un frère morts de

tuberculose ; A. P. — rougeole et varicelle dans l'enfance, à 9 ans deux fois fluxion de poitrine, pleurésie gauche, — à 17 ans scarlatine ; R. — 12 a. ; X-pare m. p. ; A. obst. — en 1882 acc. à terme, forceps, de 1884 à 1898 sept acc. norm. enf. viv., en 1897 un avortem. de 3 m. 1/2, — 2 enf. morts, 6 viv. et b. p., dont 5 s. m. (pend. 1 an) et 1 bib. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 9 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4010, le 8^e j. 4000 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

TABLEAU VI. — *Parturientes non tuberculeuses, avec prédisposition héréditaire à la tuberculose, chez lesquelles les affections diverses des voies respiratoires sont survenues au cours ou à la suite d'une grossesse ou pendant l'allaitement.*

A. — *Primipare.*

1. (1898, n° 1153) a. 22 ; A. II. mère morte de tuberculose ; A. P. — influenza au 3^e mois de la grossesse ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Exp. — 2 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 3250, le 10^e j. 3450 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur.

B. — *Multipares.*

2. (1899, n° 247) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 43 ans ; A. P. — leucorrhée, bronchite pendant cette grossesse ; R. 17 a. ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1897 acc. prém. à 8 m. enf. viv. s. m. 7 mois puis bib. b. p. ; pas de Rét. de C. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. 1/2 ; Exp. 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2600, le 6^e j. 2620 ; ét. bon ; P. plac. 300 ; S. C. — normales.

3. (1899, n° 422) a. 22 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 49 ans ; A. P. — rougeole et coqueluche dans l'enfance, pleurésie droite au début de cette grossesse (guérie sans ponction au bout de 1 mois) ; R. — 15 a. 1/2 ; II-pare ; A. obst. — en 1896 acc. norm. enf. viv. s. m. pendant la nuit et nourrie au verre par la grand'mère dans la journée, morte à 16 mois de tuberculose pulmonaire secondaire à un abcès froid du cou ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3170, le 8^e j. 3130 ; ét. bon ; P. plac. — 690 ; S. C. — normales.

4. (1899, n° 1289) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose à 28 ans ; A. P. — à 4 ans 1/2 bronchite, à 15 a. 1/2 fièvre typhoïde, tousses tous les hivers et pendant toute la durée de cette grossesse ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1895 acc. norm. enf. viv. bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 19 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3230, le 5^e j. 3300 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

5. (1901, n° 1287) a. 30 ; A. H. — parents morts de tuberculose ; A. P. — broncho-pneumonie à 3 ans, bronchite à 20 ans, pleurésie sèche pendant sa 1^{re} grossesse 6 semaines avant l'accouchement : R. 15 a. 1/2 ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1899 acc. norm. enf. viv. bib. mort au bout de 3 semaines ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 8 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3520, le 9^e j. 3440 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

6. (1899, n° 1016) a. 26 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — à 10 ans et à 16 ans fluxion de poitrine compliquée deux fois de pleurésie, depuis sa dernière grossesse bronchites fréquentes ; R. 17 a. ; III-pare p. d. ; A. obst. — 1) en 1894 acc. gémellaire au 7^e m. 2 filles mort-nées ; 2) en 1895 acc. près du terme, symphyséotomie enf. viv. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; enf. viv. ; P. enf. — 3150, le 15^e j. 3250 ; ét. bon ; S. C. — normales d'abord, puis le 12^e j. survient une bronchite, ventouses.

Obs. — Bassin vicié. *Symphyséotomie.* Application de forceps. — Le père de ses enfants précédents est mort de tuberculose. Femme sortie en bon état.

7. (1899, n° 2501) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — péritonite après son 1^{er} accouchement, en novembre 1894 pleurésie, elle a toussé tout l'hiver 1893-95 ; IV-pare p. d. pour 2 dern. ; A. obst. — 1) en 1891 acc. à 8 m. forceps enf. viv. s. m. 17 m. b. p. ; 2) en juin 1894 acc. norm. enf. viv. s. m. 15 m. b. p. ; 3) en 1896 acc. norm. enf. viv. s. m. 14 mois b. p. ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. 1/2 ; Exp. — 25 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3100, le 8^e j. 3270 ; ét. bon ; P. plac. — 650 ; S. C. — normales.

8. (1898, n° 1755) a. 26 ; A. H. — parents morts de tubercu-

lose : père à 28 ans, mère à 22 ans, un frère mort de bronchite (?) ; A. P. — rougeole dans l'enfance, anémie depuis l'âge de 16-17 ans, fluxions de poitrine presque tous les ans, tousses toujours ; R. — 21 a. ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1896 acc. prém. à 7 m. 1/2 enf. viv. s. m. 8 jours puis bib., mort à 1 mois 1/2 d'une affection pulmonaire ; a. gr. à terme ; pas d'alb. ; Tr. 3 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3850, le 8^e j. 3760 ; — ét. bon ; P. plac. 750 ; S. C. — normales.

Obs. — Le père du 1^{er} enfant est mort de tuberculose. Le 2^e enfant, élevé au sein maternel 3 semaines, puis au biberon, est mort de bronchite à 8 mois.

« (1902, n^o 569) a. 29 ; A. P. — la femme dit que depuis 5 ans environ elle a maigri et que depuis 3 ans elle a des fréquentes *hémoptysies* (la dernière 15 j. avant cet accouchement), elle ne se rappelle pas le traitement que l'on lui a prescrit ; III-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) ; a. gr. — à terme ; Tr. — 2 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 3650, le 7^e j. 3470 ; ét. bon ; P. plac. — 530 ; S. C. — normales.

Obs. — Cet enfant, élevé au sein maternel, puis à l'allaitement mixte, est mort à 9 m. 1/2 de convulsions.

« (1903, n^o 1271) a. 30 ; A. P. — la femme tousse toujours, mais elle ne se plaint plus d'hémoptysies ; IV-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) ; pas de Rét. de C. ; a. gr. — ? Tr. — 3 h. 1/2 ; enf. viv. ; P. enf. — 3020, le 8^e j. 3190 ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

9. (1898, n^o 2158) a. 32 ; A. H. — père mort de tuberculose à 35 ans ; A. P. — cyphose dorso-lombaire ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1890, 1891, 1893 et 1894 quatre acc. pré-mat. à 8 m. envir. enf. viv., les 1^{er} et 4^e s. m. b. p., les 2^e et 3^e morts ; a. gr. — 8 m. ; pas d'alb. ; Tr. — 13 h. 1/4 ; Exp.

— 10 m. ; enf. viv. faible ; P. enf. — 2520 ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

Obs. — Enfant mort le lendemain cyanosé. — La femme a eu *congestion pulmonaire* avant l'accouchement. Elle est sortie guérie le 14^e jour.

« (1900, n^o 214) a. 33 ; VI-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 7 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2540, le 8^e j. 2610 ; ét. bon ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

10. (1899, n^o 54) a. 28 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — rougeole à 5 ans, fièvre typhoïde à 17 ans, pneumonie à 22 ans, — à 23 ans (pendant les suites de couches après son 5^e acc.) broncho-pneumonie pendant 2 mois ; VII-pare m. p. ; A. obst. — en 1890, 1893, 1894 et 1897 quatre acc. norm. enf. viv., en 1891 et 1892 deux acc. à terme siège enf. viv., elle n'a pas allaité ses enfants, les 2^e, 3^e et 6^e sont viv. b. p., le 1^{er} enf. mort à 6 ans de tuberculose ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 11 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 4500, le 3^e j. 4090 ; ét. bon ; P. plac. — 830 ; S. C. — normales.

Obs. — Gros œuf. Liquide amniot. abondant. Enfant envoyé le 4^e jour chez une nourrice.

11. (1898, n^o 494) a. 30 ; A. H. — parents morts de tuberculose : mère à 24 a., père à 41 ans ; A. P. — nuls ; R. — à 17 ans, irrégul., n'a pas vu ses règles depuis sa 1^{re} grossesse : elle devenait toujours enceinte en allaitant ; V-pare m. p. ; A. obst. — en 1888, 1889, 1892 et 1895 quatre acc. norm. enf. viv. s. m. (17 à 21 mois), le 3^e est mort à 2 ans de broncho-pneumonie, les autres viv. b. p. ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; Exp.

— 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3350, le 9^e j. 3350 ; ét. bon ; P. plac. — 600 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin vicié. Accouchement spontané. Cet enfant, élevé au sein maternel 17 mois, était bien portant en 1803.

« (1902, n^o 996) a. 34 ; A. P. — depuis 4 ans elle souffre de bronchites ; VII-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) et en 100 acc. norm. enf. viv. s. m. 17 mois mort alors de bronchite ; a. gr. — ? ; pas d'alb. ; œuf complet de 50 gr. ; S. C. — normales.

« (1903, n^o 917) a. 35 ; A. P. — bronchites depuis 5 ans, aurait eu une hémoptysie le mois dernier ; règles revenues 1 mois après son dernier avortement ; VIII-pare m. p. ; A. obst. — (V. ci-dessus) ; a. gr. — 8 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2180, le 8^e j. 1960 ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

Obs. — Femme accouchée chez le concierge.

12. (1902, n^o 226) a. 35 ; A. H. — mère morte à 53 ans d'une affection pulmonaire (?) ; A. P. — fièvre typhoïde à 11 ans, depuis 10 ans bronchites à répétition, à 33 ans, au cours de sa 12^e grossesse, pleurésie et albuminurie ; XIV-pare m. p. ; A. obst. — en 1888, 1891, 1892, 1893, 1895, 1897 et décembre 1900, sept. acc. norm., en fév. 1900 acc. avant terme, en 1889 et 1896 deux acc. à terme, siège, en 1890, 1894 et 1898 trois avortem. ; — le 1^{er} enfant seul. s. m., les 1^{er}, 4^e, 8^e, 10^e et 13^e enfants viv. b. p. ; a. gr. — 8 m. 1/2 ; tr. alb. ; Tr. — 2 h. 1/4 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. — 3440, le 9^e j. 3270 ; ét. bon ; P. plac. — 520 ; S. C. — normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur.

TABEAU VII. — *Parturientes non tuberculeuses prédisposées héréditairement à la tuberculose et atteintes d'une tuberculose chirurgicale.*

A. — *Primipares.*

1. (1898, n° 543) a. 19 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — rougeole à 2 ans, adénite cervicale tuberculeuse (opérée en 1897) ; a. gr. — 9^e m. ; tr. alb. ; Tr. — 18 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. — enf. 2780, le 10^e j. 2800 ; ét. bon ; P. plac. — 510 ; S. C. — normales.

2. (1898, n° 2229) a. 25 ; A. H. — père mort de tuberculose à 42 ans ; A. P. — mal de Pott à 3 ans (cyphose), à 15 ans abcès sous et rétro-trochantérien à gauche (cicatrice profonde) ; a. gr. — 8 m. ; tr. alb. ; Tr. — 5 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 1800 ; P. plac. — 250 ; S. C. — normales.

Obs. — Enfant mort le 3^e jour.

3. (1899, n° 208) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — diphtérie, coxalgie ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; enf. né en état de mort apparente, ranimé ; P. enf. — 2880 ; P. plac. — 440 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin coxalgique aplati. Application de forceps. Délivrance artificielle. Enfant mort quelques heures après la naissance.

4. (1902, n° 102) a. 20 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans ; A. P. — à 16 ans abcès froid du cou qui a suppuré pendant 3 mois ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr.

— 19 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2680, le 8^e j. 2470 ; ét. bon ; P. plac. — 320 ; S. C. — normales.

5. (1902, n^o 593) a. 25 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 43 ans ; A. P. — coxalgie bilatérale à 5 ans ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; enf. viv. ; P. enf. — 3240, le 34^e j. 3430 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — d'abord un peu fébriles, puis normales.

Obs. — Bassin rétréci. Opération césarienne. Femme sortie en bon état.

6. (1902, n^o 1017) a. 16 1/2 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — plusieurs abcès froids ganglionnaires au cou ; R. — 15 a. 1/2 ; a. gr. — ? ; alb. légère ; Tr. — 22 h. 1/2 ; Exp. — 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2470, le 10^e j. 2150 ; P. plac. — 380 ; S. C. — normales.

Obs. — Application de forceps.

7. (1903, n^o 748) a. 23 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 39 ans ; A. P. — à 13 ans arthrite tuberculeuse du cou-de-pied (traitée 18 mois), à 20 ans adénite tuberculeuse du cou ; R. 17 a. irrég. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 5 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3450, le 9^e j. 3220 ; P. plac. — 450 ; S. C. — normales.

8. (1899, n^o 2050) a. 26 ; A. H. — père et un frère morts de tuberculose ; A. P. — rougeole, coqueluche dans l'enfance, à 6 ans tumeur blanche de l'articulation tibio-tarsienne droite, anémie de 18 à 21 ans ; R. — 17 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. Tr. — 7 h. 1/2 ; Exp. — 30 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3270, le 8^e j. 3470 ; ét. bon ; P. plac. — 560 ; S. C. — normales.

9. (1900, n^o 486) a. 17 ; A. H. — mère morte à 40 ans de laryngite tuberculeuse ; A. P. — à 2 ans adénite cervicale

suppurée, à 3 ans rougeole ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 21 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2660, le 8^e j. 2750 ; ét. bon ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

10. (1901, n^o 160) a. 21 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — à 19 ans fièvre typhoïde, à 19 ans 1/2 mal de Pott dorso-lombaire ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 29 h. ; Exp. — 2 h. 55 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3360, le 8^e j. 3240 ; P. plac. — 660 ; S. C. — normales.

11. (1903, n^o 1337) a. 29 ; A. H. — père morte de tuberculose ; A. P. — à 3 ans rougeole, à 3 ans 1/2 coxalgie soignée 2 ans 1/2 par extension continue (est restée 3 ans à Berck) ; R. — 13 a. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 16 h. 1/4 ; Exp. — 4 h. ; enf. viv. ; P. enf. — 1) 2640, le 10^e j. 2560 ; 2) 2830, le 10^e j. 2630 ; P. plac. — 950 ; S. C. — fissures profondes des deux mamelons.

Obs. — Accouchement gémellaire : 2 sommets, 2 filles.

B. — *Multipares.*

12. (1899, n^o 1305) a. 21 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 34 ans ; A. P. — à 3 ans coxalgie droite, abcès à répétition sur la petite lèvre gauche ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1897 acc. norm. enf. viv. bib. mort à 1 an de bronchite ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/4 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3420, le 6^e j. 3600 ; P. plac. — 670 ; S. C. — normales.

13. (1900, n^o 1308) a. 29 ; A. H. — père mort de tuberculose à 27 ans ; A. P. — à 2 ans mal de Pott lombaire (cy-

phose lombaire, raccourcissement de la jambe gauche) ; II-pare p. d. ; A. obst. — en 1897. acc. norm. enf. viv. s. m. 2 mois puis bib. b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 2 h. $1\frac{1}{2}$; enf. viv. ; R. enf. — 3300, le 9^e j. 3420 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Accouchement spontané. Dégagement de la tête en occipito-postérieure directe.

14. (1900, no 1382) a. 29 ; A. H. — père mort de tuberculose à 30 ans ; A. P. — de 3 à 8 ans coxalgie droite (ankylose) ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1891 acc. norm. enf. viv. s. m., mort au bout de 15 jours ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. $1\frac{1}{2}$; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2980, le 9^e j. 2950 ; ét. bon ; P. plac. — 570 ; S. C. — normales.

15. (1901, no 1485) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose à 32 ans, mère morte de pneumonie à 57 ans ; A. P. — à 25 ans arthrite tuberculeuse du genou (ankylose) ; II-pare m. p. ; A. obst. — en 1900 acc. norm. enf. viv. bib. mort à 5 semaines de méningite ; a. gr. — 9^e m. ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2720, le 9^e j. 2930 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — normales.

Obs. — Nœud du cordon.

16. (1900, no 1974) a. 27 ; A. H. — père mort de tuberculose à 33 ans ; A. P. — rougeole, coqueluche dans l'enfance, à 3 ans coxalgie droite (ankylose), à 16 ans arthrite suppurée du genou droit ; III-pare ; A. obst. — 1) en 1893 avortem. de 4 mois ; 2) en 1897 acc. norm. enf. viv. s. m. 1 an b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 3 h. $3\frac{1}{4}$; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3500, le 8^e j. 3800 ; ét. bon ; P. plac. — 430 ; S. C. — normales.

Obs. — Bassin aplati du côté gauche. Accouchement spontané.

17. (1902, no 1797) a. 32; A. H. — parents morts de tuberculose; A. P. — à 4 ans perd la vue (?) et ne peut marcher pendant 3 ans, à 6 ans rougeole, à 19 ans adénite tuberculeuse au cou et albuminurie pendant 2 mois; IV-pare m. p.; A. obst. — en décembre 1897 avortem. de 2 mois, en avril 1897 et en 1899 deux acc. norm., enf. viv., le 1^{er} s. m. 4 mois mort de méningite, le 2^e pied bot double, s. m. 17 mois b. p.; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 3 h. 1/4; Exp. — 15 m.; enf. viv.; P. enf. — 2870, le 9^e j. 2840; ét. bon; P. plac. — 400; S. C. — normales.

Obs. — L'enfant a le pied bot double.

18. (1899, no 886) a. 28; A. H. — père mort de tuberculose à 40 ans; A. P. — rougeole et fièvre typhoïde dans l'enfance, à 9 ans scarlatine, érysipèle de la face, à 12 ans abcès froid au sacrum et à la clavicule droite; V-pare m. p.; A. obst. — en 1891, 1892, 1893 et 1895 quatre acc. norm., les deux premiers enf. bib. morts, les 2 derniers s. m. viv. b. p.; a. gr. — 9^e m.; pas d'alb.; Tr. — 7 h. 1/4; Exp. — 1 h. 40 m.; enf. viv.; P. enf. — 3880, le 9^e j. 4040; ét. bon; P. plac. — 570; S. C. — normales.

Obs. — Léger aplatissement du côté gauche du bassin. Accouchement spontané.

TABLEAU VIII. — *Parturientes, prédisposées par hérédité à la tuberculose, et tuberculeuses dont le début de la maladie coïncide avec la puerpéralité.*

1. (1902, n° 389) a. 25; A. H. — parents morts de tuberculose : père à 40 a., mère à 32 ans; A. P. — à 8 ans fièvre typhoïde, — en juillet 1900 (pendant l'allaitement ?) fluxion de poitrine qui dura 6 semaines, — il y a 18 mois elle eut une hémoptysie abondante, depuis elle tousse et a parfois des légères hémoptysies le matin, elle dit avoir maigri, elle transpire la nuit (traitem. créosoté); R. — 16 a. 1/2 irrég.; III-pare m. p.; A. obst. — en 1898 et 1899 deux acc. norm. enf. viv., le 1er s. m. 4 mois puis bib. viv. mais atteint de tuberculose pulmonaire, le 2e s. m. 15 mois mort à 2 ans de méningite tuberculeuse; a. gr. — à terme; pas d'alb.; Tr. — 7 h.; Exp. — 10 m.; enf. viv.; P. enf. — 3180, le 10^e j. 3250; ét. bon; P. plac. — 500; S. C. — normales.

Obs. — Bronchite il y a 1 mois. A l'auscultation des poumons on trouve : respiration soufflante et râles crépitants aux deux sommets. Le mari de la femme tousse beaucoup et est atteint de tuberculose testiculaire. Femme sortie en bon état.

2. (1902, n° 421) a. 21; A. [H. — mère morte de tuberculose à 46 ans; A. P. — rougeole, deux fois bronchite à 16 et à 17 ans; fluxion de poitrine en octobre 1899 (pendant

l'allaitement), anémie en 1900 ; R. — 15 a. 1/2 ; III-pare m. p. ; A. obst. — en mai 1899 acc. norm. enf. viv. s. m. 6 mois (sevré à cause de maladie de la mère) puis bib. 2 mois, en avril 1900 un avortem. de 3 mois, fœtus expulsé viv. (elle était soignée en ce moment pour anémie) ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; — P. enf. — 3400, le 8^e j. 3660 ; ét. bon ; P. plac. — 540 ; S. C. — normales.

Obs. — Auscultation des poumons : inspiration rude, expiration prolongée, pas de bruits anormaux. — Enfant présente un céphalhématome. Femme sortie en bon état.

3. (1899, n° 454) a. 31 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 36 ans, un frère tuberculeux ; A. P. — jamais malade avant cette grossesse, a commencé à tousser depuis 2 mois ; R. — 13 a. ; IV-pare m. p. ; A obst. — en 1892, 1894 et 1896 trois acc. norm. enf. viv. s. m. (17, 14 et 15 mois) b. p. ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 14 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3550, le 9^e j. 3610 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Auscultation des poumons : respiration rude aux deux sommets. Femme sortie en bon état.

4. (1901, n° 2211) a. 29 ; A. H. — père mort de bronchite chronique (?) à 35 ans ; A. P. — variole à 12 ans, — du 3^e au 5^e mois de cette grossesse soignée à l'hôpital pour maux d'estomac et bronchite ; R. — 15 a. ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1892, 1893, 1895, 1897 et nov. 1899 cinq acc. près du terme enf. viv. s. m., les 3^e (s. m. 24 mois) et le 5^e (s. m. 18 m.) viv. b. p., les 3 autres morts de diarrhée ; a. gr. — près du terme ; alb. ; Tr. — 11 h. 3/4 ; — Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. —

2640, le 9^e j. 2740 ; ét. bon ; P. plac. — 390 ; S. C. — le 3^e jour températ. 38°, ensuite normales.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur. Insertion excentrique du cordon. Nœud simple du cordon.

Examen des poumons : au sommet droit expiration rude et prolongée, submatité à la percussion. Femme sortie en bon état sur sa demande.

5. (1899, n° 1342) a. 35 ; A. H. — mère morte de tuberculose à 52 ans ; A. P. — bronchite à 20 ans, pneumonie à 24 ans, depuis elle tousse un peu tous les hivers, — aurait craché du sang en hiver depuis 4 a. 1/2 (depuis son 5^e acc. ?) ; R. 14 a. ; XI-pare m. p. pour 10 dern. ; A. obst. — en 1883, 1890 et 1894 trois acc. norm. enf. viv., en 1893 acc. prém. à 7 m. enf. viv., — en 1892, en juin et décembre 1895, 1896, 1897 et 1898 six avortem., enf. s. m., le 2^e mort au bout de quelques jours, les 3 autres b. p. ; a. gr. 8 m. 1/2 ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3140, le 8^e j. 2950 ; ét. bon ; P. plac. — 475 ; S. C. — lymphangite du sein droit.

Obs. — Placenta sur le segment inférieur. Rupture prématurée des membranes.

Examen des poumons : un peu de submatité au sommet droit en arrière, diminution du murmure vésiculaire à ce niveau ; pas de bruits anormaux. — Femme sortie en bon état.

6. (1901, n° 498) a. 38 ; A. H. — père mort de tuberculose à 45 ans ; A. P. — rougeole à 4 ans, bronchite à 20 ans, s'enrhume facilement ; R. — 18 a. ; XIII-pare m. p. ; A. obst. — en 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1891, 1892, 1895, 1897 et 1898 (décembre) dix acc. norm. enf. viv. en 1893' — siège,

hydramnios, hydrocéphale, en 1894 un avortem. de 3 m. 1/2, les 2^e et 3^e enf. s. m. 9 mois puis bib., le dernier s. m. 15 mois, les autres bib., — les 1^{er}, 3^e, 5^e, 6^e, 10^e et le dernier sont viv. et b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 18 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. mort ; P. enf. — 3160 (sans liq. céphalo-rachidien) ; P. plac. — 580 ; S. C. — une fois témér. 3806, ensuite normales.

Obs. — Présentation du siège décomplété mode des fesses. Hydramnios (plus de 8000 gr. de liquide). Hydrocéphalie. Ponction rachidienne. Délivr. artificielle. Malformations fœtales multiples ; bec-de-lièvre, doigts surnuméraires au pied et à la main gauche, hernie ombilicale, arrêt de développement des organes génitaux. Le mari de la femme est son cousin-germain, alcoolique qui avait eu du délire.

Examen des poumons : signes d'induration aux deux sommets, plus prononcés à gauche (en 1898 on n'a rien constaté). Femme sortie le 13^e jour en bon état général.

TABLEAU IX. — *Parturientes prédisposées à la tuberculose et tuberculeuses chez lesquelles le début de la maladie est impossible à déterminer.*

A. — *Primipares.*

1. (1898, n° 2270) a. 24 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — rougeole à 4 ans ; R. — 13 a. 1/2 ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. ; Exp. — 45 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3670, le 7^e j. 3550 ; ét. bon ; P. plac. — 555 ; S. C. — normales.

Obs. — Examen des poumons : signes de tuberculose au 2^e degré à droite. — Femme sortie le 8^e jour sur sa demande expresse.

2. (1900, n° 1236) a. 21 ; A. H. — parents morts de tuberculose, un frère tuberculeux ; A. P. — bronchites fréquentes jusqu'à l'âge de 7 ans, scarlatine à 17 ans ; R. — 16 a. ; a. gr. — à terme ; alb. au 5^e mois, pas d'alb. depuis 2 mois ; Tr. — 18 h. 1/2 ; Exp. — 1 h. 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3480 ; le 11^e j. 3710 ; ét. bon ; P. plac. — 500 ; S. C. — normales.

Obs. — Auscultation des poumons : respiration saccadée au sommet droit. Femme sortie en bon état.

3. (1901, n° 1890) a. 20 ; A. H. — père mort de tuberculose ; A. P. — entérite à 18 mois ; R. — 13 a. 1/2 ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 22 h. 3/4 ; Exp. — 15 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2900, le 9^e j. 2930 ; ét. bon ; P. plac. — 480 ; S. C. — lymphangite des deux seins.

Obs. — Examen des poumons : au sommet droit signes de tuberculose au début. Femme sortie en bon état.

B. — *Multipares.*

4. (1901, n° 726) a. 41 ; A. H. — mère morte d'un refroidissement (elle était probablement tuberculeuse), un frère mort de tuberculose ; A. P. — nuls ; R. — 17 ans ; VI-pare m. p. ; A. obst. — en 1886, 1888 et 1890 trois acc. norm. enf. viv. s. m. (14, 24 et 30 m.) b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 32 h. 1/2 ; Exp. — 2 h. 3/4 ; enf. viv. ; P. enf. — 4060 (sans méconium), le 7^e j. 4260 ; ét. bon ; P. plac. — 820 ; S. C. — normales.

Obs. — Examen des poumons : signes d'induration plus accentués au sommet droit. Femme sortie en bon état.

5. (1900, n° 55) a. 34 ; A. H. — mère morte de tuberculose ; A. P. — chloro-anémie à 14 ans, rétrécissement mitral ; R. — 14 a. ; VII-pare m. p. ; A. obst. — en 1888, 1891, 1893, 1895 et 1897 cinq acc. norm. enf. viv., en 1889 un avortem. de 6 semaines, tous les enf. s. m. (15 à 22 mois), les 2^e, 3^e et 4^e sont viv. et b. p. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 6 h. ; Exp. — 5 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3350, le 10^e j. 3220 ; ét. bon ; P. plac. — 550 ; S. C. — normales.

Obs. — Délivrance par expression française. Hémorrhagie. Syncope après la délivrance. — Femme sortie en bon état.

Examen des poumons : sommets indurés (en 1895 les poumons étaient normaux).

6. (1902, n° 1712) a. 35 ; A. H. — père mort de tuberculose à 47 ans ; A. P. — rougeole en bas-âge ; R. — 15 a. ; IX-pare m. p. b. p. ; A. obst. — en 1886, 1887, 1889, 1891 et 1895 cinq acc. norm. enf. viv., en 1892 acc. à 8 m. enf. mort-né, en 1893 et 1894 deux avortem., seulement le 2^e enf. s. m. 7 mois, les 2^e, 3^e et 4^e enf. sont viv. b. p. ; a. gr. — près du terme ; pas d'alb. ; Tr. — 4 h. 1/2 ; Exp. — 20 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 3050, le 10^e j. 3050 ; ét. bon ; P. plac. — 620 ; S. C. — normales.

Obs. — Insertion du placenta sur le segment inférieur.

Examen des poumons : au sommet droit submatité et affaiblissement du murmure vésiculaire. — Femme sortie en bon état.

7. (1900, n° 2345) a. 34 ; A. II. — mère morte de tuberculose à 60 ans ; A. P. — fluxion de poitrine à 2 et à 5 ans, pneumonie à 14 ans, à la même époque pleurésie du côté gauche, — hémoptysies (?) ; R. — 16 a. ; X-pare m. p. ; A. obst. — en 1890, 1891, 1892, 1894 et 1895 cinq acc. norm. enf. viv., en juillet, septembre et décembre 1898 trois avortem., en 1899 acc. prém. à 8 m. enf. viv., — le 4^e, 5^e et le dernier enf. s. m. (le 5^e 2 ans), les autres bib., les 2^e et 5^e enf. sont seuls viv. ; a. gr. — à terme ; pas d'alb. ; Tr. — 12 h. ; Exp. — 10 m. ; enf. viv. ; P. enf. — 2550, le 6^e j. 2550 ; ét. bon ; P. plac. — 420 ; S. C. — normales.

Obs. — Examen des poumons : respiration rude au sommet gauche ; intensité diminuée au sommet droit.

Femme sortie le 7^e jour sur sa demande expresse.

Etude synthétique des observations.

Dans cette courte étude, nous ne nous occupons que de faits qui vont nous permettre de répondre aux questions suivantes :

1° La grossesse et l'accouchement exercent-ils une action tuberculisante sur les femmes prédisposées ?

2° Peut-on attribuer une influence semblable à l'allaitement ?

3° Quelle est l'influence qu'exerce la prédisposition morbide maternelle sur la grossesse et le produit de conception ?

Sur les 660 femmes prédisposées à la tuberculose par des antécédents héréditaires ou pathologiques, et qui ont eu ensemble 1590 accouchements, pas une ne présentait des lésions tuberculeuses aux poumons.

Et cependant dans plusieurs cas l'hérédité a exercé son influence néfaste sur d'autres membres de la famille. Dans les quatre premiers tableaux nous trouvons 32 femmes dont les frères et les sœurs étaient tuberculeux. C'est un fait bien intéressant que parfois c'est la sœur qui a eu des enfants qui est la plus réfractaire. Ainsi par ex., une femme (T. II, n° 197) âgée de 34 ans accouche pour la troisième fois ; sa mère est morte de tuberculose à 29 ans, ses deux sœurs sont mortes aussi de tuberculose : l'une qui n'était pas mariée est morte à 23 ans, l'autre, mariée,

mais n'ayant pas eu des enfants, est morte à l'âge de 27 ans. Et notre femme qui a eu son premier enfant à 22 ans, ne présente pas de lésions tuberculeuses, malgré ses trois grossesses, malgré l'allaitement de son deuxième enfant pendant 18 mois. Des faits semblables ont été cités par Mercier dans sa thèse. M. le professeur Pinard dans ses leçons cliniques a plusieurs fois attiré l'attention des élèves sur des fait de ce genre, et dans sa préface mentionnée plus haut il cite le cas suivant : « Je viens d'assister, pour la sixième fois, une de mes clientes, née de parents tuberculeux, dont tous les enfants allaités par elle-même sont vivants. Cette femme est très bien portante. Or, elle était la plus jeune de trois sœurs. Les deux aînées sont mortes tuberculeuses et célibataires ! »

Mais peut-être plus intéressantes encore sont les femmes qui ont cohabité avec des maris tuberculeux tout en restant indemnes (17 femmes dans nos sept tableaux). Or nous savons combien est dangereuse, en général, une cohabitation semblable, mais en particulier dans la classe ouvrière, où l'hygiène la plus élémentaire est si peu observée. Eh bien, malgré cela, malgré leur prédisposition, malgré leurs grossesses, ces femmes ne sont pas devenues tuberculeuses. Deux cas sont surtout frappants : une femme (T. I, n° 233) accouche pour la 14^e fois ; elle a allaité quelque temps tous ses enfants et se porte bien ; et cependant, son père, son frère et le premier mari, avec lequel elle avait 12 enfants, sont morts

de tuberculose. L'autre femme (T. II, n° 236) vient d'accoucher pour la 8^e fois; sa mère et ses deux frères sont morts de tuberculose, de même que son premier mari, père de ses 6 enfants; elle les a allaités et n'est pas du tout malade.

Ainsi donc voilà des femmes qui appartiennent à des familles de tuberculeux, qui sont pendant des années exposées à la contamination directe, qui mènent plusieurs grossesses à bonne fin et qui allaitent leurs enfants, sans devenir malades malgré tout cela. Et comment des faits semblables peuvent-ils s'accorder avec l'opinion que l'influence seule de la grossesse suffirait pour provoquer l'invasion de la tuberculose chez les femmes prédisposées?

La plupart des femmes que nous avons classées parmi les prédisposées par hérédité seule (T. I, II et III) ont eu la rougeole, à laquelle on attribue également l'influence favorisante sur l'éclosion de la tuberculose. De même, quelques-unes ont eu la variole et la syphilis. Leur prédisposition était donc accrue du fait de ces maladies.

D'autres femmes que nous avons groupées dans le tableau IV ont eu, en outre, diverses affections des voies respiratoires, en dehors de leurs grossesses. Ainsi chez elles les poumons étaient déjà plus ou moins affaiblis, moins intègres que chez les autres femmes. Nous avons cependant éliminé de ce tableau les femmes qui ont eu des bronchites en bas âge, pensant que l'influence de cette affection pouvait disparaître tout à fait avec le temps assez long pen-

dant lequel ces femmes se portaient bien; par contre, nous y avons placé des femmes qui ont été atteintes d'influenza, sachant quelle action néfaste cette maladie exerce souvent sur l'appareil respiratoire. Les observations parlent pour elles-mêmes d'une façon assez claire pour nous dispenser de citer toutes ces femmes qui ont eu leurs poumons en état de moindre résistance, Rappelons seulement que ces femmes, au nombre de 43, qui ont eu ensemble 112 accouchements, à l'examen des poumons ne présentaient pas de lésions tuberculeuses.

Mais voilà qu'au tableau V nous trouvons 31 femmes (ayant eu 80 accouchements), dont 5 avaient des hémoptysies et 27 des pleurésies. Chez toutes ces femmes on n'a pu constater des lésions bacillaires. Et dans ces cas nous pourrions même admettre plus qu'une simple prédisposition. Ces hémoptysies, de même que ces pleurésies, pourraient indiquer qu'à un moment donné ces femmes ont subi réellement l'invasion bacillaire. Puis, grâce à quelque cause inconnue pour nous, la maladie était sinon définitivement guérie, au moins réduite au silence, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais alors, d'après l'opinion généralement admise, la grossesse et surtout l'allaitement devraient réveiller la maladie sommeillante. Et cependant la théorie se trouve ici en défaut, chez ces 31 femmes. L'observation suivante est très intéressante à ce point de vue : une femme (T. V, n° 19), II-pare, âgée de 27 ans, dont la mère est morte de tuberculose à 22 ans, tousse tous les hivers. Elle

était réglée tardivement, à 17 ans. Au même âge elle a eu des hémoptysies ; à 19 ans et à 25 ans elle a eu deux fois une pleurésie du côté droit : à 22 ans survient la grippe à laquelle fait suite une attaque de rhumatisme articulaire aigu. A 25 ans, à peine relevée de sa deuxième pleurésie, elle devient enceinte pour la première fois. Elle tousse toujours, mais cependant mène à bien sa grossesse et accouche près du terme d'un enfant de 3050 grammes. A l'auscultation on constate alors quelques adhérences pleurales. Quelques jours après l'accouchement elle a une lymphangite du sein, ce qui l'empêche d'allaiter son enfant pendant 3 semaines ; mais ensuite elle commence à le nourrir elle-même et fait de l'allaitement mixte pendant 7 mois. Bientôt après elle devient enceinte pour la deuxième fois et — chose digne à noter — elle ne tousse plus pendant l'hiver qui coïncide avec sa deuxième grossesse ; au printemps elle accouche à terme d'un enfant de 3200 gr. A ce moment l'auscultation ne révèle rien d'anormal dans ses poumons. Ainsi chez cette femme la puerpéralité a exercé une influence heureuse, et cependant la puerpéralité était prolongée. C'est tout le contraire de ce que l'on devrait s'attendre à voir survenir d'après l'opinion courante.

Quant au tableau VI, on pourrait dire que les observations y résumées ont la valeur d'une expérience. Ce sont les femmes avec prédisposition héréditaire à la tuberculose et chez lesquelles à l'action, considérée comme nocive, de la puerpéralité vient s'ajouter l'action d'une affection des voies respira-

toires, affaiblissant encore davantage les organes menacés. Ces 12 femmes ont fait 56 accouchements, sans devenir tuberculeuses. Ne voulant pas abuser des répétitions, nous signalerons seulement à l'attention du lecteur les observations 8 et 11 du tableau VI.

Les observations contenues dans le tableau VII, avaient été prises par nous dans le but de voir, si sous l'influence de la puerpéralité les bacilles renfermés quelque part dans l'organisme pourraient envahir les poumons. D'après ces 18 femmes, ayant accouché 31 fois, nous pensons que non. Et chez quelques-unes de ces femmes les adénites étaient de date récente.

Ainsi donc chez ces 660 femmes, prédisposées de diverses façons à la tuberculose, leurs 1590 grossesses et accouchements n'ont pas provoqué l'invasion bacillaire.

Mais on pourrait m'objecter que dans ma statistique une grande place est tenue par des primipares, sur les suites de couches desquelles nous ne savons rien. Et d'après Dubois c'est la 2^e et surtout la 3^e grossesse qui devient critique.

Prenons donc en considération seulement ces femmes qui ont eu au moins 3 accouchements chacune et nous trouvons dans nos tableaux 199 de ces multipares, qui prédisposées à la tuberculose ne sont pas devenues tuberculeuses malgré 982 accouchements.

Mais, dit-on, ce sont surtout les grossesses répétées et rapprochées qui exercent une action provoquante sur la tuberculose chez les femmes prédis-

posées, en les épuisant. C'est possible, mais nous trouvons dans nos tableaux des exemples de grossesses rapprochées et où cette action néfaste ne s'est pas fait sentir. Ou bien elle pourrait être le résultat des grossesses trop rapprochées et trop répétées, séparées, par l'allaitement prolongé. Voici un exemple. Une VIII-pare (T. VI N° 11), née de parents tuberculeux, n'a pas vu ses règles depuis sa première grossesse, c'est-à-dire depuis 1887 jusqu'à 1902 ! Après chaque accouchement elle allaitait tous ses enfants (de 17 à 21 mois) et devenait enceinte chaque fois pendant l'allaitement. Ainsi, en 1903, la puerpéralité durait chez elle déjà 16 ans ! Depuis 1898 elle souffrait de bronchites. Un mois avant son accouchement actuel elle aurait eu une hémoptysie légère. L'auscultation des poumons au moment de l'accouchement n'a pas permis de constater des lésions bacillaires. Certes, un mois après l'hémoptysie, la maladie pouvait bien ne pas se traduire encore par des signes physiques appréciables ; mais aussi cette hémoptysie, quoique suspecte, pourrait ne pas être tuberculeuse. Cependant, la puerpéralité prolongée sans répit pendant 16 ans a pu épuiser la femme et préparer ainsi l'invasion bacillaire. Mais c'est un fait si exceptionnel qu'il ne pourrait infirmer notre opinion.

Il suffit de parcourir d'autres observations de multipares que nous avons résumées dans nos tableaux, pour voir que les grossesses répétées, même à des courts intervalles, ne suffisent pas encore pour tuberculiser les femmes prédisposées. Nous avons trouvé

dans nos tableaux 16 femmes qui sont devenues enceintes en allaitant, tout en restant bien portantes.

D'après les auteurs, c'est surtout l'allaitement qui épuiserait les femmes et les mettrait en état de moindre résistance, c'est l'allaitement, dont l'influence nocive sur les prédisposées ne pourrait pas être mise en doute

Cependant nous ne pouvons que répéter à propos de l'allaitement tout ce que nous avons dit plus haut sur l'influence de la grossesse. Parmi les multipares dans nos observations nous trouvons un grand nombre des femmes qui allaitent leurs enfants parfois très longtemps, jusqu'à 2 ans. Et malgré cela elles ne deviennent pas malades. L'allaitement de jumeaux est plus épuisant, mais vu la rareté des accouchements gémellaires, sur lesquels nous avons des renseignements quelques années plus tard, nous ne pouvons citer qu'une VIII-pare (T. IV, n° 42) qui a allaité ses deux filles jumelles pendant 14 mois, devient enceinte de nouveau et se porte bien. Une autre femme (T. I, n° 118) tout en allaitant son enfant s'était placée comme nourrice et devient enceinte en allaitant. Deux femmes encore de notre relevé s'étaient placées comme nourrices : l'une (T. I, n° 154) a allaité son enfant trois mois, puis a pris une place de nourrice, où elle est restée jusqu'au 3^e mois de sa grossesse actuelle. L'autre (T. V, n° 20) est plus intéressante pour nous à cause de ses antécédents. Fille d'une mère tuberculeuse, elle a eu une

rougeole à 10 ans, puis à 15 ans une pleurésie ; à l'âge de 24 ans elle est atteinte d'une bronchite (influenza ?) pendant laquelle elle éprouve des symptômes d'insuffisance rénale ; 6 mois après elle tombe malade de varicelle ; on constate alors chez elle de l'albuminurie qui depuis persiste toujours ; à 23 ans elle accouche à terme d'un garçon qu'elle allaite ensuite elle-même pendant 4 mois ; alors elle a mis son enfant chez une nourrice, s'étant elle-même placée comme telle dans une maison bourgeoise, où elle reste 17 mois. Elle devient enceinte de nouveau et accouche à terme. L'albuminurie persiste toujours, mais on ne trouve pas chez elle de lésions bacillaires aux poumons.

D'autres femmes, grandes multipares, ont allaité jusqu'à 15 enfants et ne sont pas devenues malades. Pouvons-nous donc attribuer à l'allaitement l'influence néfaste quasi spécifique que l'on veut lui donner ? Il est bien difficile de se prononcer catégoriquement, mais cette influence, d'après nos observations, paraît ne pas exister.

Peut-on invoquer l'influence de l'âge de la parturiente sur l'éclosion de la maladie pendant la puerpéralité ? A. Portal attribuait au jeune âge de la parturiente les suites néfastes de la grossesse. D'après Lebert la tuberculose chez les parturientes se rencontre surtout de 20 à 30 ans (64 fois pour 100). Dans nos relevés cependant il y a des femmes de tout âge, depuis 14 ans 1/2 jusqu'au-dessus de 40 ans ; le plus grand nombre des prédisposées non tuber-

culeuses ont de 20 à 30 ans. Les 6 parturientes tuberculeuses du tableau VIII ont de 21 à 38 ans ; quant aux parturientes tuberculeuses, dont le début de la maladie nous est inconnu (tableau IX), elles sont âgées de 20 à 41 ans. Il est donc difficile d'attribuer une influence spéciale à l'âge de la parturiente.

Dans nos observations, ce qui nous a frappé surtout c'est la *rareté* relative de la tuberculose chez les parturientes prédisposées à cette maladie. En effet, nous n'avons trouvé que 33 femmes tuberculeuses sur le total de 693 femmes prédisposées à la tuberculose. Et sur les 108 parturientes tuberculeuses il n'y en avait que 33 qui présentaient la prédisposition héréditaire.

De cette façon, ces dernières ne se trouvent qu'en proportion de 30, 5 pour 100 parturientes tuberculeuses. D'autre part, les parturientes, prédisposées à la tuberculose, ne deviennent réellement tuberculeuses qu'en proportion de 4, 7 pour 100. C'est vraiment paradoxal ! Comment expliquer ce fait ? Nous préférons de ne pas jouer aux hypothèses. Et encore de ce nombre de 33 femmes il faut retrancher 20, qui étant devenues tuberculeuses indépendamment de la puerpéralité n'entrent pas dans les cadres de notre sujet. Nous ne trouvons que six femmes tuberculeuses chez lesquelles le début de la maladie pourrait être rattaché à la puerpéralité. Et 6 femmes sur 693 ce n'est que 0, 8 *pour 100* ! Si nous voulions à tout prix prouver l'action néfaste de la puerpéralité, nous pourrions y joindre encore 7 parturientes

tuberculeuses dont le début de la maladie reste indéterminé : car, comme ce début est inconnu, pourquoi ne pas le rattacher à la puerpéralité ? Dans ce cas nous aurons 13 sur 693, c'est-à-dire 1, 8 pour 100. Mais même alors la tuberculose n'apparaîtrait que bien rarement pendant la puerpéralité chez les femmes prédisposées. Il est donc ainsi très difficile de conclure que la puerpéralité facilite l'invasion de la tuberculose chez les femmes prédisposées.

Les observations, résumées dans le tableau VIII, sont intéressantes à étudier. Le N^o 1 est intéressant à plusieurs points de vue. C'est une III-pare, âgée de 25 ans, dont les deux parents sont morts de tuberculose ; réglée tardivement à 16 ans 1/2. Son mari est atteint de tuberculose testiculaire pour laquelle il a été opéré par 2 fois tout récemment ; il tousse beaucoup et l'état de ses poumons paraît suspect d'après ce que raconte la femme. A 21 ans elle accouche à terme d'un garçon, qu'elle nourrit au sein pendant 4 mois. Ce garçon âgé de 4 ans (au moment du 3^e accouchement) est vivant mais *atteint de tuberculose pulmonaire*. Serait-ce un cas de hérédo-contagion paternelle ? Bientôt après le sevrage de cet enfant elle devient enceinte et accouche à terme d'une fille. Elle l'élève au sein 15 mois. Cette fille est morte à 2 ans de *méningite tuberculeuse*. La femme dont la santé était bonne jusqu'alors, tombe malade d'une fluxion de poitrine. D'après les dates données par la femme, cette maladie coïnciderait avec le 7^e mois de l'allaitement de sa fille. On trouve

cela par le calcul, mais l'observation n'est pas bien nette sur ce sujet. La maladie dura 6 semaines. Sitôt relevée elle aurait été prise d'une hémoptysie abondante et actuellement encore elle se plaint d'avoir parfois de légères hémoptysies le matin. Elle tousse toujours depuis, elle transpire beaucoup la nuit et dit avoir maigri. Il y a un mois (avant son 3^e accouchement) elle fut atteinte d'une bronchite. A l'auscultation des poumons on trouve la respiration soufflante et des râles crépitants aux deux sommets.

Ainsi donc chez cette femme la tuberculose paraît avoir débuté au septième mois de l'allaitement. J'ai dit paraît, car malheureusement ce ne sont d'abord que des calculs, ensuite il y a des circonstances qui semblent suspectes, à savoir: que cette femme a continué à allaiter malgré la fluxion de poitrine et malgré l'hémoptysie.

La 2^e femme, une III-pare de 21 ans, est bien affirmative. C'est pendant qu'elle allaitait son premier enfant, qu'elle fut prise au septième mois d'une fluxion de poitrine qui l'a obligée à sevrer l'enfant. Ensuite elle aurait été atteinte d'anémie. Chez celle-ci on constate la tuberculose au début.

Chez la troisième et la quatrième femme on constate aussi des lésions de la tuberculose commençante; la maladie paraît débiter chez la première dans la deuxième moitié de la grossesse, chez la seconde une VI-pare peut-être dans la première moitié.

La cinquième femme, une XI^e pare âgée de 35 ans, tousse depuis 11 ans. Mais depuis 4 ans 1/2, époque qui paraît coïncider avec les suites de couches de son dernier accouchement (elle a eu encore depuis cinq avortem.), elle aurait craché du sang en hiver. Il y a cinq ans on n'a rien trouvé aux poumons ; actuellement on y constate des signes de la tuberculose commençante.

La sixième femme de ce groupe est une XIII^e pare, surmenée, mariée à un alcoolique délirant. Il y a deux ans elle a accouché d'un enfant de 3540 grammes : il y avait de l'hydramnios : 1100 grammes de liquide amniotique. A son 8^e accouchement elle avait déjà donné naissance à un hydrocéphale avec hydramnios. A présent le fœtus présente des malformations multiples. On peut incriminer l'alcoolisme du père, car on ne trouve pas chez elle de traces de syphilis et le père paraît aussi en être indemne. Il y a deux ans encore ses poumons étaient normaux. Elle a allaité son dernier enfant pendant 15 mois et bientôt après est devenue enceinte de nouveau. A présent on constate les signes d'induration aux deux sommets plus prononcés du côté gauche.

Ainsi, chez les six femmes chez lesquelles le début de la tuberculose paraît coïncider avec la puerpéralité nous pourrions faire remonter ce début : deux fois à l'allaitement, deux fois à la grossesse, une fois aux suites de couches et une fois enfin peut-être à l'allaitement, peut-être à la grossesse.

Nous avons relaté ces faits sans pouvoir en tirer

des conclusions sur la façon d'invasion et de développement de la tuberculose chez ces femmes. Les observations n'étaient pas prises au point de vue qui nous occupe, c'est pourquoi elles sont insuffisantes pour nous éclairer. En comparant cependant ces femmes aux autres, dont nous avons recueilli les observations et qui avaient les mêmes prédispositions et étaient placées dans des conditions semblables, tout en restant indemnes de la maladie, il nous paraît impossible de conclure que c'est la puerpéralité qui par son action propre aurait provoqué la tuberculisation de ces six femmes.

Pouvons-nous donc adopter la conduite conseillée par Tarnier ? « Toutes les fois », dit-il, « qu'on se trouve en présence d'une jeune fille de constitution délicate, qui a des phtisiques dans sa famille et qui à une époque antérieure a eu des symptômes de tuberculisation pulmonaire, une hémoptysie par exemple, il faut déconseiller le mariage, surtout si elle est âgée de moins de 30 ans..... Si la femme est mariée, il faut déconseiller la grossesse et surtout les grossesses répétées. Si la femme vient d'accoucher, il faut déconseiller l'allaitement ».

Mais les femmes dont les observations se trouvent résumées dans notre tableau V avaient des phtisiques dans leurs familles et ont eu à une époque antérieure des hémoptysies et des pleurésies. Et cependant elles ne sont pas devenues tuberculeuses, malgré les grossesses, malgré l'allaitement !

L'opinion exprimée par Tarnier est celle que nous

retrouvons presque partout, tant en France qu'à l'étranger, chez la majorité des auteurs.

Ainsi, pour ne citer qu'un des travaux les plus récents, Bumm pense que « la grossesse, l'accouchement et les suites de couches..... peuvent très bien, même s'il n'existe qu'une prédisposition héréditaire, être la cause de la première apparition du mal », et il ajoute que le médecin doit déconseiller le mariage à une jeune fille prédisposée. Il accepte le célèbre aphorisme de Peter (1) : « Fille, pas de mariage ; femme, pas d'enfants ; mère, pas d'allaitement ».

Allons-nous donc vraiment refuser à une jeune fille prédisposée à la tuberculose les joies du mariage et de la maternité pour cette seule raison que 0,8, disons même 1,8, pour 100 prédisposées peuvent devenir alors tuberculeuses ?

Et toutes nos femmes étaient des femmes pauvres ; dans la classe aisée, je crois, on pourrait obtenir encore de meilleurs résultats par application judicieuse de l'hygiène. Mais avant de régler définitivement la conduite du médecin, voyons d'abord si une femme avec prédisposition à la tuberculose peut devenir une bonne mère. La prédisposition morbide maternelle n'exerce-t-elle en effet aucune influence néfaste sur la grossesse et le produit de conception.

Remarquons tout d'abord, qu'après avoir étudié nos observations nous sommes incliné à penser

1. Qu'il attribue d'ailleurs à Auvard, soit dit en passant.

que l'hérédité tuberculeuse chez les femmes se traduit souvent par une sorte d'hypoplasie génitale. Il est rare, par exemple, qu'une de ces femmes soit réglée avant l'âge de 14 ou 15 ans ; parfois elle ne devient nubile qu'à 19 ou même à 21 ans. Certes, il y en a qui sont réglées tôt (quelques-unes à 10 et même à 9 ans), mais c'est plus rare. Handfort a noté que les filles de tuberculeux sont réglées tôt et abondamment. Nous pensons que dans la majorité des cas c'est tout le contraire que l'on peut observer.

Cependant cette hypoplasie génitale n'empêche pas ces femmes de devenir enceintes et de mener à bien leurs grossesses, parfois nombreuses, par exemple : une VIII-pare réglée à 18 ans (T. II n° 236), une VIII-pare réglée à 17 ans (T. III n° 78), une VII-pare réglée à 18 ans (T. IV, n° 41), etc.

La grossesse se passe bien d'habitude et les complications sont rares. Les plus souvent ces femmes accouchent à terme. Sur nos 732 observations nous relevons les chiffres suivants :

Groupes.	Nombre d'observations.	Avortements.	Fœtus morts et macérés.	Accouchements prématurés.	Accouchements à terme.
I	259	14	10	75	160
II	266	7	5	100	154
III	84	4	1	34	45
IV	53	2	2	12	37
V	35	1	1	12	21
VI	17	1	0	8	8
VII	18	0	0	9	9
Total	732	29	19	250	434
o/o	100	4	26	34,1	59,3

L'accouchement à terme est donc le plus fréquent. Cependant dans les cas où il y a hérédité tuberculeuse du côté de la mère, on peut constater une augmentation de fréquence des accouchements prématurés.

Mais cela peut être une simple coïncidence, car dans beaucoup de cas de naissances prématurées nous

trouvons l'insertion du placenta sur le segment inférieur, ce qui peut très bien expliquer la chose.

Le poids des enfants à la naissance est aussi intéressant à étudier. Pour le poids des enfants nés vivants nous obtenons les chiffres suivants :

Nombre des enfants pesant :							
Groupes.		au-dessous de 2,000.	de 2,000 à 2,500.	de 2,500 à 3,000.	de 3,000 à 3,500.	de 3,500 à 4,000.	au-dessus de 4,000.
I	primi- pares	5	12	28	50	12	0
	multi- pares	5	7	23	38	40	11
II	primi- pares	3	15	29	42	8	0
	multi- pares	4	5	47	55	40	7
III	primi- pares	2	7	17	11	5	2
	multi- pares	2	7	6	11	6	2
IV	primi- pares	0	2	6	7	1	0
	multi- pares	1	2	9	3	19	1
V	primi- pares	0	0	8	4	0	1
	multi- pares	1	1	6	9	3	1
VI	primi- pares	0	0	0	1	0	0
	multi- pares	0	1	3	7	3	1
VII	primi- pares	1	1	6	4	0	0
	multi- pares	0	0	3	2	2	0
ensemble		24	60	181	244	139	26

Ce tableau nous montre que la grande majorité des enfants nés vivants pesait 3.000 grammes ou au-dessus.

Comparons ces chiffres avec ceux que M. le professeur Pinard a donné au X^e Congrès international d'hygiène et de démographie de 1900. Ils ont d'autant plus de valeur pour nous qu'ils sont relevés dans le même milieu que les nôtres. D'après M. Pinard, sur 188.204 enfants nés à la Maternité et à la Clinique Baudelocque :

72.626 pesaient moins de 3.000 gr., c'est-à-dire 38,7 pour 100 ;

29.071 pesaient moins de 2.500 grammes, c'est-à-dire 15,4 pour 100.

En reprenant nos chiffres, nous trouvons :

Sur 674 enfants nés vivants :

265 pesaient moins de 3.000 gr., c'est-à-dire 39,3 pour 100 ;

84 pesaient moins de 2.500 gr., c'est-à-dire 12,4 p. 100.

Comme nous n'avons compté que les enfants nés vivants et éliminé les avortements, notre dernier pourcentage est inférieur à celui de M. Pinard. Mais, si nous comparons les nombres des enfants pesant de 2500 à 3000 grammes, nous trouvons :

d'après les données de M. Pinard 23,3 pour 100 ;

d'après nos relevés — 26,9 pour 100.

De cela nous pouvons conclure que les femmes prédisposées à la tuberculose donnent plus souvent naissance à des enfants pesant de 2500 à 3000 gram-

mes, que l'ensemble des femmes comprises dans la statistique globale.

Comme nous l'avons remarqué plus haut, les enfants, pesant au-dessus de 3000 grammes, se rencontrent le plus fréquemment. Et même, 4 fois sur 100 nous avons des enfants pesant au-dessus de 4000 grammes : l'un de ce dernier pesait à la naissance 5210 grammes (T. II, n° 239).

Les avortements ne paraissent pas être plus fréquents chez les femmes prédisposées que chez l'ensemble des femmes.

Nous pouvons donc conclure que les femmes prédisposées à la tuberculose donnent, en général, naissance à des enfants bien développés. La prédisposition morbide maternelle ne paraît pas avoir une influence fâcheuse sur le développement des enfants.

Mais ces enfants sont-ils bien conformés ? Oui. Les malformations fœtales sont rares. Nous n'en trouvons que quelques cas sur les 732 accouchements : une syndactylie aux 2 mains (T. I, n° 22), une polydactylie aux 2 mains (T. I, n° 158), une imperforation anale (T. I, n° 201), un pied-bot double (T. VII, n° 17). A propos de ce dernier, nous remarquons que c'est déjà le 2^e enfant de cette femme qui présente cette malformation.

Il nous était impossible d'étudier la morbidité et la mortalité infantile. Cette mortalité paraît assez grande, mais tous les calculs faits à ce sujet, d'après nos observations, resteraient forcément incomplets et douteux. Nous devons noter cependant un fait,

c'est que les mères prédisposées à la tuberculose, mais indemnes elles-mêmes, peuvent donner naissance à des enfants qui meurent de tuberculose dans le bas-âge. La prédisposition est peut-être héréditaire et les occasions de contagion ne manquent jamais ; peut-être cette prédisposition est-elle accrue chez les descendants. Pour donner quelques exemples, nous pouvons renvoyer le lecteur aux observations suivantes : T. I, n° 125. T. II, n° 170 et n° 217. T. IV, n° 34 et n° 41. T. VI, n° 10. Naturellement, je ne parle que de cas, où le père n'est pas tuberculeux. Les faits semblables ont été déjà signalés par L.-H. Petit en 1893 au Congrès de la tuberculose.

CONCLUSIONS

Des faits que nous avons recueillis nous pouvons conclure que ni la grossesse, ni l'accouchement, ni l'allaitement, ne semblent pas favoriser l'éclosion de la tuberculose chez une femme prédisposée à cette maladie. En effet, les cas, où le début de la tuberculose chez les femmes prédisposées héréditairement peut-être rattaché à la puerpéralité, sont tout à fait exceptionnels (*0, 8 pour 100*).

Cette conclusion a une grande portée pratique, car, en face d'une fille née de parents tuberculeux, pouvant être considérée comme prédisposée à la tuberculose, mais ne présentant pas de lésions bacillaires, on ne déconseillera ni le mariage, ni la grossesse, ni l'allaitement. La maternité même, semble dans certains cas avoir joué un rôle preservativeur.

D'autre part, cette femme a toutes les chances de donner naissance à un enfant bien développé et bien conformé. En lui interdisant donc la maternité, on

priverait la société d'une unité reproductrice. Qu'on place seulement la mère dans de bonnes conditions hygiéniques, et on obtiendra toujours les meilleurs résultats.

Vu : le Président de thèse,

PINARD

Vu : le Doyen,

DEBOVE

Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

LIARD

BIBLIOGRAPHIE (1)

- Andral*. — Cliniques, t. IV (2^e éd. 1829-33; 4^e éd., 1840).
- Arloing*. — Commun. au Congrès de la Tuberculose, 1888.
- Ascoli*. — Commun. au XIII^e Congrès de la Soc. Ital. de Méd. int., Padoue, 1903 (De l'interruption de la grossesse dans les maladies internes).
- Auvard*. — Traité pratique des accouchements, Paris, 1894.
- Aviragnet*. — Tuberculose chez les enfants (th. de Paris), 1892.
- Art. « Tuberculose » dans le Traité des maladies des enfants, t. I.
- Bahuaud*. — De l'influence de la grossesse et de l'accouchement sur le développement et la marche de la phthisie pulmonaire (th. de Paris) 1853.
- Bandelac de Pariente*. — Des tares observées chez les rejetons des mères tuberculeuses (th. de Paris), 1902.
- Barnes (R. et F.)*. — Traité théorique et clinique d'obstétrique (trad. franç. de Cordes), 1886.
- Baumès*. — Traité de la phthisie pulmonaire (liv. I). Montpellier, an III.

1. Cette bibliographie se rapporte non seulement au sujet de notre travail, mais à l'ensemble de la question des rapports entre la tuberculose et la puerpéralité.

Bergesio (Libero). — Annali di Ostetricia, t. 1879.

Bernheim (S). — Traité clinique et thérapeutique de la tuberculose pulmonaire, Paris, 1893.

— Tuberculose et grossesse. Commun. au XII^e Congrès intern. de méd. Paris, 1900, sect. d'obst.

Beylard. — Du rachitis, de la fragilité des os, de l'ostéomalacie (th. de Paris). 1852

Bizouard. — Tuberculose et grossesse (th. de Lyon), 1892.

Bolognesi. — Recherches pour servir à l'histoire de l'hérédité de la tuberculose (th. de Paris), 1895.

Bompiani. — Commun. au Congrès de la Soc. Ital. d'obst. 1896.

Bordeu. — Recherches sur le pouls par rapport aux crises, (t. I, ch. XXVII, (3^e édit., Paris, 1772).

Bouchard. — Leçons sur les maladies par ralentissement de la nutrition, Paris, 1885.

Bouchardat. — Supplément à l'Annuaire thérapeut. 1861.

Bouchut. — Pathologie générale, 1869 (p. 312).

Bourgeois (X de Tourcoing). — De l'influence des maladies de la femme pendant la grossesse sur la constitution et la santé de l'enfant. Mémoires de l'Acad. de médec. t. XXV, 1861.

Brieude. — Traité de la phtisie pulmonaire, t. II, 1803.

Brouardel. — De la tuberculisation des organes génitaux de la femme (th. de Paris), 1855.

Budin. — Le Progrès médical, 1876, p. 169.

Budin et Demelin. — Manuel pratique d'accouchement et d'allaitement, Paris 1904.

Bumm. — Grundriss zum studium der geburtshulfe 2^e édit. 1903.

- Burns.* — Traité des accouchements, Paris 1839.
- Caillot.* — De l'influence de la grossesse et de l'état puerpéral sur la marche de la phtisie pulmonaire (th. de Paris), 1858.
- Capuron.* — Traité des maladies des femmes depuis la puberté jusqu'à l'âge critique inclusivement, 2^e édit. 1817.
- Caresme.* — Recherches cliniques relatives à l'influence de la grossesse sur la phtisie pulmonaire (thèse de Paris 1866).
- Cazeaux.* — Traité théorique et pratique de l'art des accouchements. 5^e édit., Paris, 1856.
- Chailly (Honoré).* — Traité pratique de l'art des accouchements. 5^e édit. 1867.
- Chambrelent* (de Bordeaux). — Trois cas de méningite tuberculeuse au cours de la grossesse. Communication au Congrès de la tuberculose, 1888, Paris.
- Recherches expérimentales sur l'influence de la gestation et de la parturition sur la marche de la tuberculose. Soc. d'obstétr. de Paris, 18 juin 1903.
- Charpentier.* — Traité pratique des accouchements, t. I, 2^e éd., 1889.
- Charrin* (de Lyon). — Lyon Médical, 1873.
- Charrin et Nattan-Larrier.* — Lésions constatées chez des nouveau-nés non tuberculeux, mais issus de mères tuberculeuses. Soc. de Biologie, 1898.
- Chiara.* — Tubercolosi commune e granulosi acuta in gravidanza. Annali di Ostetricia, 1886, t. VIII p. 471.
- Gioffi.* — Comm. au xiii^e Congrès de la Soc. Ital. de Méd. int. Padoue, 1903 (De la gravité de la tuberculose pulm. au cours de la grossesse).

- Gazz. degli Ospedali. Milano, du 23 juillet 1899.
- Comby*. — Grossesse et hémoptysie. Arch. de tocologie, 1883
- Cristofori (de)*. — Annali univers., 1863.
- Cullen*. — Eléments de médecine pratique (trad. franç. de Bosquillon) t. II. Paris 1789.
- Damaschino*. — Leçons sur la tuberculose, Paris 1891.
- Daremborg*. — Influence de la fonction menstruelle sur la marche de la phthisie pulmonaire. Arch. génér. de médec. 1880.
- Delsoullier*. — Essai sur l'influence de la grossesse et de l'allaitement sur la phthisie pulmonaire (th. de Paris) 1866.
- Désormaux*. — Art. « Grossesse » dans le X^e vol. du Dictionnaire de médecine en 21 vol. 1824.
- Désormeaux et Paul Dubois*. — Art. « Grossesse » dans le XIV vol. du Dictionnaire de médecine en 30 vol., 1836.
- Dolérís*. — Septicémie tuberculeuse à la suite de couches. Bulletin de l'Acad. de Méd. 17 oct. 1899.
- Dubreuilh (de Bordeaux)*. — Influence de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement sur le développement et la marche de la phthisie pulmonaire. Bull. de l'Acad. de Méd. t. XVII. 1851.
- Dubrisay et Jannin*. — Précis d'accouchements. 1903.
- Dugès*. — Art. « Grossesse » dans le IX^e vol. du Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. 1833.
- Duncan (William)*. — Should pregnancy be terminated prematurely in cases of phthisis ? C.-R. de Soc. obst. de Londres, in Brit. med. journ. du 18 janvier 1890.

- Fallen.* — Influence heureuse de la grossesse chez quelques malades (th. de Paris), 1889.
- Federici.* — Contributo allo studio dei rapporti fra gravidanza, puerperio e tubercolosi. Gazz. d. Osped. XXI, 1900.
- Fiessinger.* — De l'influence de la tuberculose sur la grossesse et le produit de conception. Revue méd. de l'Est du 1^{er} juin 1884.
- Fieux.* — Tuberculose et puerpéralité. Revue prat. d'obstétr. et de pédiatrie, nos 122-123, 1898.
- Firket.* — Etudes sur les conditions anatomiques de l'hérédité de la tuberculose. Revue de médec., janvier 1887.
- Fonsagrives.* — Thérapeutique de la phthisie pulmonaire, 1866.
- Frank (Joseph).* — Præcepta praxeos medicæ universæ. Leipzig, 1817-1821.
- Freund.* — Die Künstliche Unterbruchung der Schwangerschaft. Deuts. med. Zeitung, 1902, n° 66.
- Fuller.* — Diseases of the Lungs, 1867.
- Funke.* — Die Indikationen des artifiziellen Abortus bei phthisis pulmonum. Unterelsass. Aerzteverein, 19 décembre 1903.
- Gaertner.* — Ueber die Erbllichkeit der Tuberculose. Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrank. XIII et Hygien. Rundschau, 1893, n° 14.
- Gardien.* — Traité complet des accouchements, des maladies des filles, des femmes et des enfants, t. II, 3^e éd 1824.
- Gaulard.* — De l'influence de la grossesse sur la tuberculose (thèse d'agrégation) 1880.
- Gendrin.* — (In thèse de Caillot).

Grancher et Strauss. — Archives de méd. expérim. 1889,
p. 511.

Grancher et Barbier. — Art. « Tuberculose » dans le
Traité de médecine et de thérapeutique, t. XII. Paris,
1900.

Grisolle. — Bullet. de l'Acad. de Médéc., 2 octobre 1849.

Gubler. — C. R. Soc. de Biologie, 1850.

Guéneau de Mussy. — Gaz. des Hôpitaux, 1868.

Guinsbourgue (de Charkow). — De la tuberculose et des
vomissements incoercibles considérés comme indica-
tions au point de vue de l'expulsion provoquée. Arch.
de tocologie, XVI, 1894.

Hahn. — Tuberculose congénitale et tuberculose héréditaire.
Revue de la tuberculose, 1895.

— Berl. Klin. Wochenschrift, 1903, no 52 (Tuberculose
et grossesse).

Hamburger. — Ueber die Berechtigung und Nothwendig-
keit bei tuberkulösen Arbeiter frauen die Schwanger-
schaft zur unterbrechen. Berlin. Klin. Wochenschr.,
1902, no 45.

Hanau. — Beiträge zur pathologie der Lungen krankheiten
Zeitschr. f. Klin. med. 1887, Bd. XII.

Handfört. — Brit. med. Journ., 1887.

Hecker et Buhl. — Klinik der Geburtskunde, t. I, 1861.

Hérard. — Du rôle respectif de la contagion et de l'hérédité
dans la propagation de la tuberculose. Comm. au Con-
grès de la tubercul. Paris, 1893.

Hérard, Cornil et Hanot. — La phthisie pulmonaire, 2^e édit.
1888.

- Herrgott.* — Tuberculose et gestation. Annales de gynéc. juillet-août, 1891.
- Hertz.* — Tuberculose laryngée et grossesse (en polonais) Gazeta Lekarska, 1904, n° 5.
- Hervieux* (d'Elbeuf). — Union médicale, janvier 1847.
- Huguier.* — Bull. Soc. Anatom. 5^e année, 1830, p. 1.
- Huhnermann.* — Primäre genitaltuberkulose in der Schwangerschaft. Arch. für gynæk. Bd. XLIII, t. I.
- Jacquemier.* — Manuel des accouchements et des maladies des femmes grosses et accouchées, t. I, 1846.
- Kassimer.* — Ueber d. Einfluss von Schwangerschaft und Entbindung auf den phtisich. progresseu. Deut. Med. Wochenchr., 1901, n° 35.
- Keisler et Pernitza.* — Berichte aus der zweiten Geburtsgynæk. Klinik von Wien, 1902, p. 206.
- Kuss.* — De l'hérédité parasitaire de la tuberculose humaine (thèse de Paris), 1898.
- Kuttner.* — Larynx-tuberculose und graviditat. Arch. f. Laryngol. und Rhinol. Bd XII, Heft 3.
- Landouzy et Martin.* — Revue de médecine, 1883.
- Landouzy et Queyrat.* — Tuberculose infantile. Gaz. hebdomadaire, 1886, p. 255.
- Landouzy.* — Hérédité tuberculeuse. Revue de méd., 1891.
- Lassègue.* — De l'influence de la grossesse et de l'état puerpéral sur la marche de la phtisie (Th. de Paris), 1856.
- Lebert.* — Ueber d. Einfluss des weiblichen Geschlechtslebens auf Entwicklung und Verlauf der Tuberculose. Arch. f. Gynæk. Bd IV, 1872.
- Nice médical, 1878.

Lefour. — Tuberculose et grossesse. Gaz. hebdom. des sc. méd. de Bordeaux, janvier 1897.

Lehmann. — Deutsche med. Wochenschr. 1893 (La tuberculose du placenta).

La Torre. — XIII^e Congrès internat. de méd. Paris 1900, sect. d'obstétr.

Léopold. — Ueber die Künstliche Frühgeburt. Arch. für Gynæk., 1879, Bd XIV.

Lobgeois. — Gazette des hôpitaux, 1851.

Londe. — Nouveaux faits pour servir à l'histoire de la tuberculose congénitale. Revue de la tubercul., 1893.

Londe et Thiercelin. — La tuberculose congénitale. Gaz. des hôpitaux, 1893.

Lop. — De l'avortement ou de l'accouchement prématuré dans la tuberculose pulm. Arch. de tocol. XXI, 1894.

— Début insolite de la tuberculose à forme des vomissements incoercibles dans la grossesse. Gaz. des Hôpitaux, 1902.

Lora. — Tubercolosi polmonare e gravidanza. Corriere Sanit. Milano, 1902, XIII.

Louis. — Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur la phtisie, 2^e édit., 1843.

Lugot. — Recherches et observations sur les causes des maladies scrofuleuses, Paris, 1844.

Malvoz et Brousier. — Tuberculose bacillaire congénitale. Ann. de l'Institut Pasteur, 1889.

Maragliano. — Sulla opportunità di interrompere artificialmente la gravidanza in caso di malattie interne. Gaz. d'Osped., XIV, 1893.

Marfan. — Traité de l'allaitement, 2^e édit, 1903.

- Martini (de).* — Tuberculosis gravidanza. Rassegna d'Ostetr. e ginec. IX, Napoli, 1900.
- Martel.* — Grossesse et tuberculose, Gaz. des Hôpitaux, 1886.
- Martin.* — Hemoptysis in pregnancy. Med. Presse, 1886.
- Martinetti.* — Annali. di ostetr. e ginec. mars 1886.
- Mauriceau.* — Observations sur la grossesse et l'accouchement des femmes et sur leurs maladies, v. II, nouv. éd., 1728.
- Mayer.* — Grossesse, influence sur la phthisie pulmonaire (Thèse de Strasbourg), 1867.
- Mercier.* — De l'influence de la grossesse sur le développement et la marche de la tuberculose (th. de Paris), 1894.
- Montgomery.* — Dublin quarterly Journal, nov. 1865.
- Morisani.* — Congrès de la Soc. Ital. d'obstétr., 1886.
- Müller (P.).* — Handbuch der Geburtshülfe, t. II, 1889.
- Murat.* — Art. « Grossesse » dans le XIX^e vol. du Dictionnaire des sciences médicales en 60 vol., 1817.
- Nattan-Larrier.* — Tuberculose et gestation. Etude expérimentale. Revue de la tuberculose, nos 1-2, 1904.
- Nutle.* — Hémoptysies de la grossesse (th. de Paris), 1881.
- Ortega.* — De l'influence qu'exercent la grossesse, l'accouchement et l'allaitement sur la phthisie pulmonaire et réciproquement (th. de Paris), 1876.
- Pacull.* — Essai sur les rapports réciproques de la grossesse et de la phthisie (th. de Paris), 1865.
- Pasquali.* — Congrès de la Soc. Ital. d'obstétr., 1886.
- Perroud.* — Lyon médical, 1871.
- Peter.* — Cliniques médicales, t. II, 2^e édit., 1879.
- Petit (L.-H.).* — Congrès de la tuberculose. Paris, 1893.

Pétiau. — Etude sur la phtisie dans ses rapports avec l'accouchement, la grossesse et la lactation (thèse de Paris), 1885.

Picot. — Tuberculose miliaire aiguë chez une femme enceinte. Gaz. hebdomad. de Bordeaux, 1885.

Pidoux. — Etudes générales et pratiques sur la phtisie, 1873.

Pinard. — Art. « grossesse » dans le XI^e vol. du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. IV^e série, 1886.

— Préface aux « Leçons de clinique obstétricale » de Queiret, 1902.

— Indications médicales de l'interruption de la grossesse. Rapport au VI^e Congrès internat. de gynéc. et d'obstétr. à Rome, 1902.

Platon. — Tuberculose et grossesse. Marseille médical, XXXVII, 1900.

Playfair. — Traité théorique et pratique de l'art des accouchements (trad. franç. de Vermeil), 1879.

Portat (Antoine). — Observations sur la phtisie pulmonaire. Paris, 1792.

Putégnat. — Quelques mots sur l'hémoptysie compliquant la grossesse. Journal de médec. de Bruxelles, 1870.

Poux. — Grossesse et tuberculose. Languedoc méd. chirurg., Toulouse, août 1900.

Queiret. — Leçons de clinique obstétricale. Paris, 1902.

Rayer. — Archives de médec. comparée, t. I, 1843.

Rebière. — Contribution à l'étude de la tuberculose dans ses relations avec la grossesse et les suites de couches (thèse de Paris), 1900.

Rémy (de Nancy). — Tuberculose à marche rapide pendant

la grossesse ; son influence sur la mère et sur l'œuf.

Arch. de Tocologie, 1894, p. 661.

Ribemont-Dessaignes et Lepage. — Précis d'obstétrique, 6^e édit., 1904.

Rivière. — Des lésions non bacillaires des nouveau-nés issus de mères tuberculeuses (th. de Paris), 1902.

Robelin. — Mécanisme des modifications organiques des rejetons de mères tuberculeuses (th. de Paris), 1902.

Robert (de Strasbourg). — Union médicale, mars 1847.

Robin (Albert) et Binet. — Du terrain de la tuberculose pulmonaire. Bullet. général de thérapeut., mars 1901.

— Les indications prophylactiques et thérapeutiques de la phthisie pulmonaire fondées sur la connaissance de son terrain. Bull. Acad. méd. 21 janv. 1902.

Rozière de la Chassagne. — Manuel des pulmoniques ou Traité complet des maladies de poitrine, 1770.

Sanchez-Toledo. — Archives de méd. expér., 1889.

Schauta. — VI^e congrès internat. de gynéc. et d'obstét. Rome, 1902.

Schelling. — Ein schwerer Fall von Miliartuberkulose im puerperium. Centralbl. f. gynæk. 1885.

Schmort et Kockel. — Die tuberkulose des menschlichen placenta. Ziegler's Beiträge Zur path. anat. XVI.

Schroeder. — Lehrbuch der Geburtshilfe. 1874.

Simon (Max). — Zeitschr. f. Geburt. und gynæk. XVIII.

Simpson (d'Edimbourg). — VI^e congrès internat. de gynéc. et d'obstét. Rome, 1902.

Sims. — Observations sur les maladies épidémiques. (Trad. française de Gaubert). Avignon, 1778.

Spiegelberg. — Lehrbuch der Geburtshilfe, 1878.

- Stehberger.* — Lex regia und Künssliche Frühgeburt. Arch. f. Gynæk. 1870. Bo I.
- Strauss.* — La tuberculose et son bacille, Paris, 1895.
- Art. « Tuberculose » dans le Traité de médecine et de thérapeutique, t. II, 1896.
- Tapret et Londe.* — Etude comparée de la nutrition chez les femmes enceintes et chez les phtisiques. Revue de la tubercul. 1894 p. 217.
- Tarnier et Budin.* — Traité de l'art des accouchements, t. II 1886.
- Thiercelin et Londe.* — Deux cas de tuberculose congénitale. Médecine Moderne, 1893.
- Thompson-Lusk.* — Science et art des accouchements (trad. franç. de Doléris).
- Vaccari.* — Gravidanza e tubercolosi polmonare. Corriere sanit. XI. Milano, 1900.
- Végla.* — Gazette des hôpitaux, 1846.
- Villa.* — Tubercolosi e gravidanza. Arte Ostetr. XIV, 1900.
- Villemin.* — Etudes sur la tuberculose, 1868
- Vinay.* — Traité des maladies de la grossesse et des suites de couches, 1894.
- Warren.* — The Americ. Journ. of. med. sc. 1857.
- Weltrubsky.* — Wiener med. presse, 1883, p. 1321.
- Wernich.* — Ueber der Verlauf Schwererer Lungen-Krankheiten während der Schwangerschaft. Berlin Beitr. z. Geburts und Gynæk. II, 1873.
- Wilson.* — Phtisis in pregnancy The Americ. Journ. of. observ. XXXIX.
- Winckel.* — Handbuch der Geburtshülfe, 2^e édit. 1893.

